Dr C. Strouhal:

Fysika.

Díl 4.

Optika.

V Praze
1907.

Optika.

Dle přednášek
c.k. dvorního rady
Dra C. Strouhala,
professora exp. fysiky na české universitě
v Praze.

1907.

2487
MFF KU
Knihovna DPV
667/76

Obsah:

1. Úvod. – 2. Rozdělení optiky.

Optika geometrická.

I. Úkazy přímočarého šíření světla.

3. Úkazy základní. – 4. Komora temná. – 5. Perspektiva. –

Fotometrie.

6. Základní pojmy a definice. – 7. Druhy fotometrů.

Rychlost světla.

8. G. Galilei 1642. – 9. O. Römer 1676. – 10. J. Bradley 1728. – 11. Význam paralaxy slunce při methodách stanovení rychlosti světla. – 12. Fizeau. – 13. Foucault.

II. Odraz světla.
(Katoptrika.)

14. Základní zákony odrazu světla. – 15. Význam zákonů odrazu světla. – 16. Odraz paprsků homocentrických.

Zrcadla rovná.

17. Svítící bod. – 18. Svítící předmět. – 19. Užívání zrcadel rovných. –

Zrcadla sférická.

20. Definice. – 21. Aberrace sférická.

A) Zrcadla konkavní (stěrná).

22. Svítící bod. – 23. Svítící předmět.

B) Zrcadla konvexní (rozptylná).

24. Svítící bod. – 25. Svítící předmět.

Zákony o zrcadlech sférických dle názoru novější geometrie.

26. Základní definice. – 27. Konstrukce pro zrcadlo konkavní. – 28. Konstrukce pro zrcadlo konvexní. – 29. Stanovení dálky ohniskové (poloměru křivosti) zrcadel konkavních. – 30. Stanovení dálky ohniskové (poloměru křivosti) zrcadel konvexních.

III. Lom světla.
(Dioptrika.)

31. Základní zákony lomu světla. – 32. Exponent lomu absolutní a relativní; optická dráha. – 33. Význam zákonů lomu světla. – 34. Sestrojování paprsku lomeného. – 35. Závislost exponentu lomu na barvě světla. – 36. Závislost úhlu dopadu α,

lomu β, a úchylky α-β. – 37. Odraz totální.

Lom světla rovinou.

38. Paprsky homocentrické. – 39. Pošinutí svítícího bodu deskou. –

Lom světla plochami sférickými.

40. Definice. – 41. Aberrace sférická. –

A) Lom světla plochou sférickou konvexní (sběrnou).

42. Svítící bod. – 43. Svítící předmět.

B) Lom světla plochou sférickou konkávní (rozptylnou).

44. Svítící bod. – 45. Svítící předmět.

Zákony o lámavých plochách sférických dle názorů novější geometrie.

46. Základní rovnice. – 47. Konstrukce pro lámavou sférickou plochu (sběrnou) konvexní.

Soustavy dvou lámavých ploch sférických.
(Čočky)

49. Definice. –

Čočky velice tenké.

50. Svítící bod. – 51. Rozbor rovnice čočkové. – 52. Svítící předmět.

Čočky libovolně silné.

53. Roviny hlavní. – 54. Početní příklad. – 55. Jak se provádí konstrukce pomocí rovin hlavních a ohnisek. – 56. O bodech uzlových. – 57. Vztahy mathematické. – 58. Optický střed.

Soustava lámavých ploch v počtu libovolném.

59. Roviny hlavní při problému všeobecném. – 60. Konstrukce obrazu pomocí rovin hlavních a ohnisek. – 61. Body uzlové. – 62. Analogie s lámavými plochami sférickými. – 63. Stanovení ohniskové dálky čoček spojných. – 64. Stanovení dálky ohniskové u čoček rozptylných.

IV. Rozklad světla.

65. Základní pojmy. – 66. Lom světla hranolem (Chromatika). Vztahy kvantitativní. – 67. Závislost deviace na dopadu paprsku. Příklad početní. – 68. Minimální úchylka. Důkaz algebraický. – 69. Lom světla hranolem. Konstrukce. – 70. Do minimální. Důkaz geometrický. – 71. Kolmý dopad paprsku na rovinu hranolu. – Vztahy algebraické. – 72. Pokračování konstrukce. – 73. Mez hodnoty Fraunhoferovy a Meyersteinovy. – 74. Spektrum sluneční. – Podmínky čistoty spektra. – 75. Čáry Fraunhoferovy. – 76. Disperse. – 77. Pokračování. Disperse lokální. – 78. Hranoly achromatické. – 79. Pokračování. Řešení početním. – 80. Pokračování. Řešení konstrukcí. – 81. Dokončení. – Řešení přesné. – 82. Hranoly průhledné. – 83. Rozklad světla při lomu plochami sférickými. Aberrace chromatická čoček. – 84. Experimenty o rozkládání a skládání světla bílého.

V. Optické stroje.

85. Komora temná (camera obscura). – 86. Komora světlá. – 87. Hadleyův sextant r. 1731. – 88. Horizontální a vertikální apparát projekční. – 89. Jednoduchý mikroskop (lupa). – 90. Mikroskop složený. – 91. Dalekohledy. – 92. Reflektor Newtonův (1663). – 93. Reflektor Gregory-ho (1663). – 94. Reflektor Cassegrainův. – 95. Reflektor Herschelův (1795). – 96. Reflektor astronomický (Keplerův). – 97. Refraktor terrestrický. – 98. Refraktor Galileův (Hollandský). – 99. Parallela mezi reflektory a refraktory.

VI. Emisse a absorpce světla.

100. Apparát spektrální. – 101. Spektra emissní a absorpční. – 102. Emissní spektra žhoucích látek pevných a kapalných. – 103. Emissní spektra žhoucích par aneb svítivých plynů. – 104. Absorpční spektra látek plynných a kapalných. – 105. Absorpční spektra plynů a par. – 106. Pokračování. Absorpce paramy žhoucími. Vysvětlení vzniku čar Fraunhoferových. – 107. Užívání spektrální analyse. – 108. Znázornění spektra. – 109. Spektrometr. – 110. O absorpci anomální. – 111. Barva předmětu. – 112. Barvy povrchové a lesk kovový. – 113. Koefficient extinkce a kvocient absorpce.

Působení světla absorbovaného.

114. Fluorescence. – 115. Fosforescence. – 116. Změna energie světelné v energii chemickou. Fotochemie.

VII. Optika fysiologická.

117. Popis oka. – 118. Pokračování. Akkomodace. – 119. Ammetropie. Brejle. – 120. O vztazích mezi dojmy zrakovými a jich vnější příčinou. – 120. O vztazích mezi dojmy zrakovými a jich příčinou.

VIII. Optika meteorologická.

121. Refrakce astronomická. – 122. Fata morgana. – 123. Duha.

Optika theoretická.

Úvod.

1 Historický rozvoj theorie undulační. – 1 Základní vzorce pohybu vibračního a undulačního. – 1 Skládání vibrací. – 1 Řešení grafické. – 1 Řešení analytické. – 1 Výklad přímočarého šíření světla. – 1 Pokračování. Vlny sférické. – 1 Vý

kład odrazu a lomu světla. – 1 Konstrukce Huygensova. –

Interference světla.

1 Rozdělení úkolu. – 1 Pokus Youngův. – 1 Zrcadla Fresnelova. – 1 Fresnelovo biprisma. – 1 Pokus Lloydův. – 1 Billetovy dvojčočky. – 1 Proužky Talbotovy. – 1 Proužky Powellovy. – Barvy tenkých vrstev. – Tenké destičky. – Pokračování. Vrstvy vzduchové. Proužky Newtonovy. – Projekce proužků Newtonových. – Spektrální rozbor proužků Newtonových. – Znázornění konstrukcí. – Modifikace pokusu Newtonova. – Barvy silných vrstev. – Jaminův refraktometr. – Newtonovy kruhy konkávním zrcadlem. –

Ohyb světla.

Úvod.

Ohybové zjevy Fresnelovy.

Přímá hrana. – Úzký drát. – Úzká štěrbina. – Otvor kruhový. – Destičky s poloperiodovými pásmy. – Kruhové stínítko. – Korony.

Ohybové úkazy Frauenhoferovy.

Přehled úkazů. – Ohyb jedinou štěrbinou. Řešení geometrické. – Řešení analytické. – Rozbor výrazu pro intensitu I. – Dvě štěrbiny. – Libovolný počet štěrbin téže šířky. – Rozbor rovnice pro intensitu I. – Řešení rovnice $m \operatorname{tg} w = q \operatorname{tg} m w$ a výpočet intensity $I = m^2 a^2 \left(\frac{\sin \varphi}{\varphi}\right)^2 \left(\frac{\sin m w}{m \sin w}\right)^2$. – Výklad populární. – 227. Minimum de- – Měření délky vlny. – Spektra normální. – Mřížky na odraz. – Konkávní mřížky Rowlandovy.

O polarisaci a dvojlomu světla.

Základní pojmy a definice. – Polarisace odrazem. – Zákon Brewsterův. – Polarisace lomu. – Apparáty polarisační. – Základní zjevy dvojlomu světla. – Polarisace dvojlomem. – Zákon Malusův.

Dvojlom v krystalech jednoosých.

Konstrukce Huygensova. – Modifikace Huygensovy konstrukce. – Rychlost paprsku a rychlost vlny. – Důkazy správnosti theorie Huygensovy. – Jednoosé krystaly positivní a negativní. – Polarisatory a analysatory na základě dvojlomu. – Hranol Nikolův. – Hranol Foucaultův. – Achromatisovaný hranol vápencový. – Hranol Bochonův.

Dvojlom v krystalech dvojosých.

Přehled soustav krystalických. – Všeobecné orientační poznámky o dvojlomu u krystalů dvojosých. – Postup historický. – Základy theorie Fresnelovy. – Pokračování. – Ellipsoid pružnosti. – Pokračování. Kmity „stabilní.“ – Ellipsoid druhý (reciprký). – Rovnice vlnoplochy. Rozbor. – Konstrukce Huygensova. – Hlavní exponenty lomu. – Refrakce konická vnitřní a vnější. – Osy krystalů dvojosých. – Převedení krystalů dvojosých na jednoosé. – Positivní a negativní krystaly dvojné. – Úhel optických os. – Příklad. – Závěrek.

Polarisace chromatická.

Úvod historický. – Rozdělení zjevů polarisace chromatické.

Úkazy polarisace chromatické ve světle parallelním.

Zařízení orthoskopů pro pozorování subjektivní. – Zařízení orthoskopů pro demonstrace objektivní. – Materiál. – Průběh úkazů ve světle monochromatickém. – Rozdíl fásový ε. – Průběh úkazů ve světle polychromatickém a bílém. –

Úkazy polarisace ve světle konvergentním.

Zařízení konoskopů pro pozorování subjektivní. – 226. Zařízení konoskopů pro demonstraci objektivní. – Rozdíl fásový při šikmém průchodu destičkou. – Povšechná povaha úkazů polarisace chromatické ve světle konvergentním. – Krystaly jednoosé kolmo k ose seříznuté. – Krystaly jednoosé šikmo k ose broušené. – Krystaly dvojosé.

Polarisace rotační.

Úvod historický. – Zákony Biotovy. – Apparáty ke studiu subjektivnímu polarisace rotační. – Apparáty k objektivní demonstraci polarisace rotační. – Průběh úkazů ve světle monochromatickém. – Průběh úkazů ve světle polychromatickém, specielně bílém. – Pokračování. Rozbor spektrální. – Soleilova dvojdeska. – Význam dvojdesky Soleilovy pro zkoumání optické aktivity látek. – Saccharimetrie. – Rotace roviny polarisační v poli magnetickém. Effekt Faradayův. – Theorie rotační polarisace.

Optika.

§1. Úvod.

Předmětem optiky *) jest studium úkazů, jež všeobecně světelnými zovememe, čili jichž podstatou jest světlo. Zkušeností seznáváme mnohá tělesa, která mohou býti uvedena ve zvláštní fysikální stav, jímž působí pak na orgán náš zrakový. Lampičku žárovou v tmavé síni nevidíme, ale proudem galvanickým se její vlákno uhelné rozžhaví; tím splněna jest objektivní, fysikální podmínka viděnía; tato pak v skutku nastává, jest-li také subjektivní, fysiologická podmínka viděnía splněna; je-li oko zdravé a otevřené. Světlem lampičky stanou se viditelnými též předměty v jejím okolí. Říkáme že lampička svítí světlem vlastním, ony předměty pak že jsou tímto světlem osvětleny. Slunce a stálice svítí vždy světlem vlastním, obězníce a jich družice jsou jimi osvětleny. V přičině však čistě optické netřeba mnohdy tohoto rozdílu tak přesně pětiti. Tak jeví se nám na př. obězníce Jupiter jakožto jasná hvězda, která zjevem svým nikterak se neliší od nějaké stálice, na př. Siria, ačkoliv Slunce jest těleso svítící světlem vlastním, naproti tomu Jupiter těleso tmavé, které vidíme jen tím, že jest světlem slunce ozářeno.

Tělesa svítící světlem vlastním označujeme jako zdroje světelné. Tyto jsou přirozené neb umělé i při těch zajímá nás jich mohutnost, o jejíž měření později pojednáme. Přirozenými zdroji světelnými jsou slunce a stálice (částečně také úkaz fosforescencí zvaný), umělé zdroje zakládají se na umělém rozžhavení hmoty z pravidla skupenství pevného. Slunce jest nejmocnějším zdrojem světelným, mohutnost jeho jest dle Bouguera (1725) rovna světelné intensitě 63.10^{26} svíček čili 53.10^{22} nejmocnějších elektrických světel obloukových. Langley pronávaje (1878) světlo slunečním s briliantově zářícím povrchem roztopené oceli v kanvertru

*) z řeckého kmene ὀπ-, jenž se jeví ve slovech: ὄπωπα, ὄψομαι atd. a od něhož odvozeno adjektivum ὀπτικός, na př. ἡ ὀπτικὴ τέχνη neb θεωρία.

Bessemerově nalezl, že slunce jest zdrojem 5.300 krát mohutnějším. Stálice jsou miliónkráte až biliónkráte slabšími zdroji než slunce. Z umělých zdrojů na prvém místě uvésti dlužno obloukové světlo elektrické, dále světlo Drummondské, magnesiové, elektrické světlo žárové, světlo plynové, petrolejové atd.

Při všech těchto zdrojech světelných, jak již pravено, jedná se o rozžhavení prvních částic; u světla obloukového svítí rozpálené konečky uhlíku, u světla Drummondského sloužila rozžhavená kůra, u světla plynového a petrolejového rozžhavení částečky nespáleného uhlíku atd. - O posledním případu snadno se přesvědčíme při kahanu Bunsenově, který jen tenkráte svítí, nevchází-li do hořícího plynu dostatečné množství vzduchu. Čím je temperatura rozžhaveného tělesa větší, tím bělejší světlo vydává. Má-li 600° zahřáté těleso světlo sotva rudé, zvyšuje-li se temperatura, stává se světlo žlutočervеným, při 800° tímto již žlutým a při 1200° bílým.

Ptáme-li se, co jest vlastně toto „světlo“, které od svítících předmětů vychází, tedy dlužno doznati, že není snadno, na otázku tuto odpověděti; aspoň nikoli s tou učitostí, s jakou můžeme otázku podobnou vzhledem k jiným smyslům našim na př. k sluchu neb k čichu zodpověděti: Nezbývá nám tedy utvořiti sobě jakousi o tom domněnku, jakousi hypothesu. Vodítkem je analogie; něco méně přístupného hledíme sobě vysvětliti podobností s tím, co nám jest přístupnější. Hypothesa tak zv. emanační čili emisní (Newton) spočívá na analogii čichu, hypothesa vibrační čili undulační (Huygens) na analogii sluchu. Dlouhý čas byla pravější z obou hypothes pokládána za pravdě podobnější; dle ní bylo světlo jakousi látkou nad míru jemnou, kterou tělesa svítící vyzařovala. Ukázalo se však, že touto hypothesou některé úkazy světelné nelze vysvětliti. Tím nabyla převahy hypothesa druhá. Těleso svítící jest analogon tělesa znějícího; světlo pak jest pohyb, který se šíří od těles svítících jistým ústředím až k oku našemu, právě tak jako se zvuk šíří k uchu našemu. Tímto, že se zvuk může šířiti ústředím každým, na př. vzduchem, vodou a pod., avšak nikoli prostorem vzduchoprázdným. Naproti tomu přicházejí k nám světlo z končin světa nejzažších, ze stálic, o jichž od nás ohromné vzdálenosti nemůžeme sobě ani sebe slabší učiniti

představy. Prostor, který při tom světlo proniká, jest prostor prázdný. Chceme-li však šíření se světla vyložiti dle analogie zvuku pohybem vlnivým, musíme předpokládati, že i onen prostor prázdný jest naplněn jakousi látkou, jejíž vlněním světlo se šíří, že tedy není prostorem prázdným v naprostém slova smyslu. Tato látka, která jest postulátem theorie, tato látka hypothetická je tak zv. světelný éther.

Všimněme si hned tohoto rozdílu mezi zvukem a světlem. Zvuk se šíří vlnivým pohybem hmotného ústředí každého. Světlo naproti tomu vykládáme vlnivým pohybem jen zcela zvláštního ústředí, totiž onoho éthеru. Ponévadž pak světlo proniká skrze hmoty každého skupenství, musíme důsledně soudit dále, že také světelný éther proniká hmoty veškeré. Další rozdíly mezi zvukem a světlem zakládají se na způsobu pohybu vlnivého. Zvuk šíří se vlněním nějakého ústředí podélným (longitudinálním); vlnění světelného éthеru musíme naproti tomu vzhledem k polarisaci světla za příčné (transversální) pokládati. Vlnění zvukové šíří se mnohem rychle, vlnění světelné naproti tomu neobyčejně rychle; ve vzduchu na příklad jde se světlo téměř miliónkrát větší než zvuk. Amplituda vlnění zvukových je dosti značná, avšak amplituda vlnění světelného jest nesmírně malá. Počet jednoduchých výchvějů za sekundu podmiňuje v akustice výšku tónu; podobně podmiňuje počet výchvějů éthеru světelného za sekundu barvu. - Jest tedy barva analogon výšky tónu mající svůj základ v kmitočtu N. Na místě tohoto můžeme bráti k charakterisování výšky tónu neb barvy též délku vlny λ. V akustice mění se kmitočet v mezích asi 16 až 50.000; v optice jsou však kmitočty daleko větší, 400 až 800 biliónů (v okrouhlých číslech). Podobné ohromné rozdíly jsou též v délce vln. Ze známé rovnice $\lambda = c$. T čili $\lambda = \frac{c}{N}$ platící pro pohyb vlnivý můžeme se pro ústředí vzduch o těch rozdílech též rychle orientovati. Ponévadž jest $c = 300\,000\,000$ metrů za sekundu, tedy jest největší λ (pro nejmenší N) asi (okrouhle)

$$\lambda = \frac{300\,000\,000}{400\,000\,000\,000\,000} \text{ metru,}$$

a nejmenší λ (pro největší N) asi (okrouhle)

$$\lambda = \frac{300\,000\,000}{800\,000\,000\,000\,000} \text{ metru}$$

Vyjádřeno v mikromillimetrech ($\mu\mu$) jest tedy λ okrouhle asi 800 až 400 $\mu\mu$ (obráceně než N v biliónech).

Všechna data v rychlosti c, o jakou se světlo šíří, jakož i o délce λ vlny světelné dlužno vázati především pro vakuum čili pro světelný éther toto vakuum vyplňující. Přichází-li světlo do ústředí hmotných, jako jest vzduch, voda, sklo a pod., mění se jak c tak i λ, naproti tomu nemění se N čili nemění se perioda T kmitová.

V rovnici $c T = \lambda$ čili $\frac{c}{N} = \lambda$

jest tudíž pro určitý druh světla T a N v ústředním nepodmíněno. Opačně akustice budiž pak již zde poukázáno na to, že rychlost c šíření se světla v ústředích hmotných jest ještě podmíněna onou periodou T čili kmitočtem N. Tóny vysoké a nízké šíří se v ústředích hmotných rychlostí stejnou; naproti tomu světla různé optické výšky, t. j. různé barvy šíří se v témže ústředí hmotném rych vostí různou.

Uvedli jsme tuto některé základní rysy undulační theorie světla na základě analogií akustických za účelem rychlé orientace, abychom jednající o úkazech optických mohli již k některým z veličin zde uvedených přibližeti.

§ 2. Rozdělení optiky.

Veškeré úkazy optické lze rozděliti dle následujících úkazů základních v šestero oddělení. Jsou to:

1.) Přímočaré šíření se světla, jež pozorujeme pokud se světlo šíří ústředím homogenním.
2.) Odraz světla.
3.) Lom světla.
4.) Rozklad světla.

Tyto tři úkazy pozorujeme současně, když světlo dopadá na rozhraní dvou ústředí, zde se světlo dílem vrací do ústředí původního, dílem prostupuje, mění-li původní směr do ústředí následujícího; při tom pak zároveň, je-li složené, se rozkládá, t. j. mění směr různě dle barvy.

5.) Periodicita světla jeví se tím, že účinky dvou světel se nejen mohou zesíliti, ale i úplně zrušiti.
6.) Polarisace světla v tom spočívající, že světlo v různých směrech vedených kolmo ku směru

šíření se, jeví eventuálně různé vlastnosti, jako by mělo různé strany polar. V souvislosti s tím jest jak dvojlom světla.

Na základě těchto šesti úkazů fundamentálních bylo by možno pojednávati o celé optice v šesti kapitolách, ponevadž však úkazy prvého, čtvrtého a pátého oddělení se vysvětlují uvažováním těles výhradně geometrickými, zahrnují se v jediný název optiky geometrické; pro úkazy periodiaty a polarisace světla, které nutno studovati v těsné souvislosti s theorií světla, zaveden název optiky theoretické.

Se stanoviska theoretického jest nejjednodušším optickým útvarem světlo lineárně polarisované. Avšak takového dvojlomu jeví spůsobem umělým, neboť zdroje světelné takového světla neposkytují; světlo obyčejné jest nepolarisované a jen za jistých okolností se polarisuje. Proto zůstává oddíl o polarisaci jednající naposledy.

Optika geometrická.

I. Úkazy přímočarého šíření se světla.

§ 3. Úkazy základní.

Světlo šíří se přímočaře. K poznání tomuto přišlo se velmi záhy pozorováním zjevů jež nastávají, když světelný paprsek, dopadá na jiná rozmanitá tělesa, nesvítivá. Některá z nich propouští světlo úplně, jako vzduch, sklo a pod. — tělesa průhledná; jiná jen částečně, jako sklo mléčné — průsvitná; jiná konečně jako kovy, neproponštějí světlo pranic — neprůhledna. Rozdíly tyto studujeme, vkládajíce různá tělesa mezi oko a zdroj světelný. Ukazuje se ovšem, že ony rozdíly nejsou povahy qualitativné, nýbrž quantitativné, t. j. že se tělesa v příčině pronikání světla liší od sebe nikoliv podstatně, nýbrž jen stupňově. Tak i průhledná tělesa stávají se neprůhlednými ve vrstvách velmi silných, naopak tělesa neprůhledná stávají se aspoň průsvitnými ve vrstvách tenkých. Voda je průhledná; avšak v hlubinách mořských, kde tloušťka vrstvy jde na kilometry, jest úplná tma, ani plnečním světlo nepronikáť tečnitě mohutnými vrstvami; naproti tomu kovy v tenounké vrstvy vytepané, dřeva tence řezaná, látky jemné a podobné, jsou průsvitnými.

Jsou-li neprůhledná vrhají stíny. Vznikání stínu jest prvním pozorováním, jež orientuje o tom, že světlo se šíří — že postupuje — a zároveň že rychlost toho jest ohromná; neboť odstraněním tělesa stínícího se nižínem osvětlí celý před tím tmavý prostor za tělesem stínícím. Ukazuje se dále, že i ve stínu jsou rozdíly; rozeznáváme stín úplný a polostín. Snadno pozorujeme, že polostíny mají vznikati všude tam, kde světlo vychází od celé plochy: jen tehdy, kdyby tato plocha byla nekonečně malou, kdyby — jak říkáme — byl dán svítící bod, vznikl by jen stín úplný. Obrysy stínů obdržíme přímočarou konstrukcí, poznáváme z toho, že se světlo šíří v přímkách. Každou takovou přímku, podél které světlo postupuje, zovem světelným paprskem. Theoretický význam tohoto pojmu jest ovšem jiný v theorii emanační a jiný v theorii undulační. Onde jest to přímo dráha částic světla, zde jest to přímka kolmá na vlnoplochu, která je koulí, šíří-li se světlo od svítícího bodu v ústředí zcela homogenním. Paprsky od svítícího bodu jdou na všechny strany a tvoří celkový útvar, který zovem paprsky homocentrickými. Plochu svítící možno si myslit rozdělenu v jednotlivé svítící body. Dle toho možno pak geometricky konstruovati stín úplný, a kde jako polostín.

Příklady dává svíčka a drát; dle toho, jak daleko za drát postavíme bílou plochu projekční — na př. bílý papír — studujeme, jak úplný stín se zužuje a polostín rozšiřuje, až konečně úplný stín mizí a polostín sotva se stává znatelným. Podobně ztrácí se v polostínu při světle slunečním stínový obraz hrotu věže, vrcholu a větviček stromu a pod. Země naše vrhá úplný stín i polostín, jakož se jeví při zatmění měsíce. Dlužno vzíti v pozornosti, že v té vzdálenosti od země, ve které je měsíc, je polostín velice úzký následkem ohromné vzdálenosti země od slunce a nepatrné její poměrné velikosti. Meze stínu úplného i polovičního stanoví se jednoduchou geometrickou konstrukcí.

§ 4. Komora temná.

Nezajímavější zjev na přímočarém šíření se světla spočívající jest

zobrazení předmětů svítících neb osvětlených v komoře temné.

Zatemníme-li síň nějakou zavřenou tečně okenice a necháme-li malým otvorem v jedné okenici z venčí vnikati do síně papršky světelné a dopadati nejlépe na desku mléčného skla, zobrazí se na této průmětné rovině celé okolí jak co do obrysů tak i co do barevnosti a sice jest obraz obrácený. Forma otvoru jest při tom věci jednostejná. Velikost otvoru má vliv na světlost a zároveň na ostrost obrazu. Otvor větší dává obraz jasnější, avšak obrysy jeho, kontury jsou méně ostré. Při otvoru malém je lépe s rovinou průmětnou jíti blíže k otvoru. Při otvoru větším lze jíti daleko a obdržeti obrazy větších rozměrů. Při tom je důležito na jednu okolnost zvlášť upozorniti. V komoře temné zobrazují se stejně ostře jak bližší tak i vzdálenější svítící body. Není tedy vzdálenost svítících bodů před otvorem na ostrost jich obrazu žádného vlivu.

Krajina nalézající se před otvorem komory temné zobrazí se tudíž na průmětné rovině mléčného skla, nechť jest toto sklo otvoru blíže nebo od otvoru dále, tedy v každé od otvoru vzdálenosti a při tom zobrazí se všechny části krajiny bližší nebo vzdálenější stejně ostře. Tím vším liší se obrazy komory temné podstatně od těch obrazů, které, jak později shledáme, vznikají optickými čočkami.

V listnatém lesíku, svítí-li slunce, pozorujeme na zemi malá světlá kolečka, obyčejně elliptické formy, která jsou obrazy slunce, vznikajícími malými otvory mezi listím. Při částečném zatmění slunce, jsou tyto obrázky podoby měsíčků.

Ukazy komory znal již Leonardo da Vinci (* 1452 † 1519); obšírně pak popsal je Giambattista della Porta (1538 – 1615) ve svém spise „Magiae naturalis sive de miraculis rerum naturalium libri XX" (1589 ve 2. vydání opraveném). Tyž kombinoval komoru temnou s konvexní čočkou, čím docílil obrazů svým daleko světlejších a tudíž živějších. Komory temné s jednoduchým malým otvorem v kovu (olovu) užilo se v nové době zhusta k účelům fotografování lamp Röntgenových, svítících paprsky, jež se čočkou nelámou a tudíž jen otvorem dávají obraz; tím vědecký význam komory temné s jednoduchým otvorem (bez čočky) značně vzrostl.

§5. Perspektiva.

Na přímočarém šíření se světla zakládá se perspektivní zobrazování předmětů. Oko kreslířovo tvoří středy zpětných, k nimž vedené přímky ke všem krajovým bodům předmětu. Tyto přímky protínají rovinu nákresnou v bodech, které spojíme čarami, čárám v předmětu odpovídajícími. Kreslíme tedy na obrázek takto v kontuře prostou stínu, světla a barvy v tom uspořádání a rozdělení, jak je na předmětu samém spatřujeme, vzniklé obrazy, které činí dojem předmětu. Tak vzniká perspektivický obraz předmětu.

Jiné užití přímočarého šíření se světla nalézáme při geodetických měřeních. Měří-li se větší vzdálenosti, musíme je, jak říkáme, vytýčiti, t. j. nastaviti po zemi tyčí neb kolíků do takových vzdáleností, aby od jednoho k druhému měřítko vystačilo. Vytyčování děje se stavěním tyče třetí mezi dvě na koncových bodech vzdálenosti dané stojících tak, aby pozorovateli všechny tři tyče v jedno splývaly.


K přesnějším měřením užívá se dioptru anebo ještě lépe dalekohledu s nitkovým křížem.

Fotometrie.

§6. Základní pojmy a definice.


Budiž dán světelný zdroj malých rozměrů, jakoby svítící bod O. Představme si tento obklopený dutou koulí o poloměru 1 metru. Každý cm^2 této koule bude osvětlen určitým množstvím světla; zvětšíme-li poloměr koule na 2 m, zvětší se povrch koule na čtyřnásobné, takže na 1 cm^2 dopadne pouze $\frac{1}{4}$ původního množství světelného.

obr. 1.



Označíme-li množství světla dopadající na 1 cm^2 intensitou osvětlení, pak z toho příkladu je patrno, že intensita osvětlení ubývá čtvereče se vzdáleností od zdroje světelného, předpokládaje ovšem, že paprsky světla dopadají vždy na plochu osvětlenou normálně a že nedochází nijakého zeslabení ústředním mezi svítícím bodem a plochou osvětlenou ležícím. (Obr. 1.)

obr. 2.



Dopadají-li paprsky na malou plochu A B šikmo (Obr. 2.), je intensita osvětlení menší než při dopadu kolmém, neboť plocha A' B', která jest k paprskům z O vycházejícím kolmá, jest menší než osvětlená plocha A B. Intensita osvětlení zmenšena je tu v poměru cosinusu úhlu A C A'.

Šíří-li zdroj světelný bodem, ale celou plochou, pak je ovšem intensita osvětlení závislá také na úhlu, který svírají paprsky na těleso osvětlené dopadající s plochou svítivou.

Pozorujeme-li intensitu osvětlení dle množství odražených paprsků, pak záleží tato na jakosti a úpravě povrchu tělesa osvětleného.

Měřením intensity světelné zabývá se fotometrie. Intensitu světelného zdroje měříme obyčejně intensitou osvětlení ve vzdálenosti 1 m. Jednotkou je intensita světelná normální svíčky parafínové 2 cm v průměru s plamenem 5 cm vysokým, aneb světlo lampy amylacetatové (Hefner-Alteneck 1884) o výšce plamene 4 cm.*) Poměr světelné intensity této lampy k intensitě svíčky normální je $\frac{1}{1{,}2}$.

Je-li tudíž i_n = intensita světelná svíčky normální,

i = " " zdroje daného,

a nalezneme-li dvě vzdálenosti r_n a r od téže plochy, která je oběma zdroji

*) R. 1884 byla přijata pařížskou internacionální konferencí zvláštní jednotka světelná daná světlem, které normálně vydalá 1 cm^2 právě tuhnoucího povrchu platiny. Jednotka tato se nazývá Violle-ova.

stejně osvětlena při normálném dopadu paprsků, pak dle hořejšího jest

$$\frac{i}{r^2} = \frac{i_n}{r_n^2} \quad \text{čili} \quad i = i_n \cdot \frac{r^2}{r_n^2}$$


Záleží tedy v každém měření vzjištění, zda-li intensita osvětlení jednoho i druhým zdrojem, způsobená je stejná. Je tedy na každém fotometru zařízení, kterým možno porovnávati intensity osvětlení, a dále jiné zařízení, jímž je možná jasnost plochy zmenšovati. Porovnání děje se okem, jež pozoruje dvě části plochy osvětlené jedním i druhým zdrojem. Přesnost, jaké tu lze docíliti, udávají různí pozorovatelé různou. Hlaneček, o který nutno zvětšiti neb zmenšiti intensitu jedné části osvětlené plochy, aby oko rozdíl osvětlení rozeznalo, udává

Bouguer na 1,6 %, Fechner na 1,0 %, Arago na 0,75 %
Mousson „ 0,33 %, Helmholtz „ 0,67 %.

Jasnost plochy zmenšuje se oddalováním zdroje intensivnějšího.

§7. Druhy fotometrů.

K nejstarším fotometrům slouží uvésti Bougnerův (1760), jehož schematické uspořádání ukazuje výkres 3.




ob. 3.

S_1 a S_2 jsou zdroje světelné, jichž intensity i_1 a i_2 chceme srovnávati. Oba zdroje osvětlují plochu AB, na níž kolmo stojí stínítko CD, které způsobuje, že část plochy CA je osvětlena pouze zdrojem S_1 a část plochy CB zase pouze zdrojem S_2. Jsou-li obě části plochy stejně jasné, pak platí: $\frac{i_1}{i_2} = \frac{a^2}{b^2}$.

Pozorování děje se při přisvětlení desek AB z místa O, zdroje světelné polohují se ve směru $S_1 S_2$ tak dlouho, až se žádaného osvětlení docílí.

Ritchieův fotometr složitější pomocí dvou zrcadel nebo pravoúhlého hranolu




ob. 4.

toho, že oba zdroje světelné jsou na téže přímce — ve skutečnosti pohnují se na témže měřítku.

Uspořádání patrno z obr. 4.

Rumfordův fotometr porovnává polostíny téhož předmětu způsobené oběma zdroji a hanící spolu, jak to naznačuje obr 5. Při měření dlužno dbáti toho, aby paprsky z obou zdrojů dopadaly pod týmž úhlem na plochu AB.



ob. 5.

Známým a nejvíce rozšířeným ze starších fotometrů je fotometr Bunsenův, při němž obě srovnávaná pole jsou na témže listu papíru, který má uprostřed okrouhlou parafinovou olejem nebo podobně utvořenou skvrnu. List papíru tak upraveného nalézá se uprostřed měřítka, podél něhož se oba zdroje srovnávané mohou pohnovati a na něm se jich vzdálenosti od papíru mohou změřiti. Přemování děje se tak dlouho, až mastná skvrna ze žíkna pozorovaná zmizí, čili až stejně mnoho světla přichází k oku jak od skvrny tak i okolního papíru. Zkušenost ukazuje však, že skvrna nikdy nezmizí, poněvadž papír nejen světlo odráží, ale také z části propouští a podobně i skvrna nejen světlo propouští, ale částečně i odráží. Pomocí dvou zrcadélek k papíru pod úhlem 45° na obou stranách postavených může pozorovatel pozorovati obě strany papíru a posouditi, zdali osvětlení skvrny je stejné — v tomto případě vada dříve zmíněná odpadá. Jinak lze prováděti měření na tomto fotometru methodou substitučním, která ovšem vyžaduje pomocného zdroje třetího a možná stálého. Konečně učiníme poměr $\frac{i_1}{i_2}$ dvojím pozorováním, když totiž napřed z jedné strany zaměříme S_1 tak, aby skvrna odtud pozorovaná mizela a pak totéž z druhé strany opakujeme. Jsou-li pozorované vzdálenosti zdrojů světelných od papírového stínítka při prvém pozorování r_1 a r_2, v druhém pak r'_1 a r'_2, lze se snadno přesvědčiti, že

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{r_1 r_2'}{r_2 r_2}$$

Ze strojů novějších budiž ponze jménem uvedeny: Lummer-Brodhun-ův fotometr (1889) na rovnost a na kontrast, Foly-ho (1888) fotometr diffusní, Wildův polarisační (1888) a L. Weberův (1883), jimž myšlénkou i konstrukcí velmi četné fotometry jiné se podobají

Rychlost světla.

§8. J. Galilei. 1642

Že je rychlost světla velmi veliká změnou proti rychlosti zvuku, k tomu poukazují četné zkušenosti života obecného. Za tmavé noci osvětlí na př. blesk krajinu v celé její obsáhlosti mžikem, najednou, kdežto rachot hromu trvá celé minuty. Že však rychlost tato není nekonečně veliká, to tušil G. Galilei (1564-1642), jenž vzal též pokus, jakým by se rychlost dala určiti. Dva pozorovatelé, světlonami opatření, postaví se za noci ve značné daleko od sebe; první z nich dá druhému v jistém okamžiku signál tím, že světlo svítilny zacloní, jakmile tento signál druhý pozorovatel uvidí, dá zpět signál prvému, tím že také světlo zacloní; tento zpáteční signál pozoruje pak první; patrně že dojde k němu o tolik později, kolik potřebuje světlo k proběhnutí dráhy od prvého pozorovatele k druhému a zase k prvému zpět. Pokus provedli žáci Galileovi; členové „akademie pokusu" (Accademia del cimento), ale výsledek jeho nemohl býti jiný než negativní - nebyl totiž všechny obyčejné distance zemské mizí proti rychlosti světla. Do té doby pak byla rychlost světla pokládána za nekonečně velkou, což ostatně pro vzdálenosti pozemské je tímtéž správné. Stanovení rychlosti světla mohlo tudíž jen při vzdálenostech nepoměrně větších se uskutečniti - a takovými jsou vzdálenosti interplanetární.

§9. O. Römer. 1676.

V letech 1670-1676 pozoroval na nově zbudované hvězdárně

Pařížské zároveň s ředitelem hvězdárny, jímž byl Giovanni Domenico Cassini, nadaný dánský astronom Olaf Römer (1644-1710). Předmětem pozorování byla pravidelná zatmění měsíců Jupiterových. Těchto velikán sluneční soustavy má totiž pět měsíců čili družic (satellitů). V dobách oněch byly ovšem známy jen čtyři, jenž jest Jupiteru nejbližší a jež v nejslabších teleskopech je viditelný, objevil Barnard teprve 9. září 1892. Těchto pět měsíců obíhá kolem Jupitera ve vzdálenostech, kteréž jen obyčejem - aby se dostala přehlednější - udávají v jednicích rovnajících se aequatoreálnému poloměru Jupitera, kterýž činí 70551 km čili 11,061 krát větší než aequatoreální poloměr naší země.

Tyto vzdálenosti jsou:

1.) 2,55 2.) 5,933 3.) 9,439 4.) 15,057 5.) 26,486.

Doba oběhu těchto měsíců jest poměrně krátká - zejména když se srovnává s dobou oběhu našeho měsíce. U druhého - jenž zde byl čítán za první pro předmět náš jest nejdůležitější - činí tato doba

$$42^h\,27^m\,33^s,51.$$


Roviny drah těchto měsíců jsou jen asi o 3° odkloněny od roviny dráhy Jupiterovy; následkem toho vstupují první čtyři měsíce při každém svém oběhu do stínu Jupiterova a zatmí se; také postaví se často zatmí, ale přece ne při každém oběhu, poněvadž jest od Jupitera vzdálenější. Páto zatmění měsíců Jupiterových zejména onoho prvého - dle starého pořádku — o němž nyní jediné budeme mluviti měla odedávna velkou důležitost pro plavbu námořní; neboť z okamžiku, kdy nastane neb končí, lze souditi na geografickou délku místa, kde se na př. loď nalézá, je-li okamžik ten přesně dle času na př. Pařížského neb Greenwichského napřed vypočítán. Proto byly záhy počítány tabulky pro tato zatmění - a právě vzhledem k praktické jich důležitosti chtěl Olaf Römer tyto tabulky zkontrolovati a po případě opraviti. Že byl důvod pro pozorování ta podnikl,

dlužno již napřed poznamenati, že není možno, ze země naší celý průběh zatmění pozorovati, nýbrž jen buď okamžiku vstupu nebo výstupu do kužele stínového.

Nalézá-li se totiž země naše v té části své dráhy, která jde od

opposice ke konjunkci Jupitera a slunce, lze pozorovati toliko výstup; naopak v druhé části dráhy od konjunkce k opposici jen vstup. (obr 6.)

obr. 6.



V době konjunkce nelze ostatně pozorovati vůbec za příčinou blízkosti slunce.

Výsledky pozorování Römerových ukázaly, že hledíc k průměrné hodnotě doby oběhu jakož i k vlastnímu pohybu Jupitera - okamžiky výstupu se opožďovaly, a naopak okamžiky vstupu se uychlovaly. O. Römer vysvětloval tyto nepravidelnosti správně tím, že země se oddaluje od Jupitera nebo zase k němu přibližuje, onde světlo zemi dohání, zde zase země jde světlu vstříc. Z celého zpoždění 16 minut 36 sekund, což je téměř = 1000 sekund, které odpovídá průměru dráhy zemské, lze počítati rychlost světla, je-li tento průměr v kilometrech znám. V okrouhlých číslech činí 300 000 000 km, a tudíž rychlost světla tisící díl, tedy 300 000 km.


Je zajímavo poznamenati, že vysvětlení Römerovo tehdadokonce nebylo ihned vědecky uznáno. Sám Cassini vysvětloval ony odchylky nepravidelností pohybu měsíce samého. Olaf Römer nedožil se již toho úspěchu viděti své vědecké výsledky potvrzeny se stanoviska docela jiné. - Vrátiv se do Kodaně, stal se zde professorem mathematiky, později byv zvolen za purkmistra oddálil se od prací vědeckých a zemřel 1710, tudíž 18 let před objevením aberrace světla, kteráž

vedla k tak skvělému potvrzení číselných výsledků Römerových methodou zcela vzdálenou.

Budiž poznamenáno ještě následující: Úkaz Römerův je povahou svou týž jako úkaz Dopplerův. Zde i tam jde o zdánlivou změnu trvání periodického pohybu následkem toho, že pozorovatel se oddaluje neb přibližuje. Principielně je jednoznačno, zda-li se změny v trvání periodického pohybu stanoví okem nebo uchem. Analogie jest zjmak úplná.

Můžeme si věc ještě jiným způsobem objasniti. Dejme tomu, že bychom měli ručičku (obr. 7.), která by kolem osy O na př. hodinovým strojem se udržovala v rotaci periody T. -

obr. 7.



Kdyby se pozorovatel s dostatečnou rychlostí k ručičce blížil, viděl by, že se otáčí v kratší době T' - neb naopak v době delší T'', kdyby se vzdaloval. Dejme tomu, že by hodinový stroj při každém průchodu ručičky rovnovážnou polohou dal akustický signál na př. udeřením na zvonec. Tak by pozorovatel slyšel tyto signály následovati po době buď v dobách kratších T' neb delších T'', když by se stroji blížil neb od něho vzdaloval. V prvém případě by šlo o rychlost světla, v druhém o rychlost zvuku; poněvadž jest tato asi miliontkráte menší proti oné, ukázalo by se ono uyvětlování neb opožďování akustických signálů ovšem již při rychlosti pozorovatele mírné, když by optický nebylo viděti pravého.


[* § 10. J. Bradley. 1728. *]

[* Jak z vyložení 8 předchozího patrno, objevil O. Römer rychlost světla nehledaje ji; 50 let později opakovalo se totéž. James Bradley (1692-1772) hledal roční parallaxu jisté hvězdy a objevil aberraci a z té opět rychlost světla. Pozorování svá začal na hvězdárně v Kew koncem r. 1725 ve spojení se Samuelem Molyneux, jehožto jméno by mělo v

dějinách aberrace spolu bytí uváděno. Účelem pozorování bylo stanoviti, roční paralaxu stálice γ na hlavě draka (souhvězdí Draco), kterážto stálice prochází téměř zenitem oné hvězdárny.

Jak známo, pozoruje se poloha hvězdy na rozmanitých místech povrchu zemského. Aby bylo možno získaná tato pozorování vespolek srovnávati, redukují se na střed zemský. Tím vzniká poloha hvězdy geocentrická, avšak střed země mění své místo. Proto se redukují pozorování dále na střed slunce. Tím vzniká poloha hvězdy heliocentrická.

Obr. 8.



Budiž A (obraz 8) místo pozorovací na povrchu země, S nějaká hvězda (na př. Jupiter). - Směr CA vede k zenitu geocentrickému Z'. - Úhel p jakožto rozdíl směrů AS a CS jest paralaxou hvězdy. - Zaveďme úhel $Z'AS = \xi$. Patrně jest:

$$\frac{\sin p}{\sin \xi} = \frac{r}{R} \quad \text{čili} \quad \sin p = \frac{r}{R} \sin \xi.$$

Je-li $\xi = 90°$, jest p maximum. Kdyby země byla koulí (homogenní neb z homogenních kulových vrstev složená) a v klidu, byl by zenit geocentrický týž jako zenit skutečný. Úhel ξ by pak udával odlehlost zenitovou. Při $\xi = 90°$ byla by hvězda v horizontu pozorovacího místa. Proto se zove maximální paralaxa p pro $\xi = 90°$ paralaxou horizontální.

Ve skutečnosti, jak známo, není země koulí a jest v pohybu. Proto se zenit skutečný liší od geocentrického — tíže neníť ke středu zemského ellipsoidu. Proto také není — přísně vzato — hvězda v horizontu pro $\xi = 90°$. Nicméně pojmenování „paralaxa horizontální" se podržuje.

Radiusvector r není konstantou. Největší jest pro rovník, $r = a$, kde a je velká poloosa zemského ellipsoidu. Pro $r = a$ jest tedy zase horizontální paralaxa maximum. Proto se zove aequatoreální horizontální paralaxou. V tom smyslu na př. mluví se o paralaxe slunce a míní se tato zde uvedená.

Úhel $Z'CS$ se zove geocentrickou odlehlostí zenitovou. Patrně jest:

$$Z'CS < Z'AS$$

t. j. následkem paralaxy vidíme hvězdu ve větší odlehlosti zenitové, t. j. níže (blíže horizontu).


Paralaxa p dosahuje následkem rotace země periodických změn dle toho, jak se pozice hvězdy průběhem dne mění. Proto se jí říká paralaxa denní.

Oproti této rozeznáváme paralaxu roční. Během roku (siderického) přicházíme země na své dráze kolem slunce do rozmanitých poloh. V každé poloze jeví se nám hvězda geocentricky na jiném místě. Proto místo se určuje souřadnicemi, na př. délkou a šířkou hvězdy (souřadnice ekliptiky).

V obr. 9. je nakreslen slunce jako střed oblohy nebeské, dráha země kolem slunce, hvězda S, její střední pozice Σ, jak by se na obloze nebeské jevila slunce, její délka počítaná na ekliptice od jarního bodu ve smyslu (zdánlivého) pohybu slunce, její šířka od ekliptiky na největším polokruhu, jehož pólem ekliptiky a střední pozicí Σ vedeném.

Vliv paralaxy roční jeví se celkově tím, že každá hvězda opisuje

ob. 9.



kolem své střední polohy Σ během roku uzavřenou křivku, která je všeobecně elipsou, může však býti též (bezmála) kruhem, je-li hvězda v pólu ekliptiky (šířka = 90°) nebo je blízce, ale také přímkou, je-li hvězda v ekliptice samé (šířka = 0°)

Rozměry této elipsy souvisí jednak s polohou hvězdy na obloze nebeské, a sice její šířkou, jednak s její od nás (slunce) vzdáleností.

Pojmu takový Bradley celkově vzdutku také pozoroval, ale pozice hvězdy na nové ellipse následovaly zcela jinak po sobě, než

se mnilo — dle paralaxy — očekávati. Rozdíl tento jest v obr. 9. znázorněn. Posicím I, II, III, IV o 90° od sebe rozdílným naší země odpovídající pozice 1, 2, 3, 4 hvězdy následkem paralaxy.

Avšak, následkem aberrace následují pozice po sobě dle pořádku a, b, c, d. Jest patrno, že jsou pozice tyto proti oněm jakoby o 90° otočeny zpět.

Pro pozice paralaktické 1, 2, 3, 4 rozhoduje dle směru radiusvektor vzatý ve směru od země k slunci (zpátečně tedy!)

Pro pozice aberrační a, b, c, d rozhoduje naproti tomu směr pohybu země A, B, C, D.

Dle koordinat: délka a šířka jeví se rozdíl též takto: Když následkem paralaxe nastávají největší změny v délce, nastávají následkem aberrace největší změny v šířce — a naopak.

Při pozorování hvězd je důležito, jaké postavení vzhledem ke slunci geocentricky hvězda zaujímá.

Mluvíme o konjunkci a oppozici hvězdy se sluncem čili dohromady o syzygiích a pak o quadratuře dle toho, je-li v délce rozdíl 0° a 180° nebo 90° a 270°. Rozdíl v paralaxi a aberraci lze pak stručně také tak vyslovit: Změny polohy, jež se pozorují následkem paralaxy v syzygiích, pozorují se následkem aberrace v quadraturách — a naopak.


Co však je hlavní věcí: Rozměry ellipsy aberrační souvisí sice také s polohou hvězdy na obloze nebeské, a sice její šířkou, ale nikoli se vzdáleností, tak sice, že hlavní poloosa oné ellipsy aberrační je konstantní; vedlejší pak se mění dle toho, je-li hvězda od pólu ekliptiky vzdálena. Je-li pólu ekliptiky (šířka = 90°) je ona poloosa téměř rovna poloose hlavní; odtud pak ubývá této poloosy až na 0, když se hvězda nalézá od pólu ekliptiky dále a dále odlehlou, až je v ekliptice samé (šířka = 0°).

J. Bradley byl veden, jak se opravuje k správnému vysvětlení aberrace, kterouž na hvězdě γ Draconis pozoroval, úkazem analogickým, jehož si všiml již plavbě na lodi po Temži. Ukazovala totiž, vlajka lodi jiný směr větru dle toho, byla-li lod'

v klidu neb *v pohybu*. Když lod taková je v klidu a vane vítr na př. k severu, stáčí se vlajka také proněkud na sever, takže pozorovatel by soudil na vítr severozápadní. Také na paměnku lze dle kouře [na lodi] z komína provozujícího totéž pozorování učiniti. Velmi pěkně lze úkaz podobný pozorovati při jízdě po železnici. Když prší a kapky vody padnou na sámec okna a zde se roztříknou zmechanizované při padání stopy na tabuli okna naznačují tyto stopy pásmka *svisnou*, je-li vlak *v klidu*, naproti tomu pásmku *ve směru jízdy nakloněnou*, když vlak je *v pohybu*.

Úkaz aberrace je zcela analogický

obr. 10.



Budiž A země níže, pohybující se rychlostí = v směru A K. Na zemi dopadá světlo směrem Z A a rychlostí = V. Toto rozložíme na dvě složky, z nichž jedna je = v, poněvadž sami touto rychlostí se pohybujeme, není pro nás znatelnou – nepozorujeme ji – a zbývá jen druhá složka, která jde směrem Z A o úhel ε rozdílným od původního. Je-li úhel Z A K = ψ platí patrně:

$$\frac{\sin \varepsilon}{\sin \psi} = \frac{v}{V}$$

tudíž $\sin \varepsilon = \frac{v}{V} \cdot \sin \psi$.

Patrně je ε *maximum*, když je ψ = 90°, t. j. když země probíhá *širokým kruhem hvězdy* (obr. 9 ←), jinak řečeno: když je *geocentricky* hvězda se *slunce* v *konjunkci* neb *oppozici*. Maximální hodnota ε je 20,5". Vzhledem nepatrnosti tohoto úhlu je komponenta V' rychlosti rovna V. Proto se při aberraci světla mluví jen o tom, že se *směr* rychlosti světla změní, nikoli však, že by se i její velikost měnila. Proto lze také psáti pro maximální ε

$$\operatorname{tg} \varepsilon = \frac{v}{V}.$$

Jádro jevu, který aberraci zovem, vězí tedy v *relativnosti* našeho pozorování. Vlastní pohyb země našemu pozorování ujde. Když tedy směr, v jakém světlo dopadá, vztahujeme *právě na zemi naši*, *neznamenáme* té komponenty, která je s rychlostí pohybu této země *identickou*.*]


[* § 11. *Význam parallaxy slunce při astronomických methodách stanovení rychlosti světla.**]

[* Stanovení rychlosti světla methodou buď *Römer* nebo *Bradley* opírá se o *parallaxu* je slunce, a to *equatoreální horizontální*.


Při methodě *Römer* nutno znáti průměr *2 R dráhy zemské* – a sice *střední* – a ten se počítá ze *střední parallaxy* slunce.

Právě tak při methodě *Bradley* nutno znáti *střední rychlost pohybu* země a ta se opět počítá z doby oběhu (rok siderický) a ze středního poloměru R dráhy zemské.

obr. 11.



obr. 12.



Patrně jest (obr. 11.): $R = \frac{a}{\sin p}$.

Úhel p je *velmi malý*, sotva 9". Vzhledem k tomu říkává se, že ohromná parallaxa 2p jest úhel, pod kterým ze středu slunce se jeví equatoreální průměr Za země naší (obr 12.). Přísně vzato není A B tímto průměrem, nýbrž tětivou; avšak rozdíl je nekonečně malý. Proto také se může úhel A C B (obr 12) za pravý považovati a psáti:

$$R = \frac{a}{\operatorname{tg} p}.$$

Poloměr rovnikový a jest (Listing)

$$a = 6377,38 \text{ km}.$$

Z toho pak vychází pro geografickou míli

$$\text{míle} = 7,4204 \text{ km}.$$

Parallaxa p určuje se nejpřesněji pozorováním přechodu Venuše před slunce m. Hodnota „Encke" (z r. 1824) byla

$$p = 8,''571.$$

Dle novějších pozorování se ukazuje, že hodnota tato je malá. Pravděpodobnou je asi

$$p = 8,''85$$

Z toho se pak počítá K a z toho rychlost světla V.

Vychází

$$V = 297000 \frac{\text{km}}{\text{sec}}.$$


Zajímavou je však poznámka následující: Kdyby bylo lze rychlost V samostatně bez astronomických veličin určiti t.j. methodami čistě fysikálními, bylo by možno zpět počítati parallaxu p, kteráž by pak – dle přesnosti těchto fysikálních měření rychlosti světla – mohla i správněji vyjíti než methodami astronomickými.

Takovéto methody byly skutku – v polovici našeho století – vymyšleny a provedeny způsobem skutečně duchaplným. Jsou to methody Hyppolyte Fizeau (* 1819 v Paříži) a Jean B. L. Foucault (1819–1868 v Paříži). *]

[* § 12. Fizeau. 1849. *]

[* Upravení této první čistě fysikální methody k měření rychlosti světla ukazuje schematicky obr. 13.

obr. 13.



Ze silného zdroje světelného v bodu J vycházejí paprsky na zrcadlo z_1 a odrážejí se tu tak, že vycházejí systémem čoček A paralelně, aby projdouce několika kilometry dopadly na dalekohled B, kde se odrážejí v zrcátka z_2 a postupují touže cestou zpět do bodu J.

V chodu těchto paprsků na místě C postaveno je ozubené kolo které buďto zubem sám neb mezizubím stejně velikým dalším chodu paprsků nepřekáží, aby pozorovatel (D) paprsky od z_2 odražené mohl pozorovati, je zrcátko z_1 pouze do polovice zrcátkem jinak jinak průhledno.

Otáčí-li se ozubené kolo zvolna, pak pozorovatel střídavě spatří a nespatří obraz bodu J dle toho, jak zuby kola paprskům zabrání neb mezizubí je propustí. Při rychlejším otáčení bude míti pozorovatel trvalý dojem světla, poněvadž střídání světla a tmy dítí se bude v kratší době než je ta, kterou trvá dojem zrakový. Je však možno docíliti takové rychlosti, že pozorovatel vůbec nevidí obrazu J, což nastane tenkrát, když výměna zubů a prostorů mezizubí stane se právě v té době, v níž světlo od J proběhne k z_2 a zase se vrátí. Je-li znám počet zubů a mezer na kole, rychlost jeho rotace, vzdálenost obou dalekohledů, pak lze počítati z těchto čísel rychlost světla V.

Budiž vzdálenost J od z_2 .. l, počet otočení kola, při nichž světlo zmizí za sekundu n, počet zubů z, pak proběhne světlo dráhu $2l$ za dobu $\frac{1}{n.2z}$, z čehož plyne:

$$V = 4 l n z.$$

Při pokusu Fizeauově bylo: $l = 8,633$ km

$z = 720$

$n = 12,6$

$V = 313000 \frac{\text{km}}{\text{sec}}$

tudíž:

Ozubeného kola bylo užito jako sirény Savartovy, z výšky příslušného tónu stanoveno n.

Zcela patrno, že při dvojnásobné rychlosti v otáčení světelný obraz J se zase objeví, při trojnásobné naopak zase zmizí atd.

Methodou Fizeauovou mnohým zařízením zdokonalenou dosáhl A. Cornu (1871–74) velmi přesného výsledku pro rychlost světla. R. Wood praví ve své „Physical Optics" že Cornu nasel r. 1874 rychl. světla 300 330 km/sec ve vzduchu a 300 400 km/sec ve vakuu.


Střed jeho měření dán je číslem 299950 ± 400 $\frac{km}{sec}$. Za zdroj světelný užíval Cornu za dne světla slunečního, za noci světla Drummondského, kteréž má před elektrickým výhodu, že je klidným. Distance l byla tenkráte 23 km.*]

[* § 13. Foucault. 1850. *]

[* Krátce potom, kdy Fizeau s úspěchem překvapujícím rychlost světla určil, provedl Foucault pokus, který již dříve r. 1838 navrhl D.F.J. Arago (1786–1853); týž neuhnul však pokus provésti sám následkem slabosti zrakové; ostatně byl Arago k návrhu svému veden pokusem, kterýmž Ch. Wheatstone (1802–1880) s úspěchem stanovil rychlost šíření se elektrického výboje v drátech. Pokus Foucaultův byl zvláště překvapujícím proto, poněvadž se tu podařilo rychlost světla určiti v rozměrech pracovní síně, kdežto pokus Fizeauův vyžadoval vzdálenosti přece aspoň jedné geografické míle.

Schematicky naznačen je základ Foucaultovy methody obr. 14.
A B C je duté zrcadlo pevně postavené, C D jeho optická osa.
E D F je rovinné zrcadlo, které se kolem osy ⊥ D (kolmo k rovině nákresné)

obr. 14.



může s velikou rychlostí otáčeti. L je světící bod. Představme si zrcadlo otáčivé v poloze E F, pak světlo z L vycházející odráží se od roviny E F tak, že postupuje směrem C D k oku O pozorovatele, kterýmž podobným zařízením jako při methodě Fizeauově obraz bodu L spatří. Otáčí-li se zrcadlo s velikou rychlostí, pak papírek z C se vracející nezastihne zrcadlo otáčivé v poloze E F, ale v poloze poněkud otočené E' F', tak že papírek odražený je viděti v O. Ubrání obrazu oproti předmětu obnáší patrně dvojnásobný úhel, o který se otočilo zrcadlo E F za tu dobu než papírek proběhl dráhu D C a C D. Budiž tato dráha $2l$, d poznání obrazu měřené ve vzdálenosti r od zrcadla otáčivého, φ úhel E D E'. Dána je tedy onu dobu přístupnou rychlosti světla výrazem $\frac{2l}{v}$ a doba pro otočení zrcadla $\frac{\varphi}{2\pi n}$, kde n značí počet otoček za 1 sekundu. Tedy srovnáním obou výrazů

$$v = \frac{4\pi n l}{\varphi} \quad \text{neb (poněvadž } \varphi \text{ je malé)}$$

kladouce $\varphi = \frac{d}{2r}$. $\quad v = \frac{8\pi n r l}{d}$.

Dle Foucaultova měření $v = 298000 \frac{km}{sec}$

Čím je dráha $2l$ menší, tím větší rychlostí nutno se otáčeti zrcadlo E F, proto Foucault užíval pěti dutých zrcadel. Poměr d bylo měřeno na velmi jemné na sklo vyryté stupnici, která odečítána mikroskopem.

Methodu Foucaultovu zdokonalili A. Michelson (1878, 80, 85) ve Washingtonu a Newcomb (1885.). Výsledky měření Michelsonových jsou:*)

$$v = 300140 \pm 500 \ (1878)\,;\ 299940 \pm 50 \ (1880)\,;\ 299850 \pm 60 \ (1885)\,;$$

Newcombových:

$$v = 299860 \pm 50 \ \frac{km}{sec}.$$

Střed všech nejlepších těchto měření fysikálních dává číslo: (t. j. fysikálních method pro měření rychl. světla)

$$v = 299890 \pm 30 \ldots \quad *]$$


*) R. Wood ve své „Physical Optics" míní, že Michelson obdržel jakožto rychlost světla (na vakuum redukovanou) číslo $299\,910 \pm 50 \frac{km}{sec}$
a Newcomb ve Washingtonu v l. 1880–82 „ „ „ „ $299\,860 \pm 30 \frac{km}{sec}$

II. Odraz světla.

(Katoptrika).


§ 14. Základní zákony odrazu světla.

Odraz světla nastává, když paprsky světelné dopadnou na rozhraní dvou ústředí I a II (obr. 15.) - Toto rozhraní může ovšem býti plocha jakákoliv. Formulujeme však základní zákony předpokládáme jediný paprsek - jakožto representant všech j vůči tomu nemusíme si všímati celé této plochy, nýbrž toliko bezprostředního okolí bodu dopadu O. Stačí pak takovéto nejbližší okolí bodu na jakékoliv ploše čočícího může se vždy za rovinné pokládati, jest to element plochy, který vždy platí za rovinný, jako element křivky jakékoliv platí za přímý.



obr. 15.

Nečiníme tudíž všeobecnosti žádné újmy, jestliže v následujícím budeme předpokládati, že jest ústředí II od ústředí I odděleno rovinou R' R. (obr 16.)



obr. 16.

Další pojmy, jež zde zavádíme, jsou: bod dopadu O, kolmice dopadu K'K a rovina dopadu (kolmicí dopadu a paprskem položená, v obr. 16. rovina nákresná) úhel dopadu α, úhel odrazu α'.

Zákony odrazu světla jsou dva:

1.) Paprsek odražený, zůstává v rovině dopadu.

2.) Úhel odrazu se rovná úhlu dopadu, t. j. α' = α

[* § 15. Význam zákonů odrazu světla. *]


[* Přechází-li světlo z bodu A do bodu B přímo, je dráha

A B = minimum.

Totéž platí, děje-li se přechod odrazem na rovině R' R (obr 17).

$s_1 + s_2$ = minimum.

Důkaz jest počtem diferenciálním jednoduchý.



obr. 17.

$$\sqrt{a^2+x^2} + \sqrt{b^2+y^2} = \text{minimum}$$

$$x + y = \text{const}$$

Diferencujeme:

$$\frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}\,dx + \frac{y}{\sqrt{b^2+y^2}}\,dy = 0\,, \qquad dx + dy = 0\,;$$

z toho:


$$\frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}} = \frac{y}{\sqrt{b^2+y^2}}$$

$$\sin\alpha = \sin\alpha'$$

$$\alpha = \alpha'.$$

$$\alpha = 180 - \alpha'$$

Řešení odpovídalo by přímočarému šíření se světla tak jak obr. 18. znázorňuje.



obr. 18.

Uvedenou zde interpretaci zákonů odrazu podal Pierre Fermat (1608-1665, † Toulouse). Srovnej níže lom světla. *]

§ 16. Odraz paprsků homocentrických.

Ve skutečnosti nemáme paprsků jednotlivých, nýbrž paprskové svazky. Z těch jsou nejdůležitější paprsky homocentrické, z nichž středu - svítícího bodu - vycházejíce. Nastává tudíž úloha vyšetřovati, jak se takovéto paprsky - jako optický útvar celkový považovány - změní, když dopadnou

na plochu odrážející. Plochy tuhové, zejména když jsou dokonale leštěny, zoveme zrcadly.

Dlužno zde podotknouti, že sebe lépe bronzová a hlazená plocha má vždycky přímě vzato jisté nepravidelnosti povrchu, které se při odrazu její světlem ve všech směrech odrazeným. Tím vzniká světlo diffusní, které způsobuje, že předměty, jež nejsou samy zdroji světelnými, vidíme. Zrcadlo ideálně dokonalé bez uvedených zde nepravidelností povrchu nebylo by možno vůbec viděti.

Podle geometrické povahy plochy možno rozeznávati zrcadla velice rozmanitá. Z těch zvláště vytknuty zrcadla sférická, jež mohou býti buď konkavní (dutá) anebo konvexní (vypuklá). Přechod od jednoch k druhým činí zrcadlo rovné, které lze tudíž počítati k sférickým.


Vedle toho se uvádějí: zrcadla cylindrická (válcovitá) konická (kuželovitá), paraboloická a j., kteráž mají však důležitost podřízenou.

Zrcadla rovná.

§ 17. Svítící bod.

Budiž rovinu $R'R$ (obr. 19.) rovinou zrcadlící a bod A bodem svítícím, tedy střediskem paprsků homocentrických. Z těchto paprsku vedme především paprsek hlavní; jest to ten, který na rovinu zrcadlící dopadá kolmo; tento se odráží ve směr svůj vlastní SA. Vedle toho vedme jakýkoliv paprsek jiný, na př. AM, kterýž se odráží ve směr MZ.

obr. 19.



Oba odražené paprsky SA a MZ se patrně rozbíhají; prodloužíme-li je zpětně, potkají se v bodě B.

Vedme dále jakýkoliv jiný paprsek AM', který se odráží ve směr $M'Z'$. Na základě nejjednodušších úvah geometrických seznáme ihned, že také

tento paprsek odražený, prodloužíme-li jej zpětně probíhá bodem B.

A tak jest tomu u všech paprsků; všechny odrážejí se tak, jakoby vycházely od bodu B. Tento bod je tudíž jich společným střediskem po odrazu, jako byl bod A před odrazem.

Tím docházíme výsledku velice důležitého. Paprsky homocentrické odražející se na rovině zůstávají homocentrickými.

Bod B, středisko paprsků odražených, nazývá se obrazem bodu B. Dopadají-li totiž paprsky odražené do oka našeho, zdá se nám jakoby od bodu B za zrcadlem ležícího vycházely, jakoby tento bod byl bodem svítícím. Vskutku se však paprsky v tomto bodě neprotínají, nýbrž toliko v myšleném prodloužení. Proto také nazýváme obraz B geometrickým neb virtuelním.

Zavedeme-li $SA = a$, $SB = b$,


je patrně $b = -a$.

Máme-li tudíž polohu obrazu B nalézti, postačí, když vedeme jen paprsek hlavní a tento prodloužíme o stejnou délku.

§ 18. Svítící předmět.

Je-li na místě svítícího bodu dán svítící předmět, můžeme tento v myšlénkách rozložiti na jednotlivé svítící body, některé z nich pak, jež pro tvar daného předmětu jsou zvláště charakteristickými, vytknouti a k nim obrazy příslušné konstruovati (obr. 20.)

obr. 20.



Je patrno, že obraz je tak veliký jako předmět, že je tohož tvaru — avšak přece ne v něm shodný, kongruentní, nýbrž s ním souměrný čili symmetrický. Rozdíl mezi shodností a souměrností vynikne z některých příkladů. Držíce před zrcadlem ruku levou vidíme v zrcadle ruku pravou; rukavička levá doplňuje se s obrazem svým v úplný pár. Písmeno p dává v zrcadle písmeno q, anebo písmeno d dává v zrcadle písmeno b; podobně číslo IX dává v zrcadle číslo XI a pod.

§79. Užívání zrcadel rovných.

Obrazy vznikající zrcadly rovnými jsou nejdokonalejší, které známe. Každý bod svítící zobrazuje se zase v bodě, v přísném slova smyslu; není zde žádná t.zv. aberrace, jakou poznáme později u zrcadel sférických. Zrcadlo může při tom býti libovolně veliké – čímž obrazy jsou světlejší v tom smyslu, že svazky paprskové zrcadlem odražené jsou obsáhlejší.


Vše to ovšem předpokládá, že zrcadlo je přesně mathematicky rovinné. Podmínka tato nedá se ostatně tak snadno realisovati. Naopak zaručiti přesně rovinnost zejména u velikých zrcadel jest velmi nesnadno.

Zkouška děje se dalekohledem. Byť zaměří se na obraz nějakého předmětu v zrcadle a přiblíží se, zda-li se v dalekohledu obrysy jeví zcela ostře, zejména také při větších vzdálenostech.

Jakožto příklady, kdy se rovných zrcadel ve fysice k vědeckým účelům užívá, budte uvedeny:

Heliostat (obr. 21). Slouží k tomu, aby se odražené světlo slunečních do síně pracovní vádělo ve směru a pravidla horizontálním. Zrcadlo bývá zde skleněné na zadní ploše folií zrcadlící opatřené. Tím se ohnutě světlo slunečních odráží dvakrát, slabě již na přední, silněji na zadní ploše. Tato dvojitost při jemnějších pokusech optických bývá často na závadu. Dá se odstraniti, když by se podržel jen odraz na přední ploše, naproti tomu odraz na zadní ploše, když by se odstranil – černým nátěrem nebo užíváním černého skla. Avšak světlo takto odražené je málo výdatné. Lépe je užívati zrcadel kovových, dokonale na přední ploše odrážejících; jsouť taková, mají-li býti dokonale rovinnými a větších rozměrů, jsou drahá. Zrcadla skleněná na přední ploše stříbřená a hlazená se na vzduchu zálivy kaší, vlivem plynů obsahujících síru (sirovodík a pod.). Tyto jsou zrcadla skleněná s folií na zadní


obr. 21.



ploše nejrozšířenější přes závadu mnohonásobných odrazů. Výborné služby konají heliostaty opatřené hodinovým strojem, kterými se během celých hodin zachovává horizontální směr paprsků odražených; zrcadlo při tom jde za sluncem; dle jeho deklinace nutno stroj pro každý den v roce přiměřeně zaříditi. Při značnější změně místa nutno též ke změně geografické šířky přihlédnouti. Heliostaty takové jsou ovšem značně dražší než obyčejné, které se staví rukou, a proto méně rozšířené.

Z dalších strojů, při nichž zrcadlení na plochách rovinných jest hlavní věcí, budte uvedeny sextant zrcadlový, reflexní goniometr, heliotrop Gaussův. Poslední zakládá se na věci zajímavé, že paprsky dopadající na soustavu dvou rovinných k sobě kolmých zrcadel odrážejí se vždy ve směru protivném původnímu (obr. 22.)

obr. 22.




Důležito jest užívání rovinných malých zrcátek při jemných galvanometrech a magnetometrech (methoda Poggendorff) jakož i všude tam, kde jde o přesné měření malých uhlů, o které se těleso nějaké otočí (na př. při měření torse atd.) –

Z fakultice užívali jsme zrcadlových analysátorů ke studiu vibračních pohybů.

U všech takovýchto strojů přichází k platnosti věta znázorněná obrazcem 23: otočí-li se zrcadlo (z polohy Z_1 do Z_2) o úhel α, otočí se obraz B svítícího bodu A (z polohy B_1 do B_2) o úhel 2α.

obr. 23



Věta jest opticky applikací známé poučky geometrické, že jest úhel středový o kružnici dvojnásobný obvodového při stejném oblouku (zde $B_1 B_2$).

Zajímavé zjevy vznikají u zrcadel rovnoběžných aneb o libovolný úhel k sobě skloněných. (Obrazy mnohonásobné, kaleidoskop Brewsterův.)


5 zach.

Zrcadla sférická.

§20. Definice.


Zrcadlo sférické jest úsekem (segmentem) koule (obr. 24). Geometrické pojmy k němu náležející jsou tudíž: Střed zakřivení C, poloměr křivosti r, vrchol S. Středový úhel ω stanoví otvor zrcadla. Přímka vedená středem C a vrcholem S jest osou zrcadla. Vede-li se přímka středem C a jiným bodem S' zrcadla, obdrží se osa tak zvaná

obr. 24.



vedlejší oproti oné, jež se pak zove hlavní (obr. 25.) Vzhledem k tomu, že na kouli jeden bod má tytéž vlastnosti jako každý jiný, tedy S takové jako S', a že bod středový C vůči všem bodům má tutéž polohu, jest patrno, že osa vedlejší má tytéž geometrické vlastnosti jako hlavní, kteráž jen tím se vyznačuje že bod S jest středním celého zrcadla, takže na hlavní jest vzhledem k omezené zrcadlící ploše osou souměrnosti.

obr. 25




Podle toho, na které straně onen kulový úsek zrcadlí, rozeznáváme zrcadla sférická konkavní, a konvexní. Jest výhodno vycházeti od zrcadla konkávního jakožto případu typického a z toho pak jednoduchým způsobem přejíti k zrcadlu konvexnímu. Důvod toho jest, že odrážející plocha sférická konkavní jest plochou souvislou, jak z výkladů dalších vyvítne.

§21. Aberrace sférická.

Mějmež zrcadlící plochu sférickou (obr. 26.) a na straně na př. konkávní světící bod A, kteréž bez újmy všeobecnosti můžeme voliti na hlavní ose. Jeden z homocentrických paprsků, které z tohoto bodu vycházejí, jdeš


středem C zrcadla a dopadá tudíž na sférickou plochu normálně; tento paprsek A S zovemeš hlavním; odráží se ve svůj vlastní směr. Vedeme další paprsek A M tomuto hlavnímu velmi blízký a sestrojíme k němu paprsek odražený. Dále vedeme paprsek A M' od hlavního vzdálený a sestrojíme k němu též paprsek odražený. Konstrukce ukáže ihned, že tyto tři paprsky odražené dokonce neprotínají se v témže bodě. Nastává zde tudíž úkaz nový, kterýmž se zrcadla sférická liší podstatně od zrcadel rovinných. Paprsky vycházející z téhož světícího bodu A, tudíž homocentrické, dopadnuvše na zrcadlo sférické a odrážející se neprotínají se pod odrazu v témže bodě, nýbrž v celém pásmu bodů, kteréž tvoří v rovině nákresné křivku a v prostoru rotační plochu. Takovéto plochy zovemeš v optice všeobecně kaustickými (καίω = pálím), zde, kde jde o jev katoptrický zovemeš je katakaustickými. Jev sám má základ svůj ve sférickém tvaru a proto se zove též sférickou aberrací zrcadel.

obr. 26.



Velmi jasně vyniká křivka katakaustická v obr. 27., kteréž jest proveden pro paprsky na zrcadlo rovnoběžně dopadající; také takové paprsky jsou homocentrické, ale jich „centrum" jest v nekonečné dálce.


obr. 27.



Ke studiu experimentálnímu křivek katakaustických hodí se velmi dobře úzký rovinný proužek zrcadlový polokruhově stočený (obr. 28.) Jest to tedy vlastně zrcadlo kruhově cylindrické, jehož rozměry dle stran jsou malé,

tak že rozhodnuje tvar kruhový. Postavíli se proti tomuto zrcadlu zdroj světelný na př. svíčka neb plynový plamen, podélný otvor v okenici a pod., objeví se na bílém rovinném podkladu křivky katakaustické velmi krásné.


obr. 28.



[* Měření aberrace sférické vynikne z následující úvahy:

Budiž B bod, kde se protínají paprsky centrální odražené od sférického zrcadla $S_1 S_2$. Krajní paprsek $S_1 B'$ neprotíná se s osou v téže bodě B, nýbrž v bodě poněkud bližším B_1; prodloužen až k rovině B kolmo k ose vztyčené dává průsek B'. Sférickou aberrací longitudinální paprsku $S' B'$ nazýváme délku $B_1 B'$, sférickou aberrací laterární pak délku $B B'$. Úvaha tato platí ovšem pouze pro paprsky, které vycházejí z bodu na ose hlavní ležícího. Pro paprsky vycházející z bodu mimo tuto osu ležícího nalezneme podobně velikost aberrace, sestrojíme-li osu vedlejší, t.j. přímku jdoucí bodem svítícím a centrem plochy sférické a promítneme-li aberraci na této ose nalezenou do hlavní osy. Dělí se pak patrně longitudinální aberrace na ose vedlejší od longitudinální aberrace na ose hlavní faktorem, který jest dán kosinusem sklonu obou os. Obyčejně bývá tento úhel velmi malý, takže velmi přibližně pro body v jedné a téže rovině k ose hlavní kolmé jest jedna a táž aberrace longitudinální. *]

obr. 29.



Jest jediný prostředek odstraniti aberraci sférickou. Záleží v tom, abychom vyvrtili paprsky krajní a připustili jen paprsky hlavnímu blízké, čili jak říkáme paprsky centrální. Paprsky krajní zadržují se vhodnými diaphragmaty; anebo se nadělají zrcadla kotoví jen v takových poměrech, abych jich otvor

byl velmi malý. Přímě vzato musil by otvor býti nekonečně malý, t.j. zrcadlící sférická plocha kolem vrcholu S se rozestírající musila by býti téměř rovinnou, aby její sféricita nepůsobila právě „sférickou“ aberraci. Když podmínka tato vyplněna, pak lze říci, že paprsky homocentrické zůstávají také po odrazu homocentrickými, t.j. vycházející od svítícího bodu A sbíhají se po odrazu k bodu B, kterýž pak jest obrazem onoho.

Takovéto body A a B vystupují pak jakožto sdružení (konjugované.) –

Ve všech následujících úvahách o zrcadlech sférických budeme vždy a všude předpokládati, že otvor zrcadla je velice malý, t. j. část kolem vrcholu S téměř rovinná. Ovšem žádá zvětšitelnost, aby se výkres na plíč od oky provedl zvětšeně. Abychom však i při tom byli stále připamatováni, že to jest výkres jakoby ve směru k ose příčném zvětšovací – při čemž zrcadlo kolem vrcholu S rovinné se také zvětšuje jako rovinné – budeme vždy zrcadlo kreslíti jako přímku, jenom lehce jeho sféricitu naznačujíce. To jest jen důsledek hořejších podmínek. Vskutku platí veškeré formule, jež v dalších výkladech odvozujeme, přímě vzato jenom pro ten mezní případ, pro tu limitu, kdy veškeré paprsky od svítícího bodu vycházející se jakoby srazí zcela těsně k hlavnímu.

A.) Zrcadla konkavní (obecná).


§22. Svítící bod.

Volme svítící bod A na hlavní ose zrcadla (obr. 30). Paprsek hlavní A S odráží se ve vlastní svůj směr S A zpět. Jiný paprsek A M odráží se ve směr M Ž. Oba odražené paprsky protínají se v bodě B, který jest tudíž sdružený s daným bodem A.

Jde o to nalézti zákon, jímž se řídí vzájemná poloha obou těch sdružených bodů A a B. –

Zavedme: $\sphericalangle A = a$,
$\sphericalangle B = b$.


obr. 30.



Při hledání zákona, dle něhož veličiny a a b souviší vespolek, musíme vycházeti od základního zákona odrazu světla, totiž

$$\alpha = \alpha'$$

limita:



Za místo těchto úhlů zavedme úhly středové φ, ω, ψ; i obdržíme:

$$\omega - \varphi = \psi - \omega.$$

Všechny tyto úhly, φ, ω a ψ jsou v limitě (obr. 30.) úhly velmi malé; neboť paprsek AM musí býti paprskem hlavním velice blízkým, jakož jsme vytkli jednou pro vždy.

Je-li však bod M velice blízkým bodu S, pak lze oblouček SM, který má svůj střed v C, pokládati za identický s obloučky, které by měly svůj střed v A a B. Můžeme tedy poté - poněvadž oblouk se vypočítá z poloměru násobením středovým úhlem (v míře obloukové vyjádřeným)

$$SM = a\varphi = r\omega = b\psi$$

čili $\varphi = \frac{SM}{a}$, $\omega = \frac{SM}{r}$, $\psi = \frac{SM}{b}$.

Dosadíme-li tyto hodnoty do rovnice

$$\omega - \varphi = \psi - \omega,$$

a krátíme-li obloučkem SM, obdržíme

$$\frac{1}{r} - \frac{1}{a} = \frac{1}{b} - \frac{1}{r}$$

anebť konečně $\qquad \frac{2}{r} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$.

Abychom měli vesměs veličiny recipročné, zavedme na místo $\frac{2}{r}$ raději $\frac{1}{\frac{1}{2}r}$ a píšme zkrácene $\frac{1}{2}r = f$. Tím vyjde základní zákon pro zrcadla sférická sběrná ve formě:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}.$$

Zákon tento praví:

Mění-li se a, mění se též b, ale tak, že součet reciprokých hodnot zůstává veličinou stálou.

Sledujme nyní podrobněji proměny těchto veličin:

1.) Je-li $a = \infty$, jest $b = f$.
Nekonečně vzdálený svítící bod má tedy obraz svůj ve vzdálenosti f od zrcadla, čili poněvadž jest $f = \frac{1}{2}r$, uprostřed mezi zrcadlem a jeho středem. V tomto případě jsou paprsky od nekonečně vzdáleného bodu na zrcadlo dopadající vespolek jakož i s osou rovnoběžné. Odrážejíce se od zrcadla procházejí bodem F, jenž jest na ose uprostřed mezi body S a C. Bod tento zovem ohniskem (focus); jeho vzdálenost SF od zrcadla jmenujeme se dálka ohnisková (fokální.)

2.) Blíží-li se svítící bod z nekonečné dálky zrcadlu, vzdaluje se od něho jeho obraz a to z počátku, pokud svítící bod je vůbec daleko, velice zvolna, teprve později, když se svítící bod přibližuje zrcadlu do dvojnásobné dálky ohniskové, poněkud rychleji; dráze ∞C velice dlouhé odpovídá tu dráha FC velice krátká.

3.) Nalézá-li se svítící bod ve dvojnásobné dálce ohniskové, je jeho obraz též ve dvojnásobné dálce ohniskové; je tedy současně

$$a = 2f = b;$$

svítící bod a jeho obraz se setkají v bodě C.

4.) Přijde-li svítící bod přes střed C zrcadlu blíže, vzdaluje se od něho jeho obraz dále a to vždy rychleji a rychleji, takže přechází obraz do velmi veliké dálky, když se svítící bod blíží ohnisku. Krátké dráze CF předmětu odpovídá velmi dlouhá dráha $C\infty$ obrazu — naopak než pod 2.)

5.) Přijde-li svítící bod do ohniska, je jeho obraz v dálce nekonečné;

$$a = f, \quad b = \infty;$$

paprsky vycházející od svítícího bodu v ohnisku odrážejí se tak, že od zrcadla jdou rovnoběžně.

Tento případ označuje zároveň důležitý přechod. Až dotud byly odražené

paprsky konvergentní, tudíž se skutečně protnaly; obraz svítícího bodu byl, jak pravíme, reálný.

Rovnoběžnost paprsků jest přechodem od jich konvergentnosti k divergentnosti.


6.) Je-li svítící bod mezi obrazem a zrcadlem, jsou odražené paprsky rozbíhové, sbíhají se tudíž jen ve svém prodloužení za zrcadlem. Z formule vychází, je-li $a < f$, že jest b negativní; obraz, který jest tudíž zde geometrický čili virtuální, nalézá se z počátku ve velké dálce, blíží se však rychle k zrcadlu, když i svítící bod se k němu blíží.

7.) Dojde-li svítící bod až do plochy zrcadlové samé, dojde tam též jeho obraz, zde tudíž v bodu S splývají oba tyto body sdružené právě jako v geometrickém středu C. Z formule vychází pro $a - b$ zaměněné $b = 0$, v skutku jest $\infty - \infty$ hodnotou neurčitou, ale konečnou, zde tedy $= \frac{1}{f}$.

§23. Svítící předmět.

Jde-li o zobrazení nikoli jediného svítícího bodu A, nýbrž celého pásma takových bodů, kteréž ve svém souhrnu tvoří svítící předmět, můžeme pro každý bod A tohoto pásma vedlejší osu vedlejší dle způsobu dříve popsaného nalézti jeho sdružený bod B dle formule $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$. Souhrn bodů B' dává pak obraz svítícího předmětu.

Uvažme však okolnost následující: Je-li daný svítící předmět na př. svítící přímka A A' (obr. 31.) značnějších rozměrů, jsou vzdálenosti a jednotlivých bodů A' od sebe rozdílné — tudíž pak také vzdálenosti b bodů sdružených B. Tyto vzdálenosti b dlužno pak na vedlejších osách naměřiti od zakřiveného zrcadla počítajíc.




obr. 31.

Z toho pak následuje:

Svítící přímka A A' má za obraz

Limita:



nikoli přímku B B', nýbrž křivku.

Nastane tudíž deformace — jakož jest v obr 31. naznačeno. Pěts deformace lze se vyhnouti jedině tím, že volíme rozměry přímky A A' anebo svítících předmětů vůbec — velmi malé, takže se říci může, že jsou všechny body od zrcadla téměř stejně vzdáleny. V tomto smyslu mluvíme pak o vzdálenosti předmětu svítícího vůbec — a měříme tuto vzdálenost jen na ose hlavní.

S tou výminkou lze pak připustiti, že jest obrazem na ose kolmé svítící přímky A A' opět přímka B B' rovněž kolmá na ose (obr. 31. limita).

Chceme-li pak k dané poloze svítící přímky A A' nalézti její obraz B B', postačí, když nalezneme obraz B' k bodu B, neboť pak spustíme z toho bodu B' kolmici na osu B' B ⊥ S C, a tato kolmice je hledaným obrazem dané svítící přímky.


Poslední poznámka vede k velmi jednoduché konstrukci, kterouž lze vždy pohodlněji než počtem stanoviti postavení obrazu k danému předmětu. Za tento předmět volme, jako v § předcházejícím, svítící přímku A A' na ose kolmou. Mějme pak hlavní případ na mysli, kreslíme zrcadlo, jak je pro bezprostřední okolí vrcholu S, tedy jakoby rovinné.

Jedná se jen o to nalézti k bodu A příslušný obraz B'. Body A' a B' jsou body sdružené; tyto naleznem jako průsečky dvou párů paprsků sdružených. Za tyto volíme dva z následujících tří:

1.) Paprsek hlavní a jeho odražený.

Paprsek hlavní jde středem C a vrací se ve vlastním směru zpět.

2.) paprsek s osou rovnoběžný a jeho odražený;



obr. 32.

tento odražený procházeti ohniskem;

3.) papršek ohniskem procházející; tento odražen od zrcadla postupuje s osou rovnoběžně. Konstrukce jest tedy velmi jednoduchá.

V obraze 32. jest konstrukce provedena, a sice

v α) paprsky 1) 2)
v β) " 1) 3)
v γ) " 2) 3).

V jednotlivých úlohách volíme způsoby buď α) neb β) neb γ) dle libosti.

Odporučuje se konstrukce tyto provésti pro rozmanité polohy svítícího předmětu A A'. Ukáže se z nich, že obraz reálný je vždy obráceným, obraz pak virtuální přímým — reálný předmět předpokládajíc.

Co se pak týče velikosti obrazu, platí rovnice:

$$\frac{BB'}{AA'} = \frac{b-f}{f} = \frac{f}{a-f} = \frac{b}{a}.$$

Z následujících plyne z obrazu 32) na základě podrobnosti trojúhelníků;

poměr $\frac{b-f}{f}$ plyne z trojúhelníků FBB' a FSM
" $\frac{f}{a-f}$ " z " FSN a FAA'
" $\frac{b}{a}$ " z " FSN a FAA', jakož dále FB'N a FA'M.

Kontrola jest též dána relací:

$$\frac{b-f}{f} = \frac{f}{a-f} = \frac{b-f+f}{f+a-f} = \frac{b}{a}.$$

Zároveň vyplývá rovnice:

$$(a-f)(b-f) = f^2$$

t.j. $FA \cdot FB = f^2$.

Jest snadno se přesvědčiti, že rovnice tato jest identická s rovnicí dříve odvozenou: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$,

takže představuje jenom její jinou formu.

Vyjde-li poměr $\frac{BB'}{AA'}$ +, znamená to, že je obraz obracený, poněvadž jsme od případu tohoto jakožto typického vyšli.

Vyjde-li hodnota —, znamená to, že je obraz přímý.

Pozoruhodno je vytknouti:

Při zvětšení $\frac{BB'}{AA'}$ roste přímo úměrně s odlehlostí b-f,
obráceně " " a-f,


t.j. obraz se zvětšuje touže měrou, kterou se obraz od ohniska vzdaluje anebo kterou se předmět k ohnisku blíží.

B. Zrcadla konvexní (rozptylná).

§ 24. Svítící bod.

Z případu typického, kterýž dán je zrcadlem konkavním, čili sběrným, obdržíme zrcadlo konvexní čili rozptylné změnou zakřivení, t.j. změnou znamení poloměru křivosti r. Tím změní též f své znaméní, které je $= \frac{1}{2} r$. Zrcadla konvexní jsou tedy zrcadla s negativní dálkou ohniskovou. Smyslu toho jest, že paprsky rovnoběžně na zrcadlo dopadající (obr. 33) se po odrazu rozbíhají, a jenom ve zpátečním — t.j. negativním — prodloužení dávají průsek — ohnisko — které jest tudíž jen geometrické čili virtuální.

ob. 33.



Rovnice $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$
zrcadla konkavního přejde v následující: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = -\frac{1}{f}$.

Z té jest již patrno, že — pokud jest a positivní, t.j. svítící bod před zrcadlem — že musí vždy býti b negativní, t.j. obraz jeho za zrcadlem. Tento obraz jest tudíž vždy geometrickým čili virtuálním.

§ 25. Svítící předmět.

V rovnicích $\frac{BB'}{AA'} = \frac{b-f}{f} = \frac{f}{a-f} = \frac{b}{a}$

píšeme $-f$ za f, $-b$ za b; tím obdržíme rovnice následující.


$$-\frac{B B'}{A A'} = \frac{c-b}{f} = \frac{f}{a+f} = \frac{b}{a}$$

Poměr jest a pozitivní, jest tedy poměr $\frac{B B'}{A A'}$ vždy negativní, poněvadž jsme znaménko $-$ hned k němu připsali, a numericky < 1 t. j. obraz $B B'$ jest přímý a zmenšený a padne vždy za zrcadlo, jakož naznačuje negativní b, jest tudíž virtuálný čili geometrickej.

Konstrukce sférou vedené zůstávají svým i zde v platnosti, jenom dlužno při provádění konstrukce míti stále na paměti, že paprsek s osou rovnoběžný se odráží tak, jakoby zpětně k ohnisku mířil — faktický jím nepochodí. Podobně paprsek k ohnisku mířící odráží se s osou rovnoběžně.

Příklad konstrukce ukazuje obr. 34. v němž jsou ony způsoby a), β), jež obrazů 32 spojeny. Z příslušných trojúhelníků možno zde správnost výrazů pro $\frac{B B'}{A A'}$ (bez ohledu na znaménko $-$) ihned zkontrolovati.

ob. 34.



$\frac{c-b}{f}$ plyne z FBB' a FSM

$\frac{f}{a+f}$ „ „ FSN a FAA'

$\frac{b}{a}$ „ „ FSN a FAA'

jakož i z FBN a FAM.

[* Zákony o zrcadlech sférických dle názoru novější geometrie. *]

[* § 26. Základní rovnice. *]

[* Polohu světlého bodu A ovšem ze zrcadla stanovili jsme vzdáleností jeho $SA = a$ od vrcholu zrcadla. Zdánlivě je tedy poloha tato stanovena jedinou veličinou; *]

faktický rozhoduje zde však ještě jedna, totiž jednička délková, ve které veličina a jest číselně vyjádřena. Číslo a je tedy vlastně poměr dvou délek.

Když věc tak se má, pak pochopujeme, proč geometrie novější dotčený se učiniti nezávislou na volbě jednička délkové stanovíc polohu bodu A na dané se poměrem dvou délek, počítaných od jistých dvou bodů základních. V našem případě hodí se k tomu body S a C jakožto polohu označující.

V duchu novější geometrie stanovíme tedy polohu světlého bodu A poměrem

$$\frac{C A}{S A}.$$

Právě tak stanovíme polohu jeho obrazu B poměrem

$$\frac{C B}{S B}.$$

Body B a A jsou vespolek sdružený, konjugovaný. Každému bodu A přísluší určitý bod B a naopak. Tato přidruženost jeví se formálně tím, že poměr $\frac{C A}{S A}$, $\frac{C B}{S B}$, tedy dvojpoměr $\frac{C A}{S A} : \frac{C B}{S B} = -1$

má tedy určitou hodnotu, která v případě zrcadlení na zrcadlech sférických jest $= -1$.

Důkaz této věty vede se nejjednodušeji na základě důležité všeobecné věty novější geometrie. Vedeme-li body C, S, A, B paprsky z libovolného bodu M vycházející, jest dvojpoměr $\frac{C A}{S A} : \frac{C B}{S B}$ týž jako dvojpoměr příslušných úhlů sinusů protějších úhlů,

t. j. $= \frac{\sin CMA}{\sin SMA} : \frac{\sin CMB}{\sin SMB}$

Důkaz této věty vede se dle známé věty sinusové u trojúhelníků. V našem případě u zrcadla sférického vychází (obr. 35).

ob. 35



$$\frac{C A}{S A} : \frac{C B}{S B} = \frac{\sin \alpha}{\sin(90+\alpha)} : \frac{\sin(-\alpha)}{\sin(90-\alpha)}$$

$$= \operatorname{tg}\alpha : \operatorname{tg}(-\alpha)$$

$$= -1.$$

Je-li dvojpoměr $= -1$, pravíme, že jsou body A a B — vzhledem k bodům C a S — harmonicky příbuzny. — Že tedy obraz B svému předmětu A harmonicky příbuzen — a sice vzhledem ke středu C a vrcholu S zrcadla. Ohnisko F je tak příbuzno k bodu ∞; neboť je-li $a = \infty$, jest $\frac{CB}{SB} = -1$, t.j. $f = \frac{1}{2}r$; anebo jeli $b = \infty$ je $\frac{CA}{SA} = -1$, t.j. opět $f = \frac{1}{2}r$.

Důležito jest pak vzdělaně poznamenati:

Je-li $\frac{CA}{SA} : \frac{CB}{SB} = -1$, je také $\frac{CB}{SB} : \frac{CA}{SA} = -1$;

neboť reciproká hodnota -1 jest opět -1. To však znamená: Bod B lze vyměniti za A a naopak. V dřívější rovnici je

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

jevilo se to tím, že rovnice ta jest vzhledem k délkám a, b souměrnou: lze obě navzdory zaměniti a platnost rovnice nepřestává.

Body C a S jsou, jak říkáme, dvojité. Přijde-li totiž A do C, padne tam též B. Podobně u S. To vyplývá z onoho dvojpoměru

$$\frac{CA}{SA} : \frac{CB}{SB} = -1 \text{ ihned.} \; *]$$

[§27. Konstrukce pro zrcadlo konkávní. *]

[* Na ose zrcadla jsou tedy vlastně dvě řady bodové; jedna bodů A, druhá bodů B. Každému bodu A přináleží jistý bod B. Abychom tuto příslušnost lépe přehlédli, oddělme obě řady bodové od sebe. Myslíme si tedy osu jakoby dvojitou a otočme osu B kolem dvojitého bodu S do polohy k ose A na př. kolmé (obr. 36).

Máme pak: řadu bodů A na ose vodorovně položené,
" " B " " svisle postavené.


Spojme-li nyní body sdružené přímkou, protínají se tyto přímky v témže bodě O. Tvrzení geometrie praví, že sdružené body vedeme do polohy perspektivně.

Takovéto známé body sdružené jsou:

F jako předmět	a	∞ jako obraz
(na ose vodorovné)		(na ose svislé)
∞ jako předmět		F jako obraz
(na ose vodorovné)		(na ose svislé).

To znamená:

Vedeme-li $F\infty \parallel$ s osou bodů B (svislou)
a dále $F\infty \parallel$ " " A (vodorovnou) (obr. 36)
obdržíme průsek O jakožto střed perspektivnosti.



obr. 36.

Mající pak tento vedení jsme jakoukoli přímku OX, která stanoví polohu dvou bodů sdružených A a B.

Otáčíce touto přímkou OX vedoucí jakýmikoli možnými polohami bodů A obdržíme velice elegantně a jednoduše ihned příslušné polohy bodů B.

Kontrolou je potřebnost středu C se sebou samým. Přímka OX dostává polohu přechodně souměrnou.

Všimněme sobě, že konstrukce nynější dává více než jsme měli dříve. Přímku OX lze totiž otáčeti dále, až bod A přejde přes bod S na druhou stranu zrcadla t.j. za zrcadlo. To znamená: Konstrukce ukazuje, jak by poloha bodu B se utvářila, kdybychom připustili též body, ležící A za zrcadlem, t.j. takové, kde skutečné paprsky dopadající míří, které tedy jsou konvergentní. Předmět takový byl by virtuálním. Fysikálně je zrcadlo pomocí čoček plných takové paprsky sbíhavé realisovati. Kdybychom pak proti takovým postavili zrcadlo konkavní dříve než se protnou, měli bychom případ zde uvedený. —

Přibráním také této možnosti vyplní se prostora mezi ohniskem F a zrcadlem S, která jinak zůstává nevyplněna také obrazy a sice reálními přímými.


Je to případ, o kterém se obyčejně nečiní zmínka. Jím se však dosáhne úplné kontinuity výkladu.

Bod A projde pak celou osou od $+\infty$ do $-\infty$ — a podobně jeho obraz B projde poměr celou osou od F přes $\pm\infty$ zpět do F. Stavce charakteristické jsou při tom: O a S. *]

[* § 28. Konstrukce pro zrcadlo konvexní. *]

[* U zrcadla konvexního vzniknou jiná poloha obrazu – negativní – a tím i jiná poloha středu perspektivnosti (obr. 37.) Také zde dává konstrukce více než jsme měli dříve, dává totiž polohy bodů B pro takové body A, které jsou za zrcadlem, tedy ku kterým paprsky konvergují, a které tudíž jsou geometrickými. Zřízením také tohoto nového případu dovídáme se opět zpětně, a chtěly jinak výklad pro zrcadla konvexní nabude velké

obr. 37.



rozmanitosti. Neboť vychází, že pro virtuální předměty A může pak obraz B zaujmouti na straně před zrcadlem polohy velmi rozmanité, kde jest pak reálním, anebo také za zrcadlem, kde je virtuálním. *]

[* § 29. Stanovení dálky ohniskové (poloměru křivosti) zrcadel konkavních. *]

[* Stanovení toto děje se zde, kde vznikají obrazy reálné, velmi jednoduše. Neboť tyto lze na stínítku zachytiti, lze měřiti jich velikost jakož i odlehlost od zrcadlící plochy. K disposici jest především rovnice:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

Pro $a = b$ vychází přímo $2f = a + b = r$.

Dále mužeme užíti rovnice

$$\frac{BB'}{s} = \frac{b-f}{f}, \text{ ze které plyne } f = b \cdot \frac{AA'}{AA'+BB'};$$


$$\frac{Bz}{AA'} = \frac{f}{a-f}, \quad " \quad " \quad " \quad f = a \cdot \frac{BB'}{AA'+BB'}$$

Lze-li tudíž měřiti velikost předmětu a obrazu, potřebí ještě odměřiti buď a nebo b. Ostatně je výhodno měřiti a, jde-li o obraz zmenšený ($BB' < AA'$), poněvadž je pak $a > b$; naopak b, jde-li o obraz zvětšený ($BB' > AA'$), poněvadž je pak $b > a$; malé chyby při měření měřeného mají procentuálně menší vliv, když délka měřená je větší. *]

§ 30. Stanovení dálky ohniskové (poloměru křivosti) zrcadel konvexních. *]

[* Úloha zde není tak jednoduchou jako v § předešlém, poněvadž zde vznikají jen obrazy virtuální, které nelze zachytiti na stínítku, a při nichž nelze tudíž odměřiti jich velikost nebo jejich odlehlost od zrcadlící plochy, proto zůstávají zde jak jak b tak BB' neznámými.

Na místě, aby se měřila BB', lze však měřiti projekci $\mathfrak{B}\mathfrak{B}'$ tohoto obrazu na měřítko přímo před zrcadlící plochu postavené a sice projekci centrálnou od jistého bodu O libovolně na ose zrcadla voleného (obr 38.) –



obr. 38.

Tak jest, položíme-li $O\mathfrak{E} = e$:

$$\frac{BB'}{AA'} = \frac{b}{a}$$

$$\frac{\mathfrak{E}\mathfrak{E}'}{BB'} = \frac{e}{e+b}$$

tudíž $\frac{\mathfrak{E}\mathfrak{E}'}{AA'} = \frac{e \cdot b}{a(e+b)}$.

V rovnici této jest vše známo až na b, kteroužto vzdálenost vyjmutím pomocí rovnice $\frac{1}{f} = -\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$

Odvrnujíce tuto rovnici ze vzorce $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{f}$ píšeme $-f$ místo f, $-b$ místo b a změníme pak veškerá znaménka. Položíme ještě ke zkrácení:

$$\mathfrak{C}\mathfrak{C}'=l$$
$$A A'=L$$

Počet stojí následovně:

$$\frac{L}{l}=\frac{a}{b}+\frac{a}{e}$$
$$\frac{a}{f}=\frac{a}{b}-1$$

$$\frac{a}{f}=\frac{L}{l}-\frac{a}{e}-1$$

z čehož
$$\frac{f}{a}=\frac{e\,l}{e\,L-(a+e)\,l}$$

aneb přehledněji
$$\frac{f}{a}=\frac{l}{L-\frac{a+e}{e}\,l}.$$

Mnohdy lze volit $l=a$,

pak je jednodušeji
$$\frac{f}{a}=\frac{l}{L-2l}.$$

Měření provádí se v tom způsobu, že se za předmět volí dosti rozsáhlá pátrací plocha na př. zaskrovované sklo matičné, světlem denním pěkně osvětlené; dalekohledem jehož objektiv jest v O, osnímá se pak na měřítku millimetrovém těsně před zrcadlící plochou upevněném velikost obrazu, jak se jeví na místě $\mathfrak{C}\mathfrak{C}'$. Nelze odporučovati, aby se pozorovatel vázal na podmínku $e=a$; zjednodušení formule jest jen zdánlivé. Konečně je $r=2f$.

Methody této užívá se ve fysice velmi zhusta, když jde o vyměření poloměru křivosti r zrcadlících konvexních ploch sférických jako jsou na př. plochy čoček a pod. *)


III. Lom světla.

(Dioptrika.)

§ 31. Základní zákony lomu světla.

Při poznámce sobě úvahy § 14. předpokládejme rovinné rozhraní RR' mezi

ústředím I a jiným ústředím II. Dán jest paprsek SO. Jsouc bod dopadu O, kolmice dopadu $K'K$, rovina dopadu (nákresná), úhel dopadu α opakují se i zde. Paprsek SO přecházeje do ústředí II mění svůj směr, „láme se" jak obrazně říkáme; úhel lomu $=\beta$ (obr. 39.)



obr. 39.

Zákony tohoto lomu světla jsou rovněž jako při odrazu dva:

1.) Paprsek lomený zůstává v rovině dopadu.

2.) Mezi úhlem dopadu α a úhlem lomu β jest určitý vztah, určitá závislost, vyjádřená rovnicí $\frac{\sin\alpha}{\sin\beta}=\text{Const.}=n$.

Mění-li se tedy α, mění se β, ale tak, že poměr jich sinusů dává vždy veličinu konstantní n; tato zove se exponentem čili udavatelem lomu.

Je-li $\beta<\alpha$, jest $n>1$, nastává lom ku kolmici,
„ $\beta>\alpha$, „ $n<1$, „ lom od kolmice.

Ústředí při němž nastává lom ku kolmici, zove se opticky hustší. Tato optická hustota není vždy v souhlasu s mechanickou (na př. alkohol aethylnatý a voda.)

Přechodní případ $\beta=\alpha$ dává $n=1$; paprsek se nelame, nýbrž jde se přímočaře dále; ústředí II jest tu identické s I a rovina hraniční pouze myšlenou. Ve specialisování exponentu lomu hodnotou $n=1$ přejdeme tedy od lomu ku přímočarému šíření se světla.

Podobnou specialisací lze též přejíti od lomu k odrazu světla; myslíme-li si β růsti až k hodnotě 180° ve smyslu od kolmice OK' ke kolmici OK a pak ještě od OK k OS úhel α', máme $\beta=180°+\alpha'$

tudíž $\sin\beta=-\sin\alpha'=-\sin\alpha$

a proto $n=-1$.

Tato specielní hodnota exponentu lomu vede tedy od lomu k odrazu.

Zákon lomu světla v té formě, jak zde byl vyložen, vyslovil Cartesius (Descartes) (1596–1650) ve své „Dioptrice" (Leyden 1637).

Před ním však poznal správně zákon ten Snellius Willebrord (1591–1626 v Leydenu), jenž však formuloval jej ve správném poměrném míře pohodlnějším, totiž

$$n = \frac{\operatorname{cosec} \beta}{\operatorname{cosec} \alpha}.$$

První kdo zkoumal lom světla, byl asi Ptolomaeus (*70 nebo 77 v Ptolomais v Egyptě, † 147 v Alexandrii), kterýž našel

$$n = \frac{\alpha}{\beta},$$

t. j. ovšem jen approximace, poměrně správná, jsou-li úhly α a β velmi malé. Podmínka tato bývá však někdy splněna – viz na př. dále lom světla plochami sférickými – a lze pak tento zákon Ptolomaeův substituovati na místě zákona Snellova.

{ § 32. Exponent lomu absolutní a relativní; optická dráha. *]

(*Činívá se často rozdíl mezi exponentem lomu absolutním a relativním. Exponent absolutní jistého prostředí platí pro přechod paprsku z prostoru vzduchoprázdného do tohoto určitého prostředí. Exponent relativní jistého prostředí II vzhledem k jinému I platí pro přechod paprsku z tohoto prostředí I do prostředí onoho II. Obyčejně bývá za prostředí I vzduch.

Mluví se tedy na př. o absolutním exponentu lomu skla, vody a pod.; slovem absolutní je právě naznačeno, že se jím přechod paprsku z prostoru vzduchoprázdného do skla, vody a pod.

Máme-li však na mysli exponent těchto látek relativní, musíme udati vzhledem k jakému prostředí tuto „relativnost" rozumíme; tímto prostředím bývá z pravidla vzduch.

Vztah mezi absolutním a relativním exponentem lomu stanoví rovnice:

$$\left.\begin{array}{lll} \text{pro prostředí } & \text{I} & : N_1 = \dfrac{\sin i}{\sin \alpha} \\ \text{„ „ } & \text{II} & : N_2 = \dfrac{\sin i}{\sin \beta} \end{array}\right\} \text{Exponenty absolutní.}$$

$$\left.\begin{array}{l} \text{pro prostředí } \text{I}/\text{II} \quad \dfrac{N_2}{N_1} = n = \dfrac{\sin \alpha}{\sin \beta} \end{array}\right\} \text{exponent relativní;}$$

tudíž: $N_2 = n\, N_1$

Pro vzduch (I) při 0° a tlaku 1 atmosf. jest na př.

$$N_1 = 1{,}000\,29.$$

Poněvadž pozorujeme z pravidla relativní exponenty lomu ze vzduchu do prostředí jiného, lze dle toho čísla N_1 z exponentu relativního n ihned počítati absolutní $1{,}000\,29 \cdot n = N_2$.

Exponent lomu nabývá velmi jednoduchého významu theorií undulačních. Dle této je totiž základem lomu světla různá rychlost, s jakou se světlo šíří ve vacuum (t. j. v éthere samém) a v prostředí hmotném (t. j. v éthere, jak jest ve hmotách co do svých vlastností přeměněném).

Je-li dráha, jakou světlo za libovolnou dobu (na př. za 1 sec. nebo $\frac{1}{1000}$ sec. atd.) vykoná, ve vacuum . . . . . σ,
v prostředí I . . . . . s_1,
v prostředí II . . . . . s_2,

platí vztahy: $\dfrac{\sigma}{s_1} = N_1$ čili $\sigma = N_1 s_1$
$\dfrac{\sigma}{s_2} = N_2$ „ $\sigma = N_2 s_2$

$$\frac{s_1}{s_2} = n.$$

Z těchto vztahů je pak patrno:

Nasobí-li se dráha s_1, s_2 (všeobecně s), jakou světlo za libovolný čas v prostředí hmotném vraží, příslušným absolutním exponentem lomu N_1, N_2 (všeobecně N), obdrží se dráha σ pro vacuum. Jest tedy:


$$N_1 s_1 = N_2 s_2 = \ldots\ldots = N s = \sigma.$$

Tuto dráhu $\sigma = N s$ zovem dráhou optickou. *]

[* §33. Význam zákonů lomu světla. *]

[* Analogicky v § 15. můžeme význam tento vyjádřiti větou:
Světlo přicházející z bodu A ústředí I do bodu B ústředí II volí nejkratší dráhu optickou.

Že tedy (obr. 40.):



ob. 40.

$$N_1 s_1 + N_2 s_2 = \text{minimum}.$$

Že tomu tak jest, dokážeme, když naopak z této podmínky odvodíme zákon lomu světla:

$$N_1 \sqrt{a^2+x^2} + N_2 \sqrt{b^2+y^2} = \text{minimum}$$
$$x + y = \text{Const.}$$

Z toho diferenciací:

$$N_1 \cdot \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}\,dx + N_2 \frac{y}{\sqrt{b^2+y^2}}\,dy = 0$$
$$dx + dy = 0,$$

tudíž: $N_1 \cdot \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}} = N_2 \cdot \frac{y}{\sqrt{b^2+y^2}}$

$$N_1 \sin\alpha = N_2 \sin\beta$$
$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{N_2}{N_1} = n = \text{Const.}$$

(Pierre Fermat 1608–1661, srovnej §15; tam jest minimum dráha skutečná zde dráha optická, t. j. na vacuum přepočítaná).

Je-li optická dráha minimum, jest ovšem též doba přechodu z A do B minimum.

Mechanické napodobení odrazu a lomu světla (E. Mach).
Rozšíření věty na celou řadu kmitavých ústředí je samozřejmé. *]

§ 34. Sestrojování paprsku lomeného.


Majíce k paprsku dopadajícímu SO – dle známého exponentu lomu n – sestrojiti paprsek lomený, opíšeme kolem bodu dopadu O libovolným poloměrem r

kruh, který protne paprsek SO v bodě M. Promítneme M na rovinu hraničnou do P a k délce OP přeneseme na protinoží stranu délku OQ tak, aby bylo:

$$\frac{OP}{OQ} = n;$$

dále vztýčíme v bodě Q na rovině hraničné kolmici QN protínající kruh v bodě N; i jest pak ON hledaným paprskem lomeným.

Obr. 41. jest proveden pro případ $n = \frac{4}{3}$ (voda).



ob. 41.

Vskutku jest: $\sin\alpha = \frac{OP}{r}$

$$\sin\beta = \frac{OQ}{r}$$

tudíž $\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{OP}{OQ} = n.$

Konstrukce uvedená, ač velice jednoduchá, má přece tu vadu, že tak, jak byla vyložena, předpokládá, aby pro každý dopadající paprsek dělení obou úseček OP a OQ dle exponentu lomu bylo zvlášť prováděno.

Ke vhodnějšímu konstrukčnímu půjdeme úvahou následující.
Sinus každého úhlu jest definován poměrem dvou délek. Můžeme tedy vyjádřiti:

$$\sin\alpha \text{ poměrem } = \frac{a}{r_1},$$
$$\sin\beta \quad " \quad = \frac{b}{r_2},$$

tudíž exponent lomu dvojpoměrem $n = \frac{a}{r_1} : \frac{b}{r_2}$.

Tento dvojpoměr můžeme dvojím způsobem zjednodušiti na obyčejný poměr:

1.) buď kladouce $r_1 = r_2$,
2.) aneb kladouce $a = b$.

Tím obdržíme dvojí konstrukci.

1.) Od bodu dopadu O odměříme jedním pro vždy dvě délky (obr. 42) $OP = a$, $OQ = b$ tak, aby byl jich poměr

$$\frac{a}{b} = n.$$


V bodech P a Q vztýčíme kolmice na přímku hraničnou.

Máje pak k jakémukoliv paprsku SO sestrojiti lomený, odvržemu $OM = OM$ a vedeme ON, což jest paprsek lomený.


2.) Kolem bodu O opíšeme jedenou pro vždy dva kruhy (obr. 43) poloměry r_1 a r_2 tak, aby byl poměr

$$\frac{r_2}{r_1} = n.$$

obr. 42.



obr. 43.



Kruh r_1 náleží jakési látce I, a kruh r_2 látce II.

Je-li dán paprsek dopadající SO, prodlužme jej až k průsečku s kruhem 1, od tohoto průseku postupujme pak ke kruhu 2 ve směru kolmice dopadu, (kterouž nebudeme kresliti), a spojme průsečný bod s bodem O; tím sestrojíme paprsek lomený.

Obrazce 42. a 43 jsou kresleny pro případ, že jest $n = \frac{7}{4}$

(což platí asi pro sklo flintové.)

Obě z uvedených konstrukcí jsou, každá ve svém způsobu, instruktivní. V následujících výkladech budeme však – k vůli stručnosti – jenom jednu z nich užívati a sice rozhodneme se pro konstrukci druhou. (Resch)

§ 35. Závislost exponentu lomu na barvě světla.

Dle výkladů předcházejících §§ zdálo by se, že je exponent lomu, (ať absolutní nebo relativní vzhledem ke vzduchu), konstantou závislou pouze na povaze látek a tudíž pro látku tuto charakteristickou. Zdálo by se, jinými slovy, že bychom mohli mluviti o exponentu na př. vody,

sirouhlíku, skla a pod. (eventuálně při určité temperatuře) bez dalších bližších dodatků. Avšak tomu není tak.

Exponent lomu jest veličina podmíněná ještě jedním faktorem – a tím je světlo samo – druh světla čili, jak říkáme, barva světla.

Při určité látce nelámou se světla stejně, jestliže necháme je z téže úhlu α dopadati jedno světlo červené, podruhé na př. žluté, pak modré atd.; dle barvy je úhel lomu β vždy jiný, a tudíž také exponent lomu n jiný. Seřadíme-li barvy dle jich lámavosti, následují po sobě v určitém pořádku, který se obyčejně takto udává:

červená, oranžová, žlutá, zelená, jasnomodrá, tmavomodrá, fialová.

(oranžová) (indigová)

Jest to týž pořádek, ve kterém vidíme tyto barvy při duze; proto se jim – v tomto pořádku – říká též zkrátka barvy duhové.

Exponent n lomu jest tedy vždy větší a větší, když při těchto barvách duhových postupujeme od červené k fialové.

Dlužno ovšem vytknouti, že variace tohoto exponentu lomu není veliká; nebo činí jen několik málo procent (nejvýše asi 6%). Jak veliká tato variace jest, závisí na látce samé. U vody je na př. velmi malá, něco přes 1 procento, větší jest u aethylalkoholu, daleko větší u sirouhlíku, ale přesně v tomto případě poměrně ne valná.

Označení quality světla barvou není však dostatečně přesné. Mluvíme-li o barvě červené, žluté neb modré atd., je to tak, jakobychom v akustice mluvili o tom „hlubokém" anebo „středním" „vysokém" a pod.; tabrýmto povšechným označením není ovšem výška tonu přesně stanovena. Chceme-li přesně tón označiti, udáváme jeho „absolutní výšku" t. j. počet kmitů za sekundu. Nejinak jest to v optice. Dle theorie undulační je barva analogou tónu a stanoví se přesně také počtem kmitů za sekundu anebo – a to je obyčejnější – délkou vlny etherové, λ.

Zamatujme, že tato délka vlny (jak již v úvodu udáno) vyjadřuje se zpravidla

milimetrech t. j. v milliontinách millimetru („μμ") vesmíže v pořadě barev duhových od červené k fialové asi od $\lambda = 800$ do $\lambda = 400$ ... μμ (okrouhlými čísly).

Řekněme tedy přesněji: Exponent lomu n jest podmíněn ještě délkou vlny světla dopadajícího.

Světlo, které je charakterisováno určitou délkou vlny zove se světlem jednoduchým čili homogenním. Takové obdržíme na př., když do nesvítivého plamene lihového neb plynového dáme nějaké soli natriové, na př. $NaCl$ nebo Na_2CO_3 a pod. Žlutou páry natriové svítí krásným intensivním světlem žlutým, kteréžto světlo jest homogenním (aspoň velice přibližně!)

Podobně je homogenním světlo červené par lithiových anebo zelené světlo par thalliových. Délka vlny těchto druhů světelných je na př.

Li . . . . $\lambda = 671$ μμ
Na . . . . $\lambda = 589$ „
Tl . . . . $\lambda = 535$ „

Takovéto světlo homogenní jest analogon jednoduchého tónu, kterýž dává na př. jistá ladička určité výšky.

Jiné zdroje světelné vysílají světlo složité, ve kterém mnoho jednoduchých světel jest jakoby obsaženo. Analogon takového světla je v akustice celý akkord několika tónů.

Také bílé světlo, jaké vysílá na př. rozžhavený platinový drát je světlo složené, ve kterém je velmi veliké množství barev zastoupeno.

Láme-li se paprsek takového složitého světla, pak se lomem rozkládá. Tak jest tomu zejména u světla bílého, kde se rozklad děje v nepřetržité posloupnosti barev. Každá jednoduchá barva ve světle bílém zastoupená láme se totiž svým vlastním způsobem, dle svého určitého exponentu lomu.

Tím docházíme výsledku velmi důležitého. Lomem lze tedy světlo „rozkládati" čili „analysovati." Postupnost barev, které při lomu obdržíme, totiž t. zv. viditelné čili spektrum onoho druhu světla, kteréž právě analysujeme, a tento způsob analyse zove se za tou příčinou analyse spektrální.

Ve spektrum slunečním vyskytují se jisté tmavé čáry tak zvané

Fraunhoferovy, jsou označeny písmenami, a sice hlavní z nich od A do H. Každá z těchto čar stanoví určité místo ve spektru – jest jakoby indexem určité barvy – a proto se velmi často k přesnému stanovení tónu barevného těchto čar užívá.

Vše to, co zde v tomto řečeno, jsou jen předběžné poznámky, jichž účelem jest jedině na věc upozorniti, abychom nejsouce kdy nepřáteli nesprávným představám. Takovou bylo by na př. mysliti si exponent lomu n pro „světlo bílé." V skutku pomýšlíme často – o odrazu nebo lomu světla mluvíce – na světlo bílé. Avšak bílé světlo nemá exponentu lomu; neboť není světlem homogenním. Jako nelze mluviti o výšce „akkordu", nýbrž jen o výšce určitého jednoduchého tónu, tak jest nutno při exponentu lomu vždy pomýšleti na určitou barvu, na př. světla natriového, thalliového a pod.

Podobně nesprávné bylo by mluviti na př. o exponentu lomu vody, skla a pod. bez bližšího udání barvy (neb délky vlny světelné), pro kterou má platiti. Nanejvýš lze tak učiniti, pokud udáme jen nějaké číslo okrouhlé – jako jsme učinili v dřívějších §§, kde jsme pro vodu brali $n = \frac{4}{3}$ neb pro sklo flintové $n = \frac{7}{4}$. Poněvadž totiž variace v indexu lomu činí jen několik málo procent, možno při approximativním udání od ní abstrahovati. V následujícím budeme však podáti – abychom splnili účelu a přesnosti – vždy údaje vztahovati na určité poměry jak co do látek, tak co do quality světla.


§ 36. Závislost úhlu dopadu α, lomu β a úchylky $\alpha - \beta$.

Známe nyní základní zákony projednejme o některých podrobnostech lomu světla. K tomu cíli vede cesta dvojí: buď počet neb konstrukce. Začněme konstrukcí.

Volme však nikoliv poměry ledajaké smyšlené, nýbrž skutečné; provedme tedy konstrukci pro případ přechodu světla ze vzduchu do vody a to pro homogenní světlo natriové; pro toto jest $n = 1{,}3332$.

Seatřujme (obr. 44.) vnitřní kruh (pro vzduch, vzduch platící) poloměrem na př. 20 mm; vnější kruh bude pak míti poloměr $20 \times 1{,}3332$ mm $= 26{,}66$ mm.

obr. 44.




Táhněme-li paprsek dopadající S, prodlužme jej až ke kruhu I do D, odtud přejděme průsečíkem DE s kolmicí dopadu rovnoběžnou ke kruhu II, a veďme EZ; t.j. paprsek lomený Z.

Tento paprsek lomený protíná kruh I v bodě F; vůmněme si, že oblouček FD tohoto kruhu může býti měrou úhlu $\alpha-\beta$, t.j. měrou úchylky paprsku dopadajícího lomem vzniklé.

Tento oblouček není pro všechny paprsky dopadající stejný. Když seatřujeme dopadajících paprsků několik pro hodnoty α rozdílné, jako na př. v obr. 45. pro

$$\alpha = 0°,\ 30°,\ 60°,\ 90°,$$



obr. 45.


tedy vidíme, že příslušné obloučky se zvětšují, když α roste.

Kdežto paprsek hlavní se uchýlí a paprsky jemu velmi blízké jen velmi málo, lámou se paprsky šikmo dopadající již značněji a to tím více, čím šikměji dopadají.

Okolnost tato souvisí s okolností jinou, s kterouž se později konstrukcí dobře lze orientovati.

Seatřujme (obr 46) dopadající paprsky v úhlech dopadu rostoucích pravidelně na příklad s $\alpha = 0°$ až $\alpha = 90°$ (obustranně od kolmice dopadu) a k nim paprsky lomené. Obrázek ukazuje, že tyto paprsky lomené vzdalujíce se od kolmice dopadu vždy tenčeji se těsněji k sobě se druží. Jinak řečeno: přibývá-li úhlu

obr. 46.



α rovnoměrně, nepřibývá též úhlu β rovnoměrně, nýbrž přírůstky úhlu β jsou stále menší a menší; proto musí pak diference $\alpha-\beta$ stanovící odchylku paprsku vzůstat více a více s úhlem α rostu.

Nejlépe objasní se ovšem tyto úkazy počtem. Jak tento počet stojí, ukazuje následující tabulka:

$$n = 1{,}3332,\quad \lg n = 0{,}12490$$

α	$\lg \sin \alpha$	$\lg \sin \beta$	β	Přírůstek úhlu β	Úchylka paprsku $\alpha-\beta$
0			0,00		0,00
15	9,41300	9,28810	11,19	11,19	3,81
30	9,69897	9,57407	22,03	10,84	7,97
45	9,84949	9,72459	32,03	10,00	12,97
60	9,93753	9,81263	40,51	8,48	19,49
75	9,98494	9,86004	46,43	5,92	28,57
90	0,00000	9,87510	48,60	2,17	41,40

Přibývá-li tedy úhlu α pravidelně o 15°, přibývá úhlu β z počátku o více než 11°, pak vždy volněji a volněji až konečně jeví asi o 2°; úhel β blíží se tu jisté krajní hodnotě, kterou dosáhne, když α jest $= 90°$; tento krajní úhel β^* je určen rovnicí

$$\frac{\sin 90°}{\sin \beta^*} = n \quad \text{čili} \quad \sin \beta^* = \frac{1}{n},$$

a činí v našem příkladě, jak z hořejší tabulky vidno

$$\beta^* = 48{,}60.$$


V tomto krajním případě jest úchylka paprsku přes 40°, kdežto z počátku při $\alpha = 15°$ jest menší než 4°.

Konstrukci obr. 46 mohli bychom provésti ve všech možných rovnicích, které lze položiti kolmici dopadu. Jaký by byl výsledek / objasníme si, když v myšlenkách celý výkres kolem kolmice dopadu otáčíme. Dopadající papršky vyplňují pak mezi rovinou hraničním jakoby polokoulí a ta stejnoměrně, kdežto papršky lomené vyplňují kužel, jehož otvor jest = $2\beta^*$ a to nikoliv stejnoměrně, nýbrž čím dále od kužele k plášti, tím hustěji.

Souvislost mezi úhly α, β a $\alpha-\beta$ lze znázorniti též konstrukcí.

Kolem středu O opíšeme (obr. 47.) kruh s poloměrem libovolným r, (na př. 20 mm). Budiž pak bod C volen tak, aby vzdálenost $OC = n.r$, kdež n značí exponent lomu (v našem případě: $n = 1,33'32$, $OC = 26,7$.) Vidíme nyní jakoukoliv přímku kolem C, která by protala kruh v bodech M a N. Spojme OM a označme:

$$\sphericalangle OMN = \alpha$$
$$\sphericalangle MCO = \beta$$
$$\sphericalangle MOC = \alpha - \beta = \delta.$$



obr. 47.

Z trojúhelníku OMC plyne dle věty sinusové:

$$\sin\alpha : \sin\beta = \overline{CO} : \overline{OM}$$

čili $$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{nr}{r} = n.$$

Z toho je patrno, že α značí v tomto výkresu úhel dopadu a β úhel lomu, δ pak úchylku paprsku.


Představme si nyní, že α vzrůstá čili že bod M pohybujeme po kružnici od bodu A, pak také vzrůstá β i δ. Maximální úhel lomu obdržíme, vedeme-li tečnu C T.

§ 37. Odraz totální.

V § předešlém jednali jsme o přechodu světla ze vzduchu do vody, tedy z ústředí řidšího do hustšího. Uvažujme nyní případ opačný.

Konstrukce paprsku lomeného modifikuje se nepatrně (obr 48.) —

Paprsek Σ prodlužujme až ke kruhu pro ústředí „voda" platícímu, tedy ke kruhu vnějšímu do bodu D; od tohoto přejedeme pak ve směru kolmice dopadu do bodu E ke kruhu pro ústředí „vzduch" platícímu, tento bod spojme s bodem dopadu O, i jest OE paprskem lomeným Σ.




obr. 48.

Přirovnáváme-li konstrukci dřívější (obr 44.) s konstrukcí nynější (obr 48.) seznáme jasně, v čem záleží rozdíl obou.

Buď D ležel dříve na vnitřním kruhu („vzduch") a odtud přešlo se směrem DE k bodu E kruhu vnějšího („voda"). Nyní leží bod D na vnějším kruhu („voda") a odtud se přechází směrem DE k bodu E kruhu vnitřního („vzduch"). Při přechodu z vnitřního kruhu k vnějšímu přímkou s kolmicí dopadu rovnoběžnou protne se kruh vnější vždy — ale naopak, při přechodu z kruhu vnějšího na vnitřní přímkou téhož směru nemusí se tento kruh protnouti vždy; kdežto onde ku každému bodu D se nalezne příslušný bod E, zde nikoliv; zde může přímka DE vnitřní kruh úplně minouti. Přechodným případem jest zde ten, kdy přímka DE se právě kruhu vnitřního dotýká (obr 49.) Znak řečeno.

obr. 49.



Při přechodu paprsku ze vzduchu do vody — tedy při lomu ke kolmici vibrace — náleží ke každému paprsku dopadajícímu směru libovolného určitý paprsek lomený. Opačně však nikoliv. Při přechodu paprsků z vody do vzduchu — tedy při lomu světla od kolmice — nelze k některým paprskům nalézti lomené; papršky takové nemohou pak vibrace do ústředí

nás ledvajícího proniknouti — nemohou se tudíž lámati, nýbrž jedině odrážeti.


Pravili jsme totiž dříve, že paprsek na rozhraní dvou prostředí dopadající se dílem lámne, dílem odráží. Zde však přicházíme k případu zcela zvláštnímu. Paprsek dopadající v jistém směru na rozhraní dvou prostředí, jako voda a vzduch, nemůže z prostředí hustšího přejíti do řidšího, vrací se tudíž v plné své intensitě odrazem zpět. Tento zcela úkaz tento úplným odrazem čili totální reflexí.

Totální reflexe nastane tehda, když úhel β překročí onu krajní hodnotu β^* určenou rovnicí

$$\sin \beta^* = \frac{1}{n}.$$

Mění-li se totiž β od 0 do β^*, mění se, jak již dříve jsme uvedli, úhel α od $0°$ do $90°$, a hodnota $90°$ je největší, kterou α může dosáhnouti. Je-li tedy β větší než β^* t. j. přijde-li paprsek z vnitřku kužele, o němž jsme dříve pravili, že náleží ku polovině paprsků dopadajících na venek, pak nepronikne do prostředí druhého, nýbrž odráží se totálně.

Jest tudíž prostor mezi rovinou dopadu a mezi kuželem, jehož otvor je $= 2\beta^*$ prostorem, v němž nastává totální odraz (obr. 50)




obr. 50.

Budtež ještě uvedeny některé příklady totálního odrazu.

Sklenička naplněná do vody jeví následkem totálního odrazu světla brilantní lesk. Kamera lucida, světlá komora Wollastonova (§ 11) (viz později v kapitole o strojích optických). Hranoly totálně reflektující. Těmi lze demonstrovati paprsky totálně odražené kombinací dvou hranolů pravoúhlých, jak to ukazuje obr. 51.

Dopadají-li na takovouto kostku ze dvou hranolů složenou paprsky konvergentní, odrážejí se paprsky blíže směru B dopadající totálně, což je na dvou stěnách I a II

ukáže se tím, že plocha P' jest úplně temnou, což koresponduje s plochou při P úplně jasnou. Plochy P'' jeví se jen parciálně osvětlené, doplňujíce se vzájemně na jasnost v P.



obr. 51.


Živé příklady na odraz totální vyskytující se v přírodě viz v části jednající o optice meteorologické.

Velice instruktivně znázorňují se zákony odrazu i lomu světla, odrazu parciálního i totálního, vezmeme-li velkou nádobu parallelepipedickou, která má stěnu zadní kovovou, přední pak a postranní skleněné. Nádobu naplní se v dolní polovici vodou fluorescieinem zelenavě zbarvenou, hořejší pak polovice naplní se kouřem. Zvonátky polygonálními vedou se pak paprsky slunečními tak, že procházejí buď ze vzduchu do vody neb naopak ve směrech měnlivých.

Lom světla rovinou.

§ 38. Paprsky homocentrické.

Budiž rovina $R'R$ (obr. 52) rovinou lámající na př. hladinu vodní, bod A bodem svítícím, tedy střediskem paprsků homocentrických. Průnějme sobě zcela analogicky jako v § 17. Vedme nejprve paprsek hlavní AJ; tento prochází nezlomen ve vlastním směru JH. Vedle toho vedme paprsek jiný AM, který se lámne ve směr MZ.



obr. 52.

Oba tyto paprsky do prostředí druhého vnikající JH a MZ se vzdalují; prodloužený zpět protnou se v bodě B.

Zdálo by se, že tento bod B analogicky jako při odrazu světla na rovině je společným střediskem všech paprsků lomených,

že tedy na př. paprsek $A A'$ se láme tak, jakoby lomený paprsek $M' Z'$ vycházel od bodu B.

Avšak tomu není tak. Provedeme-li konstrukci přesně dle učitého exponentu lomu n, shledáme, že se paprsky lomené, prodloužíme-li je zpět, dokonce neprotínají v témže bodě.

Z jednoduché úvahy seznáme, že tomu ani jinak býti nemůže. Kdyby totiž bod B byl v skutku společným průsečkem všech (prodloužených) paprsků lomených, tedy by byla vzdálenost SB rovněž tak konstantní jako SA. Jest však

$$SM = SA \cdot \operatorname{tg}\alpha = SB \cdot \operatorname{tg}\beta,$$

tudíž $$\frac{\operatorname{tg}\alpha}{\operatorname{tg}\beta} = \frac{SB}{SA} = \text{konst.}$$

Avšak zákon lomu zní: $\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \text{konst}$

Je-li tedy poměr sinusů konstantním, nemůže býti poměr tangent konstantním a tudíž ani délka SB.

V jednom případě však neplatí věta tato tak přesně. Jsou-li totiž úhly α a β velmi malé – t. j. jedná-li se o paprsky téměř normálně na povrch RR' dopadající – pak je, jak známo, s velikou approximací

$$\frac{\operatorname{tg}\alpha}{\operatorname{tg}\beta} \doteq \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} \doteq \frac{\operatorname{arc}\alpha}{\operatorname{arc}\beta}.$$


Pokud se tedy jedná o paprsky, které jsou paprskům hlavním velice blízké, pak možno s velikou approximací připustiti, že se lomou tak, jakoby vycházely od společného středisko B. Ony měrou však, kterou se paprsky od hlavního více a více vzdalují, tou měrou, jsouce zpět prodlouženy, procházejí mimo tento bod.

Ke znázornění toho, co zde řečeno, slouží výkresy 53 a 54. Oba platí pro ústředí vzduch a voda, pro exponent $n = \frac{4}{3}$, ve výkresu 53 je světící bod ve vzduchu; od něho vycházející svazek paprsků homocentrických; po lomu na hladině vodní přestávají však tyto býti homocentrickými; nebuď prodlouženy ve zpětném směru neprotínají se v jediném bodě, nýbrž v celém pásmu bodů, které tvoří


jedná o lom, zvaném <u>diakaustickou</u>. Podobně obr. 54. – Křivky resp. plochy diakaustické jsou zde jen <u>geometrické</u> čili <u>virtuální</u>, poněvadž se paprsky <u>skutečně</u> v nich <u>neprotínají</u>, nýbrž jen v prodloužení. (Srovnej § 21.)

Tu však vzniká otázka: Kterak to, že o existenci ploch diakaustických nic ve skutečnosti nevíme? že na příklad – vzhledem k obr. 54. – nalézá-li se na dně řeky neb jezera nějaký světlý bod, na příklad malý bílý kamének, že jej vidíme v ostrých konturách?


obr. 53.



obr. 54.




Příčina je jednoduchá. Oko naše nevšímáme z paprsků lomených leč jen velmi nepatrný svazeček, který projde pupillou: paprsky tohoto svazku protínají se na ploše kaustické v jistém její bodu a tento bod vidíme. Z toho však vysvítá jasně, když více neb méně šikmo nazíráme, že paprsek padne do jiného a jiného bodu plochy kaustické. Když se skleníme zrcadlící šikmeji, tu obraz zdánlivě vystupuje a blíží se k nám (obr. 55.); když pak dva pozorovatelé současně nazírají, jeden více kolmo, druhý šikmo, vidí každý z nich jiný obraz; něco podobného není při zrcadle rovném právě proto, poněvadž tam paprsky odražené jsou přímě homocentrickými



Ob. 55.

[*§39. Posunutí svítícího bodu deskou. *]

[*Obr. 56. znázorňuje postup paprsků skleněnou deskou, kde se tedy lom provine vpakuje dvakrát, při čemž se předpokládá, že paprsky dopadají téměř kolmo na desku. Obraz B zde vznikající je proti předmětu A patrně desce blíže. Posunutí S vypočteme z tloušťky e desky souvislostmi následujícími:



Ob. 56.

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{PN}{e-S}$$

$$\operatorname{tg}\beta = \frac{PN}{e}$$

$$\frac{\operatorname{tg}\alpha}{\operatorname{tg}\beta} = n = \frac{e}{e-S},$$

tudíž:

$$\frac{n-1}{n} = \frac{S}{e}$$

Pro sklo korunové jest $n = \frac{3}{2}$, $\frac{S}{e} = \frac{1}{3} = 0,33$.

„ „ flintové „ $n = \frac{7}{4}$, $\frac{S}{e} = \frac{3}{7} = 0,42$.


Lze-li posunutí S měřiti (mikroskop), pak se vypočítá z tohoto posunutí a tloušťky skla e exponent lomu

$$n = \frac{e}{e-S}. \quad *]$$

Lom plochami sférickými.

§40. Definice.

U lámavých ploch sférických oddělujících ústředí I na př. vzduch od jiného II. na př. skla, platí bytostí definice jako u zrcadlících ploch sférických §20. Pojmy: geometrický střed C, poloměr r, vrchol S, osa hlavní CS, osa vedlejší CS, mají zde týž význam.



Ob. 57.

V jedné věci však vytknuti jest důležitý rozdíl. Mající jednati o zrcadlení na plochách sférických, vyšli jsme od plochy konkavní a odvodili jsme příslušné formule platící za typické. Zde naopak vycházíme od plochy konvexní, předpokládajíce ovšem, že ústředí II jest opticky hustší než I — a odvozujeme opět formule typické.

Zdánlivý tento nesouhlas proměňuje se v souhlas, když uvážíme, zde i onde má plocha sférická býti směrem. U zrcadlení jest to konkavní, u přechodu světla z ústředí řidšího do hustšího naopak konvexní.


Formule typické mají tedy zde i onde ten společný význam, že platí pro sférické plochy směrné.

§41. Aberrace sférická.

Budiž bod A v ústředí I svítícím bodem, od něhož vycházejí paprsky homocentrické. Jeden z nich míří ku středu C plochy

sférické, dvakrát kolmým k ní směrem; jest to paprsek hlavní $A\,S$, který
vnijde do ústředí I ve vlastním svém směru. Vedeme-li vedle toho vzaté dva
paprsky jiné, jeden $A\,M$ hlavnímu velmi blízký, druhý $A\,M'$ od něho vzdálený, vedeme-li dále k bodům M a M' poloměry $C\,M$ a $C\,M'$, obdržíme úhly dopadu α a α'; k těmto sestrojíme (nebo přičítajíme)

Obr. 58.



úhly lomu β a β' dle rovnice $\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = n = \frac{\sin\alpha'}{\sin\beta'}$.


Provedeme konstrukci přesně shledáme jako při odrazu na ploše sférické, že sestrojené tři paprsky lomené se zdaleka neprotínají v témže bodě. Vychází z toho, že paprsky homocentrické lámajíce se plochou sférickou, neprotínají se v témže bodě, nýbrž v celém pásmu bodů, kteréž ve své soustavě tvoří v rovině nákresné křivku a v prostoru plochu diakaustickou, zde reálnou.

Velmi jasně znázorňuje vznik křivky diakaustické obr. 59. sestrojený pro paprsky rovnoběžně dopadající.

Také zde – jako při zrcadlech – mluvíme o aberraci sférické, která v tom má svůj základ, že paprsky krajní se lámou silněji než paprsky střední.

Aberraci vyloučíme se opět – jako u zrcadel sférických – jen tím, že vyloučíme paprsky krajní a připustíme jen paprsky hlavnímu co možná blízké, tedy centrální. K vyloučení paprsků krajních užíváme také zde diafragmat aneb volíme lámavé plochy sférické malého otvoru. Kreslíme-li zvětšeně, musíme takové plochy důsledně jako povinné znázorňovati, jich sféricitu jen naznačujíce.

Obr. 59



$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = n$;

Pro čáru D jest $n = 3/2 = 1{\cdot}5$


$r = 4$ cm.

A. Lom plochou sférickou konvexní (sběrnou)

§ 42. Svítící bod.

Vložme svítící bod A na ose (obr 60) v ústředí I. Vedeme paprsek hlavní $A\,S$, který jsa kolmým ku ploše sférické vniká do ústředí II ve vlastním směru. Dále vedeme ještě paprsek $A\,M$, vedeme-li poloměr $C\,M$, je α úhel dopadu, k němu počítejme úhel lomu β dle známého exponenta n, a tím obdržíme paprsek lomený $M\,B$. Bod B, ve kterém tento paprsek lomený protíná hlavní osu, jest obrazem bodu A, tedy s tímto sdružený.

Obr. 60.



Zavedme dále $SA = a$, $SB = b$.

Oblelost A počítáme pozitivně ve smyslu od S k A, naopak b pozitivně ve smyslu od S k B.

Hledajíce <u>zákon</u>, kterým se <u>vzájemná poloha</u> obou sdružených bodů A a B řídí, musíme vycházeti od základní rovnice pro lom, totiž

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = n.$$

Poněvadž jest však paprsek AM velice blízký paprsku hlavnímu AS, jest úhel α a tudíž i úhel β velmi malý; v tom případě smíme na místě sinus položiti arcus, platí tedy dle zákona Ptolomaeova poslední rovnici ve tvaru

$$\alpha = n\beta.$$

Do této rovnice zavedme podobně jako při zrcadlech úhly středové φ, ψ, ω; obdržíme:

$$\varphi + \omega = n(\omega - \psi).$$

Uvážíme-li, že bod M dle základní podmínky je velmi blízký bodu S – (kreslíme jej dále jen k vůli zřetelnosti) – pak připustíme, že by obloučky opsané kolem B poloměrem $SB = b$ a kolem A poloměrem $SA = a$ tuhěmi spřímými s obloučkem SM, jemuž náleží střed C a poloměr r, nebot přičaly by konečně všechny tři <u>v malinkou přímku kolmou na ose</u>; tuto věc dlužno míti na mysli, nemá-li se zdáti absurdním, že by obloučky „konkavní“ mohly splynouti s obloučkem „konvexním.“

Můžeme tedy psáti:

$$SM = a\varphi = r\omega = b\psi$$

čili $$\varphi = \frac{SM}{a},\ \omega = \frac{SM}{r},\ \psi = \frac{SM}{b};$$

dosadíme-li tyto hodnoty do hořejší rovnice a krátíme-li obloučkem SM, vyjde

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{r} = n\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b}\right)$$

čili $$\frac{1}{a} + \frac{n}{b} = \frac{n-1}{r}.$$

To jest základní rovnice pro lom světla na ploše sférické.

Rovnice tato jest analogou té, kterouž jsme odvodili pro odraz světla na ploše sférické, a kterážto zní: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = -\frac{2}{r}$.

Jest zajímavo, že se tato rovnice z předcházející dá jako případ poměrně snadno odvoditi. Pravili jsme svého času, že lom přechází v odraz pro speciální hodnotu exponentu (viz § 31.)

$$n = -1$$

Pro tuto obdržíme ze všeobecné rovnice pro lom

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = -\frac{2}{r}.$$

Tato rovnice jest skutečně identická s rovnicí pro zrcadlo, nebot znamení veličin r a b plyne z toho, že jsme při zrcadle vyšly od plochy konkávní (proto zde $-r$), a že bod B byl na straně opačné – následkem odrazu zpět – (proto zde $-b$).

Mějme nyní provésti rozbor rovnice

$$\frac{1}{a} + \frac{n}{b} = \frac{n-1}{r},$$

postupujeme zcela podobně jako v § 22.

1.) Je-li $a = \infty$, jest $b = f_2$, nekonečně vzdálený bod A má svůj obraz v ohnisku F_2. Toto ohnisko náleží tudíž k bodům B, a proto mimo jiné také F zobrazení index 2. Z rovnice hořejší plyne:

$$f_2 = \frac{n}{n-1} r.$$

2.) Blíží-li se světící bod A z nekonečné dálky vždy více a více k lámavé ploše sférické, vzniká jeho obraz B vždy dále, až se octne v nekonečné dálce; stane-li se tak, je-li tedy $b = \infty$, jest $a = f_1$, světící bod je v ohnisku F_1. Toto ohnisko náleží zase k bodům A, a proto mimo zde – na rozdíl od předešlého – jak f tak F obdržení index 1. Z rovnice hořejší plyne pak $f_1 = \frac{1}{n-1} r$.


Na rozdíl od zrcadel sférických máme tedy zde při lomu světla plochou sférickou ohniska <u>dvě</u>, F_1 a F_2, s dálkami f_1 a f_2. Patině jest

$$\frac{f_2}{f_1} = n\ ;\quad f_2 - f_1 = r.$$

V obraze 61. je poloha těchto ohnisek nakreslena a sice správně pro případ $n = \frac{3}{2}$, což by odpovídalo sklu korunovému.

Poloha bodů F_1, S, C, F_2 jest poměrná vůči předmětu bodu mezi S a C, t.j.: $F_1S : CF_2$

ob. 61.




3.) Postoupí-li bod A přes F_1, pak paprsky sférickou plochou lomené divergují, obraz B stane se tudíž virtuálním; půjde-li A od F_1 k S, půjde B od ∞ do S; ve vrcholu S splynou A a B, takže jest S bodem dvojitým.

§ 43. Svítící předmět.

Je-li na místě jediného bodu dáno celé jich pásmo, tedy svítící na př. přímka a pod., platí o zobrazení takového předmětu vše to, co bylo řečeno v §23. Pokud se jedná o předmět proti poloměru r rozměrů malých, může se předpokládati, že lineární předmět se zobrazuje zase lineárně t. j. že nevzniká žádná deformace obrazu.

Je-li tomu tak, pak lze polohu obrazu nalézti konstrukcí velmi jednoduše. Provedeme konstrukci pro určitý případ konkrétní, totiž pro $n = \frac{3}{2}$, což by odpovídalo asi sklu flintovému. Pro tento případ je disposice bodů F_1 S, C, F_2 dána obrazem 62, jsou totiž tečny jen sobě rovné ve vrcholu S, což jest pro výkres výhodnější.

ob. 62.



Obraz B' bodu A' obdržíme (zcela analogicky jako při obr. 32 α) β) γ) — jako průsek libovolných dvou z následujících tří paprsků:


1. Paprsku hlavního A'H, který míří ke středu C a tudíž se neláme.

2.) Paprsku A'M, jenž rovnoběžného, který se láme obrazem F_2.

3.) Paprsku A'N obrazem F_1 procházejícího, který postupuje pak rovnoběžně s jeho.

V obr. 63. α), β), γ) jsou tyto konstrukce provedeny a sice α) dle 1, 2), dále β) dle 1, 3) a konečně γ) dle 2, 3. Při tom je sférická plocha dle jako přímá kreslena, jakož v limitě jest správné.

ob. 63.



K obrazům 63 plynou ihned následující vztahy:

$$\frac{B\,B'}{A\,A'} = \frac{b - f_2}{f_2} = \frac{f_1}{a - f_1} = \frac{b - r}{a + r}.$$

Poměr $\frac{b - f_2}{f_2}$ plyne z podobnosti trojúhelníků F_2BB' a F_2SM (α),

" $\frac{f_1}{a - f_1}$ " " " F_1SN a F_1AA' (β)

" $\frac{b - r}{a + r}$ " " " CBB' a CAA' (α) (β).

Kontrola jest dána relací:

$$\frac{b-f_2}{f_2} = \frac{f_1}{a-f_1} = \frac{b-f_2+f_1}{f_2+a-f_2} = \frac{b-(f_2-f_1)}{a+(f_2-f_1)},$$

kdež jest, jak dříve dokázáno, $f_2 - f_1 = r$.

Zároveň vyhlásí rovnice:

$$(a-f_1)(b-f_2) = f_1 f_2,$$

která jest jen jinou formou rovnice důvěrné:

$$\frac{1}{a} + \frac{n}{b} = \frac{n-1}{r}.$$

Analogie s §§ 2, 3. jsou zde očividné.

Formule uvedené jsou typické. Pokud jest $\frac{BB'}{AA'}$ positivní, znamená to, že obraz jest obracený reálný. Změna znamení poukazuje na to, že obraz se stane přímým, virtuálním.


Z formulí jest dále viděti, že se obraz BB' zvětšuje tou měrou, kterou se obraz od svého ohniska (obrazového) F_2 vzdaluje ($b-f_2$), anebo kterou se předmět k svému ohnisku (předmětovému) F_1 blíží ($a-f_1$). –

B.) Lom plochou sférickou konkávní (rozptylnou).

§ 44. Svítící bod.

Z případu předešlého obdržíme nynější změnou znamení poloměru r. Tím se zároveň změní znamení délek ohniskových f_1 a f_2 t. j. ohniska F_1 a F_2 vymění své místo. (obr 64.) –

obr. 64.




Dále máme $\frac{1}{a} + \frac{n}{b} = -\frac{n-1}{r}$.

Pokud je a positivní, musí b býti vždy negativní, t. j. obraz bodu A nalézajícího se před sférickou plochou konkávní jest vždy virtuálný a padne zpět, t. j. ve směru rozbíhajících se paprsků zpět prodloužených také před konkávní plochou sférickou.

Obr. 65. znázorňuje, jak dlužno nyní významy obou ohnisek rozuměti. Obraz jest pendant k obr. 61. a jako tato kreslen pro $n = \frac{3}{2}$. Sférická plocha jest rozptylnou vůči pomyslným paprskům naznačeným, jak se strany předmětové (od $A \rightarrow$), tak se strany zpátečné ($\leftarrow$).

obr. 65.



§ 45. Svítící předmět.

Typické rovnice:

$$\frac{BB'}{AA'} = \frac{b-f_2}{f_2} = \frac{f_1}{a-f_1} = \frac{b-r}{a+r}$$

$$(a-f_1)(b-f_2) = f_1 f_2$$

zůstávají i zde v platnosti, jenom že se mění znamení. Na místě r dlužno psáti $-r$, tudíž na místě f_1, f_2 dlužno psáti $-f_2$, $-f_2$; na místě b položíme $-b$. Tím vyjde:

$$-\frac{BB'}{AA'} = \frac{f_2-b}{f_2} = \frac{f_1}{a+f_2} = \frac{b-r}{a-r}.$$


Jak nyní vypadá konstrukce obrazu k danému předmětu, znázorňuje obr. 65., (kreslený opět pro $n = \frac{3}{4}$ jako obr 63.), při čemž jsou však případy α), β), γ) dohromady shrnuty. Přirozeně-li – jakož se stalo – znamení – $\frac{BB'}{AA'}$ –

což znamená, že obraz je nyní *přímý*, kde dříve — u plochy konvexní — byl obrácený, obrácíme

poměr $\frac{f_2 - b}{f_2}$ z trojúhelníků $F_2 B B'$ a $F_2 S M$,

" $\frac{f_1}{a + f_1}$ z " $F_2 S N$ a $F_1 A A'$,

" $\frac{b - r}{a + r}$ z " $C B B'$ a $C A A'$.



ob. 66.

[* Zákony o lámavých plochách sférických dle názorů novější geometrie. *]

[* § 46. Základní rovnice. *]

[* Úkazy lomu světla na plochách sférických dají se velmi jednoduše a elegantně popsati na základě geometrie novější ve způsobu docela analogickém, jako jsme ukázali při zrcadlech sférických.

Polohu svítícího bod A stanovme poměrem $\frac{CA}{SA}$ i podobně polohu jeho obrazu B stanovme poměrem $\frac{CB}{SB}$.

Body A a B jsou *sdružené* (konjungované). Tato sdruženost má svůj formální výraz v tom, že mezi poměry $\frac{CA}{SA}$ a $\frac{CB}{SB}$ jest *určitý vztah*, totiž vztah jednoduché *proporcionality*.

Jest to totiž obvyklou úměrou: $\frac{CA}{SA} : \frac{CB}{SB} = n$,

a sice jest n relativní exponent lomu I středí II vzhledem k I.

Důkaz této rovnice provedeme zcela v tomu způsobu a na témže základě jako v § 26. Jest totiž:

$$\frac{CA}{SA} : \frac{CB}{SB} = \frac{\sin CMA}{\sin SMA} : \frac{\sin CMB}{\sin SMB} = \frac{\sin \alpha}{\sin(90-\alpha)} : \frac{\sin(-\beta)}{\sin[-(90+\beta)]}$$

$$= \operatorname{tg}\alpha : \operatorname{tg}\beta.$$

Poněvadž jsou pak úhly α a β velmi malé, platí

$$\operatorname{tg}\alpha : \operatorname{tg}\beta = \operatorname{arc}\alpha : \operatorname{arc}\beta,$$

tudíž dle zákona Snellovaca $= n$,

čímž hořejší rovnice dokázána.

Řady bodové $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, \ldots$

$B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, \ldots$,

které jsou k sobě přidruženy dle zákona

$$\frac{CA}{SA} : \frac{CB}{SB} = n,$$

nazývají se *kollineárními* čili též *projektivními*.

A nejen ve hlavní ose, nýbrž na každé vedlejší, kteréž vedeme středem C, platí totéž. Jest tedy celý prostor před zrcadlem, pokud se vztahuje na předmět svítící rozměrů jakýchkoliv, kollineárním s prostorem za zrcadlem, pokud se vztahuje na obrazy těchto předmětů.

Střed C se pak zove *středem kollineace*; zrcadlo SM *rovinou kollineace*.

Body F_1 a F_2 jsou *sdružené* s body nekonečně vzdálenými a sice takto: pro $A\infty$ . . . . . sdružen F_2,

F_1 . . . . . " $B\infty$.

Podobně jest celá *rovina* v bodech F_1 a F_2 na osu kolmo vztížená (*roviny ohniskové*) sdružená s rovinou nekonečně vzdálenou.


U zrcadla bylo $n = -1$; reciproká hodnota -1 jest s původní identickou. Tam tedy byly body A a B *jednoznačně sdružené* - daly se vyměniti.

Zde *není* reciproká hodnota $\frac{1}{n}$ identická s původní n, a proto zde *nelze* body A a B *vyměniti*. Proto rovnice


$$\frac{1}{a} + \frac{n}{b} = \frac{n-1}{r}$$

není souměrnou vzhledem k *a* a *b*.

Příčinou této různosti mezi odrazem a lomem jest již zjev základní: u odrazu lze vyměniti paprsek dopadající a odražený, u lomu však nikoliv.



obr. 67.



Jeli 1 dopadající, jest 2 odražený (obr. 67) — a naopak: je-li 2 dopadající, jest 1 odražený. U lomu však jinak: Je-li 1 dopadající, je 2 lomený. Je-li (2) dopadající, není (1) lomený, nýbrž 3, zde tedy výměna není možná.

Proto jest sdružení bodů A a B u odrazu jednoznačné, u lomu však nikoliv. *]

[* § 47. Konstrukce pro lámavou sférickou plochu sběrnou (konvexní). *]

[* Řady bodové A a B, které jsou na společné (hlavní) ose, můžeme — myslíce si tuto osu jakoby dvojitou — od sebe oddáliti a přivésti tak body sdružené do polohy perspektivní. K tomu cíli otáčíme osu bodů B kolem bodu S do polohy na př. svislé nechajíce A v poloze vodorovné.


Střed perspektivnosti O nalezneme (obr. 68.) spojujíce sdružené body $A\infty$: . . . . . : F_2, F_1 . . . . . $B\infty$.

Přímky protnou se v bodě O.

Vedeme-li nyní bodem O jakoukoli přímku X, protne tato obě osy, předmětů i obrazů, v bodech sdružených A i B.

Otáčí-li se X kolem, obdržíme celou nepřetržitou řadu sdružených bodů A a B. Při tom dává konstrukce více, než o čem jsme jednali.

obr. 68.




Nebot může bod A přijíti též za zrcadlo, t. j. na pravou stranu osy CA, u kostnička dává úhled jeho sdružený bod B.

To má ten smysl: Možno připustiti též virtuální (geometrické), body A, k nimž paprsky mají konvergenci i odtud zase pak též obrazy B. Srovnej § 27.

Tím jest pak dána kontinuita od $+\infty$ do $-\infty$ jak pro body A tak pro B. *]

obr. 69.



[* § 48. Konstrukce pro lámavou sférickou plochu rozptylnou (konkavní). *]

[* Rozdíl od předešlého jeví se zde změnou polohy středu C, obrazec F_1 a F_2 a tím pak i středu perspektivnosti O. Také zde dává konstrukce více než o čem jsme jednali dosud, tím že připouští i virtuální svítící body A, ku kterýmu za plochou sférickou paprsky konvergují. — Náš výklad nabude zde veliké rozmanitosti. *]

Soustavy dvou lámavých ploch sférických.

(Čočky.)


§ 49. Definice

U čoček jsou dány dvě lámavé plochy sférické, uzavírající ústředí (sklo, křišťál, kamenec nil a pod.) exponentu relativního $n > 1$ obostranně proti ústředí = vzduch.

Za typický případ předpokládáme ten, kdy obě plochy sférické jsou sběrné.

Při přechodu vzduch ... čočka jest to plocha konvexní – (exponent $n > 1$), při přechodu čočka ... vzduch (exponent $\frac{1}{n} < 1$) jest to však) plocha konkavní — ve směru paprsků postupujících smíšeno – tudíž na soustavě také konvexní.

Jinými slovy: Čočkou typickou je čočka bikonvexní. (obr 70.)




Mějme u čoček dvě plochy sférické máme též dva středy křivosti C_1 a C_2 k nimž náležející. Přímka jimi vedená jest osa čočky (obr 70.). Vzdálenost S_1 a S_2 měnije tloušťku čočky.

„Tloušťka" se tedy mění vždy, na ose čočky.

Činíme rozeznávame dvojí hlavní druh čoček, totiž:


A.) čočky spojné
B.) čočky rozptylné.

Ke druhu A) náleží (obr 71.):



1. počka bikonvexní (dvojvypuklá)
2. „ plankonvexní (plosko-vypuklá)
3. „ konkavkonvexní (duto-vypuklá).

Ke druhu B) náleží (obr. 72.):



1. čočka bikonkávní (dvojdutá)
2. „ plankonkávní (plosko-dutá)
3. „ konvexkonkávní (vypuklo-dutá).

Vycházíme-li od základního typu čoček, obdržíme:

A.)	1.	r_1	= +	r_2	= +	B.)	1.	r_1	= −	r_2 = −
	2.	r_1	= +	r_2	$= \infty$		2.	r_1	= −	$r_2 = \infty$
	3.	r_1	= +	r_2	$> r_1$		3.	r_1	= −	$r_2 < r_1$

Jak již řečeno, vztahují se tato označení na onen základní typus čočky, od něhož vycházíme. Geometricky považujeme by tato označení + a − nebyla důsledná; neboť při základním typu leží středy C na opačných stranách a přece označujeme poloměry stejným a sice pozitivním znamením. Avšak označení to stává se opávněným, když fysikálně posuzuje, totiž tak, že znamení + odpovídá sférická plocha ve směru postupu paprsků sběrná.


Čočky druhu A) jsou uprostřed nejsilnější a ku kraji ztenčují se, slabšími u čoček druhu B) jest naopak kraj nejsilnější a prostřední část nejslabší. Čočky A.) zovou se spojnými čili též zkrátka spojkami, naproti tomu čočky B) rozptylnými čili rozptylkami, protože A) činí paprsky konvergentnějšími, kdežto čočky B) je činí divergentnějšími.

Čočky velice tenké.

§ 50. Svítící bod.

Mějmež (obr 73.) čočku základního typu; $C_1 C_2$ budiž její osa. Na této ose volme svítící bod A.

ob. 73.



Budiž především připomenuto následující. Již při lomu na jediné ploše sférické položili jsme za podmínku, aby jen takové paprsky byly připuštěny, které jsou v nejbližší blízkosti paprsku hlavního. Neboť jen s touto výminkou bylo lze říci, že vídícímu bodu přísluší opět bod. Když již při jediné ploše sférické byla tato podmínka nutna, tím více je její nutnost patrna, když jedná se o lom na na dvou plochách sférických. Musíme tedy při čočkách také velmi důrazně připomenouti, že jen takové paprsky smějí býti připuštěny, které jsou hlavnímu co možno blízké. Jinak by nastala tak zv. sférická aberrace čoček.

Musíme tedy také vzhledem k volnému, svíticímu bod A předpokládati, že jen takové paprsky vnikámu na čočku dopadati, které jsou hlavnímu blízké. Mezi nás v tom myšlení výkres, který jen k vůli zřetelnosti proveden tak, jakoby paprsky od bodu A na čočku dopadající se značně rozbíhali od hlavního paprsku.

Tímto paprskem hlavním jest zde ten, který spřízná s osou; neboť tento dopadají všude kolmo na plochy kulové postupuje ve svém směru nezměněném.

Vedme dále paprsek $A_1 M_1$; tento lámeme se především ve směr $M_1 B_1$ (ku kolmici), jsou tedy body A_1 a B_1 vespolek sdružené vzhledem k ploše sférické první.

Paprsek $M_1 M_2$ - který jakoby vycházel od bodu B_1 - lámeme se ve směr $M_2 B_2$ (od kolmice) / přijme A_2 na místo B_1 - pak jsou analogicky body A_2 a B_2 vespolek sdružené vzhledem k ploše sférické druhé.

Opakují se zde tedy lom na ploše sférické dvakrát. Pro lom na jedné i druhé ploše platí pak rovnice již známá, totiž:

$$\frac{1}{a} + \frac{n}{b} = \frac{n-1}{r}.$$

Tuto rovnici musíme tedy napsati dvakráte, jednou pro plochu 1/indexy 1/, podruhé pro plochu 2 (indexy 2). Při tom pozorujme, že pro lom na ploše první platí exponent $= n$,

pro lom pak na ploše druhé exponent $= \frac{1}{n}$, ponévadž se tu vracíme do (původního) prostředí. —

Dále mějme na mysli:

Při přechodu od sférické plochy 1) ke 2) se mění: znamení poloměru, proto $-r_2$, dále znamení dálky, proto $-a_2$.

Máme tedy:
$$\frac{1}{a_1} + \frac{n}{b_1} = \frac{n-1}{r_1}$$
$$-\frac{1}{a_2} + \frac{\frac{1}{n}}{b_2} = \frac{\frac{1}{n}-1}{-r_2}$$

Při tom jest:
$$a_1 = \mathfrak{S}_1 A_1, \quad a_2 = \mathfrak{S}_2 A_2$$
$$b_1 = \mathfrak{S}_1 B_1, \quad b_2 = \mathfrak{S}_2 B_2$$
$$(A_2 = B_1)$$

Přirovnáváme-li tyto veličiny k sobě vidíme, že dvě z nich neliší se od sebe valně, totiž
$$b_1 = \mathfrak{S}_1 \overset{A_2}{B_1} \quad \text{a} \quad a_2 = \mathfrak{S}_2 \overset{A_2}{B_1};$$
tyto veličiny udávají vzdálenost téhož bodu (totiž $A_2 = B_1$) a sice od prvé a od druhé plochy sférické, liší se tedy od sebe pouze o tloušťku čočky, tudíž tím méně, čím slabší čočka jest.

Abychom věc zjednodušili, budeme v následujícím předpokládati, že tloušťka čočky proti ostatním rozměrům, zejména proti poloměrům r_1 a r_2 téměř mizí. Omezíme tedy další výklady na čočky velice tenké (přísně vzato: nekonečně tenké).

Tím stane se: $a_2 = b_1$.

Následkem toho můžeme obě hořejší rovnice tak kombinovati, aby tato veličina se vyloučila.

Píšeme je k tomu účeli v následující formě:
$$\frac{1}{a_1} + \frac{n}{b_1} = \frac{n-1}{r_1}$$
$$-\frac{n}{a_2} + \frac{1}{b_2} = \frac{n-1}{r_2};$$
druhá rovnice povstává z hořejší násobením n. — Sečtením obou vyjde:
$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{b_2} = (n-1)\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right)$$
a to jest rovnice platící pro čočky. Jestě vynecháme indexy — poněvadž pro čočku ve celek nemají významu. Píšeme tedy a místo a_1, b místo b_2.

Tím vyjde konečně: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = (n-1)\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right)$.

V této rovnici (počítá) se tedy a pozitivně ve směru od čočky na levo (tam, kde svítící bod), kdežto b naopak ve směru od čočky na pravo tak jako u lámavých ploch sférických již dříve bylo zavedeno.

Na pravo rovnice jest vše konstantní. Na levo jsou hodnoty reciproké. Abychom v souhlasu s tím měli také na pravo hodnotu reciprokou, zavedeme ke zkrácení novou veličinu f ve způsobu takovém, aby bylo

$$(n-1)\cdot\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right) = \frac{1}{f}.$$

Tím obdržíme konečně definitivní rovnici pro čočky ve formě:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f},$$

Forma tato jest velmi pozoruhodná, neboť jest to <u>tatáž rovnice</u>, jakou jsme odvodili pro <u>zrcadla sférická</u>. Jako tam značí také zde a vzdálenost svítícího bodu od čočky, (tam od zrcadla), b vzdálenost jeho obrazu od čočky, (tam od zrcadla). Rovnice čočková je tedy opět souměrnou vzhledem k veličinám a a b, neboť i vzhledem k sdruženým bodům A a B, <u>jež tedy lze vespolek zaměniti.</u>

Budiž však připomenuto ještě jednou, že rovnice naše jest rovnicí <u>přibližnou</u>, že platí přísně jen pro takové čočky, které by byly „nekonečně" tenké; pročež však čočky skutečné mohou býti na nejvýše <u>velmi</u> tenké neb <u>ne mnoho</u> tlusté, tedy platí rovnice naše pro čočky <u>skutečné</u> jen approximativně.

§ 51. Rozbor rovnice čočkové.

Stanovme především význam veličiny f. Tento je zcela podobný jako u zrcadel. Je-li totiž $a = \infty$ je $b = f$. — Udává tedy f délku brdu, ve kterém se sbíhají paprsky na čočku z nekonečně vzdáleného bodu t. j. rovnoběžně dopadající. Jako u zrcadla jmenujeme i u čoček tento bod <u>ohniskem</u>, a délku f <u>dálkou ohniskovou.</u>

Charakterisuje se především o tom, kam asi u čoček ohnisko padne. U čoček <u>bikonvexních</u> — a ty jsou naším typem základním, —

bývá z pravidla $r_1 = r_2$, t. j. čočky se brousívají na obou stranách se stejným zakřivením. Co se pak týče exponentu n, tu závisí ovšem především na <u>kvalitě</u> skla.

Pro obyčejné sklo tak zv. korunové bývá n asi $= \frac{3}{2}$, pro těžké sklo flintové asi $= \frac{7}{4}$; to jsou hodnoty ovšem jen okrouhlé — neboť přesnější jich udání záleží na <u>kvalitě</u> světla — na délce vlny světelné.

Položíme-li tedy ve formuli:

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right)$$

především $r_1 = r_2$,


obdržíme: $f = \frac{r}{2(n-1)}$.

A z toho dále:

pro sklo korunové: $n = \frac{3}{2}$, $f = r$


„ „ flintové: $n = \frac{7}{4}$, $f = \frac{2}{3}r$. (obr. 74. a 75.)

obr. 74.



čočka korunová [$f = r$]

obr. 75.



Čočka flintová [$f = \frac{2}{3}r$]

Tyto údaje mohou nás vždy o poloze ohniska <u>orientovati</u> — a o více se při této úvaze ovšem nejedná. Obyčejné čočky jsou vždy korunové. Dlužno nejprve k tomu, že u zrcadel sférických jest vždycky <u>přesně</u> $f = \frac{1}{2}r$.


Další poznámka týče se znamení veličiny f.

Čočky spojné (druhu A, § 49.) mají f pozitivní, čočky rozptylné (druhu B, § 49) mají f negativní.

Význam toho jest. U čoček spojných sbíhají se paprsky rovnoběžné skutečně na straně pozitivné — ohnisko je <u>reálné</u>, naproti tomu u čoček rozptylných


rozbíhají se paprsky ty na straně positivní (obrazu), a sbíhají se jsou v prodloužení geometrickém na straně negativní (obr. 76. a 77.)

obr. 76.



Čočka konvexní, (f = −r)

obr. 77.



Čočka flintová (f = −2/3 r)

Vše to vyplývá ze všeobecné formule:

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right)$$

platící pro tyčinu, čočku vikonvexní. Pro čočku plankonvexní jest $r_2 = \infty$; i pro konkavkonvexní je r_2 negativní, ale $> r_1$, takže znamení veličiny f zůstává positivní.

Při čočce bikonkávní jest jak r_1 tak r_2 negativní, tudíž také f; při plankonkávní jest $r_2 = \infty$; při konvexkonkávní jest r_2 positivní, ale $> r_1$, takže znamení veličiny f zůstává negativní.

Reciproká hodnota $\frac{1}{f}$ stanoví optickou mohutnost čočky. Pro tuto zavádíme zvláštní jednotku = dioptrii. Pravíme, že optickou mohutnost jedné dioptrie má čočka, jejíž délka ohniskové jest jeden metr. Obdržíme tudíž optickou mohutnost v dioptriích u jiné čočky, když vyjádříme její délku ohniskovou f v metrech a počítáme pak reciprokou hodnotu $\frac{1}{f}$.

Další diskuse čočkové

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

jest úplně totáž jako u zrcadla sférického.


Úplný jest analogie mezi zrcadly sférickými a čočkami velmi veliká. Čočky spojné chovají se jako zrcadla konkávní, čočky rozptylné jako zrcadla konvexní. Jako zrcadla konkávní tak mají i čočky spojné obrazy buď reálné neb geometrické; naproti tomu mají čočky rozptylné obrazy jen

geometrické jako zrcadla konvexní.

§ 52. Svítící předmět.

Předpokládali jsme v úvahách předcházejících, že jest předmětem svítící bod ležící na ose. Dejme však tomu, že na místě toho jest předmětem svítící přímka $A\,A'$ na ose kolmá (obr. 78).

obr. 78.



V tomto případě platí především veškeré poznámky, které jsme v téže příčině uvedli u sférických odrážejících i lámavých ploch.

Předpokládáme-li totiž, že přímka tato je poměrně krátká, pak nenastane deformace obrazu a postačí tudíž, když naleznemu obraz k bodu A'. K tomu cíli vedeme z tohoto bodu paprsky dva, jeden rovnoběžný s osou — a ten lomem prochází ohniskem; druhý pak vedeme ohniskem — a ten stává se lomem rovnoběžným s osou (obr 78). Bod B, ve kterém se oba paprsky lomené protínají, jest obrazem bodu A dle pravidla, že dva body jsou sdružené jsou určeny dvěma páry sdružených paprsků. Mající pak bod B' vedeme $B'B$ kolmo na osu; i jest tato přímka obrazem svítící přímky $A\,A'$.

Provádějíce jednoduchou tuto konstrukci při jaké dané čočce jako jest na př. čočka v obr. 78., přijdeme do jistých nesnází, kterých neníme nuceni pomínouti. Vedeme totiž z bodu A paprsky až k čočce zvláštní v pochybnostech, máme-li je vésti až k první ploše nebo až ke druhé anebo snad až k nějakému bodu uvnitř; pravidlo konstrukce nijak o tom se neznamenává.

Dvůvak tyto nesnáze spočívají v tom, že čočka, pro kterouž konstrukci provádíme, není nekonečně tenká, nýbrž že bývá — k míli zřetelnosti vzkresu z pravidla — i velmi značně silná. To však nemá býti; neboť formule pro čočky odvozená

platí jen pro ten případ, že je čočka nekonečně tenká – t. j. že obě plochy čočky jakoby splývají dohromady v ploše $L L'$, že tedy čočka jest jaksi jakoby tenoučkým lístkem, jelikož plochy jsou nad to temeně rovinné, ponévadž zůstáváme v bezprostřední blízkosti osy, kde zakřivení ještě nevynikáí. Zkrátka konstrukce platí pro čočky nekonečně tenké předpokládá čočku tak, jakoby byla rovným lístkem $L L'$ - jak v obr. 78. naznačeno. Je-li tomu tak, pak ovšem veškeré hořejší nesnáze odpadávají; pak jest to fakticky jedno, vedeme-li papírek až k první neb druhé ploše, ponévadž obě plochy splývají vespolek.

Proto jest také výkres v obr. 78. tak proveden, že papírky jdou až k rovině $L L'$, která jakoby čočku (čočku) celou zastupuje; myslíme si tedy mezi čočku tak tenoučkou, že by s rovinou $L L'$ splývala.

Z výkresu vyplývají dle jednoduchých vět geometrických následujících výrazy pro poměr mezi daným předmětem $A A'$ a jeho obrazem $B B'$.

$$\frac{B B'}{A A'} = \frac{b-f}{f} = \frac{f}{a-f}.$$

Poměr $\frac{b-f}{f}$ plyne z trojúhelníků FBB' a FOM

„ $\frac{f}{a-f}$ „ „ „ FON a FAA'.

Z obou hořejších úměr následuje však dle známé věty:

$$\frac{B B'}{A A'} = \frac{b-f+f}{f+a-f} = \frac{b}{a}.$$

Z těchto rovnic vyvítá opět úplná analogie mezi čočkami a zrcadly; jsou to týchž rovnice, které jsme odvodili pro zrcadlo sférické.

Zvláště důležitou je však rovnice poslední. Dle známých vět geometrických vyplývá z ní totiž, že přímka $A'B'$ prochází vždy týmž bodem O ležícím v rovině $L L'$. Reprezentuje tudíž přímka $A'B$ jakoby papírek, kterýž, nezlomen ve svém vlastním směru prochází čočkou. Touto vlastností staví se po bok ose AOB, která také reprezentuje papírek procházející – následkem kolmého

dopadu na plochy sférické – bez lomu čočkou ve svém vlastním směru. Proto se zove přímka $A'B'$ též osou a to osou čočky vedlejší, kdežto přímka AOB – která prochází geometrickými středy sférických ploch – se zove osou hlavní. Bod O zove se často optickým středem čočky.

Znajíce tento význam vedlejší osy můžeme konstrukci v obr. 78. provedenou také tak modifikovati, že na místě jednoho z papírků dříve vedených (na př. na místo $A'M$ nebo AN) vedeme papírek hlavní $A'O$ tímto optickým středem, který pak jednoduše dále prodloužíme.

Z rovnice: $\frac{B B'}{A A'} = \frac{f}{a-f} = \frac{b-f}{f}$


vyplývá opět jako u zrcadel, že se obraz $B B'$ zvětšuje tou měrou, kterou se obraz od ohniska vzdaluje $(b-f)$ neboť předmět ohniskem bližší $(a-f)$.

Mimochodem obdržíme též: $f^2 = (a-f)(b-f)$

zcela tak jako u zrcadel. Budiž zde podotčeno, že tato rovnice jest jen jinou formou známé rovnice základní

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}.$$

Ke konstrukci jest tato poslední forma velmi pohodlná. Neboť f jest konstantou čočky jednou pro vždy určitou. Vedeme-li tedy horizontální přímku a naneseme-li kolmo na ni délku $FF' = f$, můžeme pravoúhelným pravítkem ku každému $(a-f)$ rychle nalézti $(b-f)$ (obr. 79).




obr. 79.

Vidíme z toho, že jest jednoduší měřiti vzdálenosti konjungovaných bodů A a B od ohniska nežli od čočky.

Provádí-li se konstrukce, nahoře uvedená pro čočky rozptylné (obr. 80), dlužno míti na mysli, že ohnisko mají polohu obrácenou.

Při formulaci mění f znamení. Z rovnice $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$

obr. 80.



následuje – jako u zrcadel že pro positivné a jest b vždy negativní.

Rovnice pro $\frac{BB'}{AA'}$ pak dávají:

$$-\frac{BB'}{AA'} = \frac{f-b}{f} = \frac{f}{a+f},$$

jak z obr. 80. vysvítá. Obrazy jsou zde vždy jiné (jsoto — při $\frac{BB'}{AA'}$) a zmenšené ($a+f>f$) a virtuálné (b negativní).

Čočky libovolně silné.

§ 53. Roviny hlavní.

Výsledky počtu jakož i pravidla konstrukce odvozené v úvahách předcházejících platí, jakož jsme několikráte důrazně připomenuli, jenom pro čočky, které – přímo vzato – jsou nekonečně tenké, tedy – pomocných takových vůbec ve skutečnosti není – které jsou alespoň velmi tenké v tom smyslu, aby jich tloušťka mizela proti jich délce ohniskové. Proto lze onech výsledků aneb onech pravidel spíše užíti u čoček opticky velmi slabých – t. j. velké délky ohniskové. Čím jsou opticky slabší, tím spíše lze říci, že proti jich velké délce ohniskové jich tloušťka mizí. Naproti tomu nelze jich užíti u čoček silných – t. j. velmi malé délky ohniskové – aneb u čoček kombinovaných atd.

K tomu však, co zde řečeno, naskytá se ihned samu sebou otázka: co tedy činiti u čoček, jichž tloušťka nemizí proti délce ohniskové, — jakými formulemi a jakými konstruktivními pravidly dlužno se zde říditi?

Odpověď je jednodušší nežli bychom očekávali. Řekl jsem: také zde je možno těchž formulí a těchž pravidel konstruktivních upotřebiti – takže jak rozdíl mezi čočkami velmi slabými a silnými zcela mizí – ale jen s tou výminkou, že vzdálenosti předmětu a obrazu

nepočítáme od čočky t. j. od její sférických ploch, nýbrž od jistých dvou rovin, které tyto sférické plochy jakoby zastupují. Tyto se nazývají rovinami hlavními.

Mějme tedy jistou čočku, která „není nekonečně tenkou", a nebo mějme kombinace čoček; zjednáme sobě jisté dvě roviny a pak domyslíme si čočku skutečnou pryč a počínáme sobě tak, jakoby na místě mé byly zde ony hlavní roviny, tedy jakoby se lom dál teprve mezi těmito dvěma rovinami.

Vyložíme předevčím, jak k těmto rovinám hlavním přicházíme a jaké mají charakteristické vlastnosti optické. Vyložíme to na základě analogie se zrcadly.

Mějmeť sférické zrcadlo; přiblížujeme-li k němu nějaký svítící předmět z nekonečné dálky, přijdeme konečně do určité roviny, ve které se setkáme s obrazem předmětu, že to rovina na ose hlavní kolmá ve dvojnásobné dálce ohniskové od zrcadla; obraz (reálný) je zde souměrný (symmetrický) s předmětem. Když však ještě více se bližíme s předmětem k zrcadlu, přijdeme podruhé do jisté roviny, kde se opět setkáme s obrazem předmětu; tentokráte jest však obraz (virtuálný) s předmětem shodný (kongruentní); obraz a předmět se kryjí úplně. Tato druhá rovina charakteristická je rovina spůsobující se zrcadlem samým v té části, která jest ose bezprostředně blízkou.

Máme zde tedy dvojí postavení předmětu, při kterém jest obraz tak veliký jako předmět; při prvém je však obraz symmetrický, při druhém kongruentní.

Něco zcela podobného platí o čočce jakkolivěk silné jakož i o jakékoliv kombinaci čoček. Bližíme-li se čočce z velké dálky se svítícím předmětem, zvětšuje se jeho obraz, až se stane tak velikým jako předmět zůstávaje při tom obrácený; je tedy s předmětem souměrný (symmetrický). Roviny, ve kterých se právě předmět a obraz nalézají, zovou se hlavními a sice negativními.

Když však se bližíme čočce ještě více, přijdeme přejdouce ohniskem po druhé s předmětem do jistého postavení, ve kterém obraz předmětu – tentokráte virtuálný –

jest s předmětem stejně veliký a při tom přímý, tudíž kongruentní. Roviny, v nichž se mysl předmět a obraz nalézají, zovou se též hlavními, a sice positivními.

Máme tedy dva páry rovin hlavních:

dvě hlavní roviny negativní,

a dvě " " positivní.


Stručné zkrátka:

Jedna hlavní rovina negativní je symmetrickým obrazem druhé.

Jedna hlavní rovina positivní je kongruentním obrazem druhé.

Rozestavení těchto rovin je souměrné vzhledem k ohnisku na obou stranách čočky, jak obr. 81. vyjasňuje.

obr. 81.



Jsou totiž od ohniska po obou stranách vzdáleny o délku f.

Dálka ohnisková počítá se tedy, nikoliv od ploch čočkových, nýbrž od hlavních rovin positivních.

U čočky nekonečně tenké splývají hlavní roviny positivní vespolek v jedinou (dříve $L L'$ označenou).

Mluví-li se o rovinách hlavních vůbec, bez bližšího udání, zda-li + nebo −, míníme vždy positivní. Tyto hlavní roviny čoček zavedl Gauss a určil zároveň vzorce, jimiž se poloha těchto rovin stanoví, poloha tato závisí na rozměrech čočky, t. j. na poloměrech zakřivení r_1 a r_2 a její tloušťce e, a pak na exponentu lomu n.

Z udaných veličin počítá se především dálka ohnisková f (přesně) dle formule:

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} - \frac{n-1}{n}\cdot\frac{e}{r_1 r_2}\right)$$

anebo:

$$f = \frac{\frac{n}{n-1}\, r_1 r_2}{r_1 + r_2 - \frac{n-1}{n} e}.$$

Znamení veličin zde přicházejících vztahují se na typus čoček, totiž čočku dvojvypuklou (obr. 82).


Postavení hlavních rovin vyplývá pak z následujících jich vzdáleností od bodů S_1 a S_2,

„vrcholů" sférických ploch: $S_1 H_1 = + \frac{n-1}{n}\cdot\frac{e}{r_2}\cdot f$

$$S_2 H_2 = - \frac{n-1}{n}\cdot\frac{e}{r_1}\cdot f.$$

Také v těchto rovnicích vztahuje se znamení veličin zde přicházejících na typus čoček, totiž čočku dvojvypuklou (obr. 82.)

obr. 82.



Orientujeme se především, jak stojí osa hlavní roviny u čočky, jaké nejobyčejnější přicházívá, totiž u čočky dvojvypuklé s na obou stranách stejně zakřivené ($r_1 = r_2$) a konnové ($n = \frac{3}{2}$).


Zde je především $f = r$,

tudíž $S_1 H_1 = \frac{\frac{3}{2}-1}{\frac{3}{2}}\cdot e = S_2 H_2$,

t. j. $= \frac{1}{3} e$.

Z orientování se jest tento výsledek dostačující. Když tedy rozdělíme tloušťku čočky na tři díly, tedy stojí hlavní roviny (velmi přibližně) v těchto dělících bodech (obr. 83.).

Jinak dlužno ve speciálních případech vždy zvláště postavení hlavních rovin stanoviti počtem.



obr. 83.

§54. Počtený příklad.

Jest velmi důležito speciálním příkladem se poučiti, jak se utváří postavení jak rovin hlavních tak i ohnisek při týchž poměrech r_1 a r_2 zakřivení čočky a při též exponentu lomu n, ale při různých tloušťkách čoček.

Předpřičtěme následující příklad.

Volme $r_1 = 3$ cm, $r_2 = 5$ cm

a přijmeme za exponent lomu skrouhlou hodnotu platící asi pro sklo objektivové

$$n = \frac{3}{2}, \text{ takže jest } n-1 = \frac{1}{2},$$
$$\frac{n-1}{n} = \frac{1}{3}.$$

Poloměr čočky volme $r = 1\,cm$.

Dálku ohniskovou počítejme dle formule buď pro $\frac{1}{f}$ nebo pro f.

A.) Čočky spojné; f jest positivní

1.) Čočka bikonvexní: $r_1 = 3, r_2 = 5, e = 1$ (obr. 84).

$$f = \frac{2 \cdot 3 \cdot 5}{3+5-\frac{1}{3}} = 3,91$$

$$\left.\begin{aligned} S_1 H_1 &= +\tfrac{1}{3} \cdot \tfrac{1}{5} \cdot 3,91 = 0,26 \\ S_2 H_2 &= -\tfrac{1}{3} \cdot \tfrac{1}{3} \cdot 3,91 = -0,48 \end{aligned}\right\} H_1 H_2 = 1,00 - 0,26 - 0,48 = 0,26$$

2.) Čočka plankonvexní: $r_1 = 3, r_2 = \infty, e = 1$ (obr. 85).

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{\infty} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\infty}\right) = \frac{1}{6}$$
$$f = 6\,cm$$

$$\left.\begin{aligned} S_1 H_1 &= +\tfrac{1}{3} \cdot \tfrac{1}{\infty} \cdot 6 = 0 \\ S_2 H_2 &= -\tfrac{1}{3} \cdot \tfrac{1}{3} \cdot 6 = -0,67 \end{aligned}\right\} H_1 H_2 = 1,00 - 0,67 = 0,23$$

Rovina H_1 je tedy tečnou rovinou přední plochy skleněné.

3.) Čočka konkavkonvexní: $r_1 = 3, r_2 = -5, e = 1$ (obr. 86).

$$f = \frac{2 \cdot 3 \cdot -5}{3+(-5)-\frac{1}{3}} = 12,86$$

$$\left.\begin{aligned} S_1 H_1 &= +\tfrac{1}{3} \cdot \tfrac{1}{-5} \cdot 12,86 = -0,86 \\ S_2 H_2 &= -\tfrac{1}{3} \cdot \tfrac{1}{3} \cdot 12,86 = -1,43 \end{aligned}\right\} H_1 H_2 = 1,00 + 0,86 - 1,43 = 0,43.$$


B.) Čočky rozptylné; f je negativní. To znamená, že je dlužno délku tuto opačně naměřiti než při čočkách A, tedy od roviny H_1 nikoliv na tutéž - levou - stranu, na kteréž jest, nýbrž na stranu pravou a podobně od roviny H_2, která je na pravo, také na opačnou stranu, totiž levou. K hlavní rovině H_1 na levo náleží tudíž F_1 na pravo, a podobně ku H_2 na pravo náleží F_2 na levo.

1.) Čočka likonkávní: $r_1 = -3, r_2 = -5, e = 1$ (obr. 87).


$$f = \frac{2 \cdot (-3) \cdot (-5)}{(-3)+(-5)-\frac{1}{3}} = -3,60$$

$$S_1 H_1 = +\tfrac{1}{3} \cdot \tfrac{1}{(-5)} \cdot (-3,60) = +0,24$$


Ob. 84.



Ob. 85.



Ob. 86.



$$S_2 H_2 = -\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{(-3)}\cdot(-3,60) = -0,40$$

$$H_1 H_2 = 1,00 - 0,24 - 0,40 = 0,36.$$

2.) *Čočka plankonkávní*: $r_1 = -3$, $r_2 = \infty$, $e = 1$ (obr. 88).

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{(-3)} + \frac{1}{\infty} - \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{\infty}\right) = -\frac{1}{6}$$

$$f = 6$$

$$\left.\begin{aligned} S_1 H_1 &= +\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{\infty}\cdot(-6) = 0 \\ S_2 H_2 &= -\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{(-3)}\cdot(-6) = -0,67 \end{aligned}\right\} H_1 H_2 = 1,00 - 0,67 = 0,33.$$

3.) *Čočka konvexkonkávní*: $r_1 = -3$, $r_2 = +5$, $e = 1$ (obr. 89).


$$f = \frac{2\cdot(-3)\cdot 5}{(-3) + 5 - \frac{1}{3}} = -18$$

$$\left.\begin{aligned} S_1 H_1 &= +\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{5}\cdot(-18) = -1,20 \\ S_2 H_2 &= -\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{-3}\cdot(-18) = -2,00 \end{aligned}\right\} H_1 H_2 = 1,00 + 1,20 - 2,00 = 0,20.$$


Příklady tyto jsou v mnohém ohledu instruktivní. Z nich vyvítá, že hlavní roviny leží u čoček bikonvexních anebo bikonkávních obě uvnitř čočky; zmenšuje-li se zakřivení jedné z obou sférických ploch, až úplně zmizí – t. j. až se plocha ta stane rovinou, postupují obě hlavní roviny ke druhé ploše sférické, až konečně jedna z nich se stane tečnou rovinou této plochy; tak je tomu u čoček plankonvexních. Když se pak zakřivení změní v opáčné, když tedy je čočka konkávkonvexní anebo konvexkonkávní, vystoupí jedna rovina hlavní a pak i obě z čočky ven; případ tento je ze všech nejzajímavější.

Současně se příklady těmito objasní otázka, která se často klade, totiž otázka, zda-li je dálka ohnisková na obou stranách čočky stejná? Odpověď zní: ano, když se dálka ta počítá tak, jak se počítati má, totiž od příslušné hlavní roviny; naproti tomu musí zníti odpověď: nikoliv, když se dálka ta počítá – jak to obyčejně bývá – od příslušné sférické plochy, čili jak zkrátka dána, od čočky samé. Rozdíl vyniká méně u čoček bikonvexních neb bikonkávních, více již u čoček plankonvexních neb plankonkávních, nejvíce však u čoček konkávkonvexních a konvexkonkávních.


ob. 87.



ob. 88.




ob. 89.



55. Jak se provádí konstrukce pomocí rovin hlavních a ohnisek.

Mějmež (obr. 90.) čočku spojnou. Na místo ní položme její hlavní roviny H_1 a H_2, můžeme pak čočku celou odmysliti zcela pryč — roviny hlavní zastupují ji úplně. A A' budiž průvodič předmětu na ose kolmý. Hledejme k bodu A' jeho obraz.

obr. 90.



K tomu cíli vedeme z bodu A' papisky dva: jeden $A'M_1$ rovnoběžný s osou, druhý $A'N_2$ ohniskem.

Paprsek první s osou rovnoběžný vedeme až k prvé hlavní rovině k bodu M_1; tento má svůj obraz v M_2 (takže je $H_1M_1 = H_2M_2$), a poněvadž paprsky osou rovnoběžné procházejí ohniskem F_2, tedy jest M_2F_2 paprsek lomený. Paprsek druhý vedeme ohniskem F_1 také až k prvé hlavní rovině do bodu N_1; tento má svůj obraz v N_2 (takže je $H_1N_1 = H_2N_2$) a poněvadž paprsky ohniskem procházející stávají se lomem s osou rovnoběžnými, jest N_2B' paprsek lomený. Oba paprsky lomené protínají se v bodě B' a to jest obraz bodu A', kolmice BB' na osu jest obrazem předmětu AA'.

Zatím jest — jako u čočky nekonečně tenké — dle podobnosti trojúhelníků F_2BB' a $F_2H_2M_2$ jakož i $F_1H_1N_1$ a F_1AA':

$$\frac{BB'}{AA'} = \frac{b-f}{f} = \frac{f}{a-f}.$$

Z toho odvodíme dále: $$= \frac{b-f-+f}{f+a-f} = \frac{b}{a}.$$

Rovněž vychází: $$(a-f)(b-f) = f^2;$$


a z toho zase: $$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f};$$

neboť obě tyto rovnice vyjadřují totéž.

Zkrátka, vidíme, že veškeré vztahy, jež jsme měli pro čočku nekonečně tenkou, platí rovněž tak pro čočku jakkoliv silnou, když vzdálenosti a a b počítáme nikoliv od ploch čočky, nýbrž od hlavních rovin.

Tak se konstrukce modifikuje, když jest nám jednati o čočku rozptylnou, ukazuje obr. 91. — Dlužno zde zejména míti zřetel na správnou polohu ohnisek F_1 a F_2; tato jsou při tom jen virtuální, paprsky neprocházejí jimi v skutku, nýbrž jen v prodloužení geometrickém. Proto zde vedeme paprsky nikoliv ohniskem, nýbrž tak, aby mířily k ohnisku, aby jsouce prodloužený (jak v obrazci tečkovaně naznačeno) jím procházely.

obr. 91.



§56. O bodech uzlových.

Ze vztahu dokázaného v § předcházejícím

$$\frac{AA'}{BB'} = \frac{a}{b}$$

čili $H_1M_1 : M_1A' = H_2N_2 : N_2B'$

vyplývá podobnost obou pravoúhlých trojúhelníků H_1M_1A' a H_2M_2B' ze které pak vyplývá rovnoběžnost přímek $A'H_1 \parallel H_2B'$ (obr. 90).

Mají tedy H_1 a H_2 tu zvláštnost, že světelný paprsek mířící k bodu H_1, pokračuje od bodu druhého H_2 ve svém směru dále.

Takovéto dva body zovou se vůbec body uzlové.

V našem případě padnou body uzlové do rovin hlavních, avšak v problémech všeobecnějších, než je problém náš, není tomu tak; kdyby totiž prostředí za čočkou nebylo totéž jako prostředí před čočkou, kdyby tedy pod čočkou byl na př. vzduch,

s čočkou pak voda aneb jakákoliv kapalina, vůbec jiné ústředí, pak by body uzlové byly rozdílnými od bodů hlavních.

Patrně jest jeden bod uzlový obrazem druhého; neboť paprsky v jednom se přiblížení pokračují od druhého dále – jeden i druhý bod jest tudíž středem papisků homocentrických.

Zavedením uzlových bodů zjednodušší se konstrukce, neboť můžeme vésti jeden paprsek k prvnímu z nich a víme, že od druhého pokračuje paprsek ve svém směru dále (obr. 90.) K němu pak vedeme ještě jeden paprsek s osou rovnoběžný anebo také okrskem procházející.


Je-li čočka nekonečně tenká, splývají oba body uzlové v t. zv. optický střed. Přímky uzlovými body v téže směru vedené jsou jakési dohromady vzaté analogou vedlejší osy čočky nekonečně tenké aneb vedlejší osy sférického zrcadla.

[*§57. Vztahy mathematické.*]

Jest nám ještě odvoditi výrazy mathematické, jichž jsme užili při výkladech o hlavních rovinách.

Budiž (obr. 92.) dána spojná čočka tloušťky $S_1S_2 = e$; omezující konvexní plochy sférické kreslíme jako roviny přiblížející se k případu limitnímu, kdy zůstáváme v bezprostřední blízkosti hlavní osy.

Papisek rovnoběžně s osou dopadající láme se na první ploše sférické tak, že míří do okrsku Φ; na druhé ploše sférické stýkají se lomy tak, že papisek míří do definitivního okrsku F.



ob. 92.

Poloha roviny hlavní, kterouž označujeme jakožto II, poněvadž náleží k útvarům obrazovým, jest dána průsečkem papisku dopadajícího a vycházejícího čili odlehlostí

$$S_2H_2 = h_2.$$

Pro lom na první ploše sférické máme:

$$\frac{1}{\infty} + \frac{n}{\varphi} = \frac{n-1}{r_1}\,; \quad \text{tudíž } \varphi = \frac{n}{n-1}\cdot r_1$$

Pro lom na druhé ploše sférické máme:

$$\frac{1}{-S_2\Phi} + \frac{\frac{1}{n}}{S_2F} = \frac{\frac{1}{n}-1}{-r_2} \text{ čili (z n)} \quad -\frac{n}{\varphi - e} + \frac{1}{f - h_2} = \frac{n-1}{r_2}.$$

Z podobnosti trojúhelníků (obr. 92.) vychází však:

$$\frac{f}{f-h_2} = \frac{\varphi}{\varphi - e}$$

Dosadíce obdržíme: $-\frac{n}{\varphi - e} + \frac{1}{f}\cdot\frac{\varphi}{\varphi - e} = \frac{n-1}{r_2}$,

z čehož $$\frac{1}{f} = \frac{n-1}{r_2}\cdot\frac{\varphi - e}{\varphi} + \frac{n}{\varphi},$$

$$= \frac{(n-1)(\varphi - e) + (n-1)e}{\frac{n}{n-1}\cdot r_1 r_2},$$

čili definitivně: $$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_2} - \frac{n-1}{n}\cdot\frac{e}{r_1 r_2}\right).$$

Tento výraz pro délku ohniskovou jest souměrný vzhledem k poloměrům r_1 a r_2, platí tudíž také pro opačnou stranu čočky, t. j. pro délku ohniskovou počítanou od roviny hlavní I.

Odlehlost h_2 roviny II od okrsku S_2 dána je výrazem plynoucím z podobnosti trojúhelníků $\frac{h_2}{f} = \frac{e}{\varphi}$,

tudíž dosazením hodnoty pro φ a připojením znamení – (poněvadž distance S_2H_2 jde zpětným směrem)

$$h_2 = -\frac{n-1}{n}\cdot\frac{e}{r_2}\cdot f.$$


Pro hlavní rovinu I (obr. 93.) netřeba počet opakovati; dosadíce $-r_2$ za r_1 obdržíme ihned $$h_1 = \frac{n-1}{n}\cdot\frac{e}{r_2}\cdot f.$$

Zajímavo je počítati též distanci H_1H_2 obou hlavních rovin.

Patrně je: $H_1H_2 = e - (h_1 + h_2)$

$$= e - \frac{n-1}{n}\,e\,f\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right).$$

obr. 93.



Vzhledem k tomu, že jest velice přibližně

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right),$$

vychází: $H_1 H_2 = c - \frac{c}{n} = \frac{n-1}{n} \cdot c$

t. j. nezávisle na r_1 a r_2. Mění-li se, tudíž při čočce tloušťky c — na ze počítané — zakřivení jakkoliv, přesunují se jedna i druhá rovina, ale při tom přesunují se obě jako celkový útvar, t. j. tak, že jich vzdálenost si — tloušťě — nemění.

Přesně vzato věta uvedená ovšem neplatí. Počítá-li se přesně výrazy pro H_1, H_2, tím že se za f dosadí přesný výraz, vyjde po krátké úpravě


$$H_1 H_2 = \frac{n-1}{n} \cdot c \cdot \frac{1 - \frac{c}{r_1 + r_2}}{1 - \frac{n-1}{n} \cdot \frac{c}{r_1 + r_2}}$$

Číselnou illustraci k tomu, co zde řečeno, podává hořejší číselný příklad. Vliv korrekčního členu vynikne zvláště, když výraz $r_1 + r_2$ přejde v diferenci (při opačném znamení obou poloměrů), tedy u čoček konkáv-konvexních nebo konvex-konkávních, jakož také z příkladu dobře vynikl. *)

[*§ 58. Optický střed. *]

[*V obraze 94. jsou nakresleny obě konvexní plochy sférické čočky a roviny hlavní. Papírek X míjející k bodu hlavnímu H_1 postupuje od druhého hlavního bodu H_2 směrem rovnoběžným Y.

obr. 94.



Spojme-li body L_1 a L_2, mezi nimiž papírky X a Y protínají sférické plochy čočky (lens), protíná přímka $L_1 L_2$ osu hlavní v bodě O, jehož

poloha je stálou pro všechny papírky X neb Y.

Jest totiž, znamená-li $S_1 O = x$, $O S_2 = y$,

$$\frac{x}{y} = \frac{h_1}{h_2},$$

tudíž vzhledem k výrazům pro h_1 a h_2 předešlého §

$$= \frac{r_1}{r_2},$$

t. j. poměr $\frac{x}{y}$ jest konstantou.

Z toho se pak míří dále: $(x + y = c)$

$$\frac{x}{c} = \frac{r_1}{r_1 + r_2}, \quad \frac{y}{c} = \frac{r_2}{r_1 + r_2}$$

Je-li čočka bikonkávní, změní se znamení obou poloměrů r_1 a r_2 — výrazy tudíž zůstanou úplně v platnosti.

Je-li čočka plankonvexní neb plankonkávní, je na př. $r_2 = \infty$, z čehož plyne pak $x = 0$, $y = c$.

Je-li čočka konkávkonvexní neb konvexkonkávní, padne střed optický čočky mimo čočku.

Optický střed je bodem zajímavým, ale významu jeho pro upotřebení na př. konstrukce, je nepatrný. Mohl by snad zastupovati jedna z obou hlavních rovin, čině však by vznikla nesymetrie konstrukce — poněvadž obě roviny hlavní tvoří jako celek k sobě náležející.

Spíše má význam u čočky nekonečně tenké, kdy roviny hlavní splývají; tam se konstrukce i popis její zjednodušuje, když se s tímto pojmem pracuje, jakož nahoře bylo uvedeno. *]

Soustava lámavých ploch sférických v počtu libovolném.


§ 59. Roviny hlavní při problému všeobecném.

Můžeme nyní přejíti již k problému všeobecnému. Budiž dána celá soustava lámavých ploch sférických oddělujících různá ústředí od sebe, při čemž jen to

předpokládáme, že plochy ty jsou centrovány, t.j. že jich středy geometrické náležejí se na společné přímce. Tato tvoří pak hlavní osu celé soustavy. Paprsek směrem osy této celý systém postupující se nelámne.

Vedme (obr. 95.) paprsek 1.) rovnoběžný s osou, tedy jakoby od světlého bodu nekonečně vzdáleného; tento paprsek se bude rozmanitým způsobem na různých sférických těch plochách lámati, ale konečně vyjde do posledního ústředí (které ovšem zde, v případě obecném identické s prvním) v jistém směru 1', v němž protíná osu v bodě F_2. — Když i zde zůstáváme ze zcela blízka, budou paprsky homocentrické i po všech lomech zůstávati homocentrickými.

obr. 95.



Bod F_2 je průsekem paprsku 1) a paprsku směrem osy postupujícího — a tudíž pak dle zásady homocentrických soustav průsekem všech podobných paprsků jako 1) jež s osou rovnoběžně dopadají. Zkrátka:

Bod F_2 náleží k soustavě obrazů a je sdružen s bodem $A\infty$, jest tedy ohniskem v soustavě obrazů (proto index 2.)

Učiňme nyní úvahu podobnou příslušející ke straně paprsků. Prodlužme paprsek 1) v myšlenkách směrem 2' až do posledního ústředí a tažme si, jaký by musil býti paprsek dopadající v prvém ústředí, aby jemu v posledním ústředí odpovídal právě tento prodloužený paprsek 2'.

Budiž tímto paprskem 2.). Tento protíná osu v bodě F_1.

Podobnou úvahou shledáme jako dříve, že bod F_1 jakožto předmětový (proto index 1) je sdružen s nekonečně vzdáleným bodem $B\infty$ na straně obrazové.

Máme tedy přehledně:

$A\infty$ sdružený F_2
F_1 „ $B\infty$.

a dále: bod M_1 jakožto průsek papsků 1.) 2.) je sdružený s bodem M_2 jakožto průsekem paprsků 1') a 2') s nimi též sdružených, t.j.

M_1 sdružený M_2.

Položíme-li body M_1 a M_2 roviny I a II kolmé na osu, obdržíme roviny hlavní celé soustavy.


Každý bod M_1 roviny I můžeme pokládati za svítící — jeho obraz stanovíme, když jej považujeme za průsek paprsků $F_1 M_1$ a ∞M_1, i k těmto patří sdružené $M_2\infty$ a $M_2 F_2$, a k těm náleží zase průsek M_2 jakožto obraz bodu M_1.

Celé rovině $H_2 M_2$ jest kongruentním obrazem prvé $H_1 M_1$ a naopak. Vzdálenosti ohnisek $H_1 F_1 = f_1$ a $H_2 F_2 = f_2$ nejsou zde stejné.

§ 60. Konstrukce obrazu pomocí rovin hlavních a ohnisek.

Jakmile pro případ nejvšeobecnější jsou stanoveny roviny hlavní a ohniska, lze pro daný svítící předmět $A K$ (obr. 96) jednoduše sestrojiti jeho obraz $B B'$ a to pomocí paprsků jednak s osou rovnoběžného, jednak ohniskem procházejícího ve způsobu zcela podobném jako §55.

obr. 96.



Platí zde též vztahy:

$$\frac{B B'}{A A'} = \frac{b - f_2}{f_2} = \frac{f_1}{a - f_1}$$

analogické příslušným v §55 jenom že zde délky ohniskové f_1 a f_2 nejsou identické.

§61. Body uzlové.

Vztahy pro $\frac{BB'}{AA'}$ posledního § vedou jednoduše k bodům důležitým, jež uzlovými zovem. Můžeme totiž dle známé věty o úměrách též psáti:

$$\frac{BB'}{AA'} = \frac{b - f_2 + f_1}{f_2 + a - f_1},$$

neboť píšeme-li

$$f_2 - f_1 = \varphi$$

$$\frac{BB'}{AA'} = \frac{b-\varphi}{a+\varphi}$$

Délky $b-\varphi$ a $a+\varphi$ snadno sestrojíme nanesouce (obr. 96.):

$$H_1 K_1 = \varphi, \quad H_2 K_2 = \varphi,$$

pak jest

$$K_1 A = a + \varphi$$
$$K_2 B = b - \varphi.$$

Vedeme-li nyní přímky $A'K_1$ a $B'K_2$, sousíce z úměry

$$\frac{BB'}{AA'} = \frac{K_1 A}{K_2 B},$$

že jsou trojúhelníky $AA'K_1$ a $BB'K_2$ podobny a tudíž

$$A'K_1 \parallel K_2 B'.$$

Body K_1 a K_2 mají tudíž tu zvláštnost, že paprsek $A'K_1$ míjející k jednomu z nich postupuje směrem $K_2 B'$ od druhého rovnoběžně.

Takové body zovou se uzlovými.

Jich vzdálenost $K_1 K_2$ je patrně $= H_1 H_2$.

Kdyby bylo $\varphi = 0$, t. j. $f_2 = f_1$, padly by uzlové body do bodů hlavních a případ všeobecný by se specialisoval dle §56.

§62. Analogie s lámavými plochami sférickými.

Vztahy $\frac{BB'}{AA'} = \frac{b-f_2}{f_2} = \frac{f_1}{a-f_1} = \frac{b-\varphi}{a+\varphi}$

jsou zcela týmiž, jaké jsme měli u lámavých ploch sférických.

b o zde jest φ, bylo tam r.

Ale jinak platí i zde: $f_2 - f_1 = \varphi$ jako tam.

K nejvšeobecnější případ lomu světla plochami sférickými jest tudíž formálně zcela podobný případu lomu světla jedinou plochou sférickou s tím jediným rozdílem, že zde tato plocha sférická vystupuje jakoby dvojitě — v obou rovinách hlavních; proto také na místě středu C jediného, jak bylo tam, jsou zde středy dva, t. j. uzlové body; paprsek jimi vedený jde původním směrem tak, jako tam paprsek vedený středem sférické plochy. Ale vším zde jest paprsek jakoby dvojitý.

Novější geometrie formuluje tento rozdíl následovně.

Každý obraz při lomu plochami sférickými jest ve vztahu prostorové kollinearnosti s předmětem. K jednoduché ploše sférické přistupuje k tomu ještě polohu perspektivní se středem perspektivnosti odpadá v případu všeobecném.

Ale jinak zůstávají všechny početní vztahy v platnosti; neboť jest to tak, jakoby — beze změny velikosti a vzdálenosti — celý systém obrazový byl rovnoběžným posunutím o $H_1 H_2 = K_1 K_2$ oddálen od systému předmětového.

Příkladem velmi instruktivním k tomu, co zde řečeno, podává dioptrický problém oka. Při vší rozmanitosti lámavých ploch a jistředí lze celý dioptrický problém schematisovati podobně, jak zde uvedeno, a s velkou approximací pak redukovati dokonce na lom jakoby jedinou plochou sférickou. (Oko redukované Listing.)

§63. Stanovení dálky ohniskové čoček spojných.

U čoček spojných, kde vznikají obrazy reálné, jež snadno na stínítku zachytiti a jich velikost měřiti, máme četné jednoduché methody, jimiž lze dálku ohniskovou f (na př. v metrech) a tím optickou mohutnost čočky $\frac{1}{f}$ (v dioptriích) stanoviti.

1., Jde-li o rychlou orientaci, postavíme čočku kolmo proti paprskům slunečním

a hledáme ohnisko t.j. obrázek slunce. Také nějakýž velmi vzdálený předmět svítící může býti zvolen, poněvadž jeho obrázek padne velmi blízko ohniska.

2.) Přesně – dle téže nerovnice – stanoví se dálka ohnisková dalekohledem. Tento se zaměří na nekonečně (t.j. dostatečně daleko) vzdálený předmět (může nebo vhodný předmět terestrický). Pak se dá ona čočka před objektiv dalekohledu resp. souhlasně a hledá se na ose dalekohledu postavení nějakého drobného předmětu (transparentní výkres, písmo atd.) takové, aby dalekohledem byl viděn. Tím jest pak dána poloha ohniska (ohniskové roviny.)

3.) Jednoduše stanovíme f dle rovnice

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}.$$

4.) Ve speciálním případě $a = b$ jest pak

$$a = 2f = b.$$

5.) Dále jsou k disposici rovnice

$$\frac{BB'}{AA'} = \frac{b-f}{f} = \frac{f}{a-f}$$

Přesně-li krátce: $AA' = P$, $BB' = Q$, je patrně dle známé věty o úměrách:

$$\frac{P+Q}{P} = \frac{b}{f} \text{ nebo } \frac{Q}{P+Q} = \frac{f}{a};$$

z toho tedy: $f = b \cdot \frac{P}{P+Q}$ nebo $f = a \cdot \frac{Q}{P+Q}$

Jest výhodno volit z veličin a a b vždy tu, která jest větší, t.j. je-li obraz zmenšený ($Q < P$), pak a, poněvadž je $a > b$, je-li obraz zvětšený ($Q > P$), pak b, poněvadž je $b > a$.

Při značném zmenšení obrazu zachycuje se na mikrometrické škále a odčítá se jeho rozměr na této škále.

6.) Mají-li předmět P a stínítko pro obraz Q postavení pevné, lze nalézti dvě polohy čočky, kdy vznikne obraz ostrý, což odpovídá výměně veličin a a b v rovnici čočkové. Je-li na př. $a > b$, vznikne obraz zmenšený; když se pak čočka posune směrem

k předmětu o tolik, aby dřívější a se stalo b a naopak, tedy patrně $d = a - b$, pak vznikne v téže poloze obraz zvětšený.

Počítá se dle

$$f = \frac{ab}{a+b};$$

$a + b = s$ vzdálenost stínítka od předmětu,
$a - b = d$ posunutí čočky;
z toho

$$f = \frac{1}{4s}(s+d)(s-d);$$

tato formule je pro logaritmické počítání pohodlnější, anebo

$$4f = s - \frac{d^2}{s}.$$

Formule mnohem přesně platí pro čočky velmi tenké. Jde-li o čočky silnější, možno – když čočka na obou stranách zakřivení stejné – korrigovati a a b o $\frac{1}{3}e$; což pro čočky ze skla korunového postačí. Methody 5., když je a velmi velké – anebo b velmi velké, dávají i bez korrekce dosti dobré výsledky právě proto, že tato korrekce má procentuálně pak malý vliv.

§64. Stanovení délky ohniskové u čoček rozptylných.

Poněvadž zde jsou obrazy virtuální, nelze ani jich postavení ani jejich velikost určiti. Dálka ohnisková stanoví se pak nepřímo.

1.) Čočka rozptylná dálky ohniskové f se kombinuje s čočkou spojnou silnější, jež má dálku ohniskovou f^* (tak že je $f^* < f$.) Celek má pak dálku ohniskovou F, jež plyne z rovnice:

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{f^*} - \frac{1}{f},$$


což znamená, že se kombinováním optické mohutnosti obou čoček algebraicky sečtají.

Stanoví se tedy F a f^*, a z toho se počítá f.

2.) Jednodušší jest též methoda následující, založená na rozptýlení paprsků světelných.

Do sítě optické vpustí se otvorem poloměru r svazek paprsků slunečních vodorovně; když se pak postaví k nim kolmo čočka rozptylná, promění se tím paprsky slunční rovnoběžné v rozbíhavé, tak že se ve vzdálenosti d od čočky promítají na kruh větší poloměru R (obr. 97).

Patrně jest:



ob. 97.


$$\frac{r}{R} = \frac{f}{f+l}, \text{ tudíž } \frac{f}{l} = \frac{r}{R-r}.$$

Nejvhodnější je voliti $R = 2r$,
pak jest $f = l$.

Přirozená divergence paprsků slunečních (1/2°) se smí zanedbati.

Úmysl lze týž pokus provésti pomocí čočky spojné ve způsobu, jak obr. 98. naznačuje. Čočka spojná postaví se do dálky ohniskové od světlého kruhového otvoru počítajíc i diaphragmem se zúží kužel paprskový na otvor $2r$ u čočky.

ob. 98.



IV. Rozklad světla.


(Chromatika.)

§ 65. Základní pojmy.

Při výkladu o lomu světla bylo již na to poukázáno, že relativní exponent lomu n určitých dvou prostředí I a II, na př. vzduchu a skla, je podmíněn ještě touto vlastností světla, kterou říkáme se stanoviska fysiologického barva, a jejížto fysikálním základem jest délka λ vlny. Exponent lomu n je tím větší, čím je délka vlny menší. V této větě spočívá základ úkazu, který zoveme rozkladem světla (disperse).

Světlo složené, t. j. takové, jež obsahuje rozmanité délky vlny λ, rozkládá se lomem; neboť paprsky rozmanité délky vlny, které v takovém světle složeném jsou obsaženy, když stejně, t. j. pod týmž úhlem α, (obr. 90.) na rozhraní prostředí I a II dopadají, lámou se různě, t. j. pod různým úhlem β, a tudíž se po lomu rozcházejí — každý paprsek své určité délky vlny λ jde svým určitým směrem.

ob. 99.




Vzhledem k významu exponentu lomu soudíme, že rychlost, s jakou se v prostředích lomotných světlo šíří, je podmíněna délkou vlny světelné.

Tím se liší éther v prostředích lomotných od éthery ve vakuum, kde této závislosti není.

Aby se rozklad paprsků, — kterýž se pro rozklad lomem stalý již jednoduchými ještě stupňoval, připojuje se ještě 1) lámavé rovině ještě druhá 2) k ní úhlem postavená. Tím vzniká hranol, (obr 100,) který se pak ještě z třetí strany také rovinou ohraničí.

ob. 100.



Hrana, v níž se stýkají roviny 1) a 2), zove se lámavou; rovinný řez hranolu k této hraně (rovina nákresná) zove se jeho hlavní řez; úhel φ obou rovin 1) a 2) nazývá se úhlem lámavým hranolu.

Materiálem hranolu je z pravidla sklo různých druhů, ale také kamenná sůl a křišťál, při čemž velmi takových hranolů je zvláštní (pozorování paprsků infračervených

nebo ultrafialových.) Také kapalinny, zejména sirouhlík (CS_2) může býti materiálem hranolů, jež pak vyžadují ohraničení skleněnými planparallelními deskami (hranoly duté.) –

Hlavním řezem hranolu bývá trojúhelník z pravidla rovnostranný, tedy s lámavým úhlem $\varphi = 60°$, ale bývá také pravoúhlý a při tom rovnoramenný, tedy s úhly 90° a 45°, anebo vůbec je rovnoramenný na př. s úhlem $\varphi = 30°$ nebo i menším (anomální disperse.)

Typickým příkladem rozkladu světla hranolem jest rozklad světla bílého, na př. slunečního, jak jej první pozoroval (ve smyslu vědeckém) *I. Newton* a popsal ve své Optice (1740). Rozkladem vznikne pásmo barevné, které se zove **viditelné** čili **spektrum** určitého známého postupu barev, jež zovem **jednoduchými** čili **spektrálními**. Rozklad dějí se lomem na **první** rovině hranolu, na druhé se již světlo rozkládati nemůže, neboť je již rozloženo – ale rozstup barev se zde lomem **zvětšuje**. –

V oddílu optiky, který se zove **chromatikou** a jedná o **rozkladu světla** a úkazech s ním souvisících, je tedy **hranol** přístrojem **representativním**. Proto studium lomu světla hranolem a v dalším postupu studium rozkladu světla s tímto lomem spojeného je zde **úlohou základní**.

Přejdeme k úloze těchto přejdeme předešlému důležitou poznámku následující.


Viděli jsme, že paprsky **homocentrické** bárnující se na rovině přestávají býti homocentrickými; na místě společného centra nastupuje po lomu plocha **diakaustická**, zde **virtuální** čili **geometrická**. Rozumí se samo sebou, že totéž platí mutatis mutandis při lomu světla dvěma rovinami lámavými t. j. hranolem.

Kdybychom tedy při experimentech s hranolem užívali paprsků homocentrických, t. j. takových, jež vycházejí ze světlého bodu anebo se světlé **štěrbiny lineární**, jak se jí při experimentech takových užívá a kterážto je jakoby pásmem světlých bodů – pak by paprsky z hranolu **divergentně** vycházející se protínaly geometricky (a zpětným prodloužením) v ploše diakaustické, při čemž by paprskům různé barvy také jiné a jiná plocha diakaustická odpovídala. Kdybychom papsky takové pozorovali **okem**,

tedy by zdánlivě vycházely ze štěrbiny za hranolem, jichž poloha by se měnila dle směru visírovým a dle barvy světla. Obrysy štěrbiny by sice **byly ostré** – poněvadž pupillou jen slabý svazek paprskový vždáleme – ale poloha štěrbiny, jak ji za hranolem vidíme, t. j. **obraz** štěrbiny skutečně by se měnila. Kdyby se pak **velký** svazek paprsků obsáhl, – na př. **dalekohledem**, jak to bývá u spektrálních apparátů – nemohly by obrysy štěrbiny v dalekohledu býti ostrými – a dalekohledem by se musil na různé barvy různě zaostřovati.

Abychom se těmto nesnázím **vyhnuli**, je **pravidlem** užívati světla **divergentního**, nýbrž **parallelního** t. j. vycházejícího od štěrbiny velmi (přímě vzato nekonečně) vzdálené. Toto **oddálení** štěrbiny bez provětší **tří optický** t. zvaným **kollimatarem**, jak o tom při spektroskopu pojednáno. Paprsky parallelní **zůstávají** i po lomu hranolem parallelními – dle barvy ovšem v jiném a jiném **směru** můžícími.

Proto v úvahách následujících předpjatme **jediný paprsek**, jak postupuje hranolem; tento jediný je representantem všech (obr. 101).



Ob. 101.

§66. Lom světla hranolem.

Vztahy quantitativní.

Sledujme postup hranolem daného paprsku určité délky vlny λ – tedy určitého exponentu n.

Úhel dopadu α jest dán.


Úhel lomu β stanoví se z rovnice

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = n.$$

Paprsek lomený na rovině 1) dopadne pak na rovinu 2) v úhlu dopadu β'. Tento následuje z jednoduché rovnice: $\beta + \beta' = \varphi$.

K úhlu dopadu β' náleží úhel lomu α' dle rovnice $\frac{\sin\alpha'}{\sin\beta'} = n.$

obr. 102



Tím je papisek S' z hranolu vycházející určen. Postup veličin, které jeho průběh stanoví, je tudíž

$$\alpha \ldots \beta \ldots \beta' \ldots \alpha'.$$

Při lomu (ke kolmici) na rovině 1) uchýlil se papisek od svého směru o úhel

$$\alpha' - \beta'.$$

Z těchto dvou <u>částečných</u> úchylek obdržíme úchylku S úhrnnou sečtením:

$$S = \alpha - \beta + \alpha' - \beta',$$

což lze též psáti ve formě $S = \alpha + \alpha' - \varphi$

vzhledem k rovnici $\beta + \beta' = \varphi$.

Tento úhel S udává tedy rozdíl směrů papisku dopadajícího S a papisku lomeného S' — udává, jak krátce říkáme, <u>úchylku hranolem</u> čili „<u>deviaci</u>" papisku.

§ 67. Závislost deviace na dopadu papisku.

Příklad počtení.

Otázka, která při hranolu zvláštní má důležitost, týče se právě této <u>úchylky</u> S. Dle rovnice

$$S = \alpha + \alpha' - \varphi$$

je zřejmo, že úchylka tato závisí na úhlech α a α' — neboť φ jest konstantou. — Ponevadž pak α' závisí také na α, tedy je tento první úhel dopadu x <u>vlastně podmiňující veličinou</u>. Když se tedy α mění, musí se též S měniti — ale jak, to nelze tak snadno zodpovídati, ponevadž způsob závislosti úhlu α' na α není tak jednoduchý a přehledný.

Abychom si věc, o níž se zde jedná, co možná objasnili, proveďme <u>počtený příklad</u>.

Mějmež hranol, jehožto úhel lámavý jest $\varphi = 60°$. Hranol budiž flintový. Pro světlo natriové jest zde

$$n = 1,7500 - \tfrac{7}{4}.$$

Úhel α volme v intervallech od 10 k 10 stupňům, k němuž počítejme příslušné β, k tomu pak β' a k tomu zase α'; z toho se udají úchylky partiální

$$(\alpha - \beta) \text{ a } (\alpha' - \beta'),$$

jichž summací obdržíme úchylku totální S.

Výsledek počtu ukazuje přehledně tabulka následující.

α	β	$60° - \beta$ = β'	α'	Úchylky partiální: $\alpha - \beta$	Úchylky partiální: $\alpha' - \beta'$	S
0°	0,00	60°,00	.	0,00		.
10	5,69	54,31	.	4,31		.
20	11,27	48,73	.	8,73		.
30	16,60	43,40	.	13,40		.
40	21,55	38,45	.	18,45		.
50	25,96	34,04	78,41	24,04	44,37	68,41
60	29,66	30,34	62,13	30,34	31,79	62,13
70	32,48	27,52	53,96	37,52	26,44	63,96
80	34,25	25,75	49,49	45,75	23,74	69,49
90	34,85	25,15	48,05	55,15	22,90	78,05

Z těchto číselných výsledků soudíme, jak následuje: Ne všechny papisky jež na 1) rovinu hranolu dopadají, skutečně <u>projdou</u> hranolem. Ty z nich, dopadají v menším úhlu α, přijdou na 2) rovinu <u>úzkují</u>, t. j. ve <u>větším</u> úhlu β' a proto se <u>totálně</u> odrážejí. Tejné od úhlu β'^* počínajíc, který odpovídá úhlu $\alpha' = 90°$ a je tedy určen rovnicí

$$\frac{1}{\sin \beta'^*} = n$$

<u>začíná</u> průchod papisků hranolem. Počet dává

$$\beta'^* = 34,°85,$$

jakožto hodnotu <u>přechodní</u>. Té odpovídá

$$\beta = 25,°15$$

a tomu konečně $\alpha = 48°05$ $\qquad \lg n = 0,24304$


Od tohoto úhlu α počínajíc začíná tedy teprve průchod papisků hranolem.

Co se týče úchylek $\alpha - \beta$ a $\alpha' - \beta'$, pozorujeme, že s rostoucím úhlem α

úchylky $\alpha-\beta$ na rovině 1) přibývá,
„ $\alpha'-\beta'$ „ „ 2) ubývá,

ovšem v různém způsobu, když α stejnoměrně roste. Nejlépe přehlédneme tento způsob grafickým znázorněním. (Obr. 103.)

Obr. 103.



Jest viděti, že úchylky $\alpha-\beta$ přibývá různě rychle, naproti tomu úchylky $\alpha'-\beta'$ ubývá z počátku prudčeji, pak volněji a volněji.

Právě tímto, stává se, že součet obou úchylek, t. j. deviace δ z počátku vlivem prudkého klesání úchylky $\alpha'-\beta'$, až klesne k jistému minimum a odtud zase stoupá; když totiž úchylka $\alpha'-\beta'$ se stejnoměrně mníží, tak že převládá stoupání úchylky $\alpha-\beta$. Existuje tedy minimální hodnota deviace δ, a ze nastane, jak grafické znázornění ukazuje, když jest

$$\alpha-\beta=\alpha'-\beta',$$

což zase vede k podmínce


$$\alpha=\alpha'$$
$$\beta=\beta'.$$

Ježto na úhlu α závisí β i $\alpha-\beta$ dle zákona sinusového a dle téhož zákona závisí na α' také β' a $\alpha'-\beta'$. Z této identity závislosti plyne pak z podmínky $\alpha-\beta=\alpha'-\beta'$ ihned $\alpha-\alpha'$ a tudíž $\beta=\beta'$.

Tento výsledek lze jednoduše formulovati. Sestrojme rovinu Σ lámavou hranu tak, aby půlila úhel lámavý (obr. 104.) Rovina tato je pak rovinou souměrnosti hranolu.

Je-li $\alpha=\alpha'$, $\beta=\beta'$, tedy je vůči této rovině paprsek vycházející

Obr. 104.



souměrný s dopadajícím; paprsek hranolem samým jdoucí je k této rovině kolmým.

[*§ 68. Minimální úchylka. Důkaz algebraický. *]

[*Existují četné důkazy věty o minimální úchylce δ. Jednodušší je následující:

K rovině Σ rovnice

$$\sin\alpha = n\sin\beta$$
$$\sin\alpha' = n\sin\beta'$$

plyne sečtením a odečtením

$$\sin\alpha+\sin\alpha' = n(\sin\beta+\sin\beta')$$
$$\sin\alpha-\sin\alpha' = n(\sin\beta-\sin\beta'),$$

kteréžto dvě rovnice lze psáti též ve formě

$$\sin\frac{\alpha+\alpha'}{2}\cos\frac{\alpha-\alpha'}{2} = n\cdot\sin\frac{\beta+\beta'}{2}\cos\frac{\beta-\beta'}{2} \quad \ldots (1)$$
$$\cos\frac{\alpha+\alpha'}{2}\sin\frac{\alpha-\alpha'}{2} = n\cdot\cos\frac{\beta+\beta'}{2}\sin\frac{\beta-\beta'}{2} \quad \ldots (2)$$

Avšak $\beta+\beta'=\varphi$ a $\alpha+\alpha'=\delta+\varphi$, tudíž dvojením dle prvé z obou rovnic

$$\sin\frac{\delta+\varphi}{2} = n\sin\frac{\varphi}{2}\cdot\frac{\cos\frac{\beta-\beta'}{2}}{\cos\frac{\alpha-\alpha'}{2}} \quad \ldots (3)$$

Záleží tudíž deviace na proměnném faktoru $\frac{\cos\frac{\beta-\beta'}{2}}{\cos\frac{\alpha-\alpha'}{2}}$. Ukáži tudíž nalézti, kdy má tento faktor nejmenší hodnotu, a jaká tato hodnota jest.

Dělíme-li hořejší rovnice (1) a (2), obdržíme

$$\operatorname{tg}\frac{\alpha+\alpha'}{2}\cdot\operatorname{tg}\frac{\beta-\beta'}{2} = \operatorname{tg}\frac{\beta+\beta'}{2}\operatorname{tg}\frac{\alpha-\alpha'}{2};$$

je-li $n>1$, pak je vždy $\alpha+\alpha'>\beta+\beta'$ a tudíž také

$$\operatorname{tg}\frac{\alpha+\alpha'}{2} > \operatorname{tg}\frac{\beta+\beta'}{2}$$ a následkem toho $\operatorname{tg}\frac{\beta-\beta'}{2} < \operatorname{tg}\frac{\alpha-\alpha'}{2}$

čili $\beta-\beta'<\alpha-\alpha'$, z toho však následuje, že $\frac{\cos\frac{\beta-\beta'}{2}}{\cos\frac{\alpha-\alpha'}{2}} > 1.$

Má tedy výraz tento hodnotu nejmenší, když

$$\frac{\cos\frac{\beta-\beta'}{2}}{\cos\frac{\alpha-\alpha'}{2}} = 1 \quad \text{čili} \quad \beta-\beta' = \alpha-\alpha' \quad \text{a tudíž}$$

$$\alpha-\beta = \alpha'-\beta'.$$

Minimum δ vede tedy ke stejnosti obou paprskových úchylek. Poněvadž však úchylka jak $\alpha-\beta$ tak $\alpha'-\beta'$ závisí stejným způsobem na α resp. α', tedy

plyne: $\alpha = \alpha'$

a tudíž: $\beta = \beta'$.

Je tedy deviace paprsků hranolem způsobená nejmenší, když chod paprsků jest ke hranolu symmetrickým, tak že

$$\alpha = \alpha', \quad \beta = \beta'.$$

V tom případě rovnice (3) přechází na velmi důležitý vzorec

$$\sin\frac{\delta+\varphi}{2} = n \sin\frac{\varphi}{2}. \quad *)$$

§69. Lom světla hranolem. Konstrukce.

Velmi názorně lze lom světla hranolem sledovati konstrukcí.

Vezměme za základ takovéto konstrukce týž údaje, které jsme volili při hořejším početním příkladě, totiž úhel lámavý $\varphi = 60°$ a exponent lomu $n = \frac{7}{4}$.

Víme již, jakou konstrukcí lze ku každému paprsku dopadajícímu nalézti lomený. Sestrojíme dva soustředné kruhy, jichž poloměry mají poměr rovnající se exponentu $\frac{7}{4}$; kruh vnitřní pro ústředí vzduch platící sestrojme na př. poloměrem = 20 cm; pak musíme kruh vnější pro ústředí sklo platící sestrojiti poloměrem = 20 cm $\times \frac{7}{4}$ = 35 cm (obr. 105 a 106).


Dle společného jich středu položíme lámavou hranu hranolu a naznačíme si její plochy přímkami 1) a 2); rovina nákresná je pak hlavním řezem hranolu.

Tím je vše ke konstrukci připraveno.


Budiž nyní dán paprsek dopadající SC, abychom k němu nalezli lomený, prodloužíme jej až k průsečku M s kruhem pro vzduch platícím, od tohoto průsečku

M přejdeme pak ke kruhu pro ústředí sklo platícímu a sice ve směru na plochu 1) kolmém do bodu O; i jest CO směr paprsku lomeného.

obr. 105.



obr. 106.



Uhlížejíce zase k tomuto, kterýž na plochu 2) dopadá, nalézti lomený, přejdeme od bodu O kruhu pro ústředí sklo platícího ke kruhu pro ústředí vzduch platícímu a sice ve směru kolmém na plochu 2) do bodu N; i jest CN směr paprsku S' z hranolu vycházejícího.

Konstrukce vede tedy k cíli rychle jednoduše a přehledně. K jakémukoliv paprsku S na hranol dopadajícímu nalezneme ihned paprsek S' z hranolu vycházející. Velmi instruktivně vynikou při tom případy, kdy konstrukce se stává nemožnou následkem totální reflexe.


Úchylka δ – rozdíl směrů S a S' – dá se pro pozorování relativní – měřiti oblouskem MN vnitřního kruhu. Všimněme si, že úhel MON je $= \varphi$, tedy konstantní a že směry OM a ON jsou rovněž konstantní, t. j. kolmé na plochy 1) a 2). – Když se tedy měří směr paprsku S, tedy to znamená, že se bod O na vnějším kruhu přinutí a s ním také konstantní úhel MON,

jehož ramena přicházejí do poloh s dřívějšími rovnoběžných.

§ 70. Deviace minimální. Důkaz geometrický.

Představíme-li si tato prošmování úhlu MON, tedy seznáme, že oblouk MN mezi jeho rameny obsažený bude se měniti – t. j. že se velikost δ bude měniti –, na základě jednoduchého geometrického názoru vyvodí pak ihned, že oblouk MN při určitém úhlu $MON = \varphi$ tehdá je nejmenší, když přímka OO' tento tento úhel půlí; pak stojí však tato přímka OO' kolmo na rovině symmetrie Σ.

Obr. 107.



Vskutku, když se (obr. 107.) oddalíme od poloh MON o malý oblouček OO' kolmý na OC do polohy $M'ON'$, přijde deviace MN v deviaci $M'N'$, při čemž na jedné straně oblouček NN' ubyde a na druhé oblouček MM' přibyde. Že však ihned patrno, že

$$NN' < MM';$$

neboť vedeme-li rovnoběžku a prodloužíme-li M, M do ML, tedy je

$$NN' = ML = M, M;$$

že však $ML < MM'$, je patrno, převažná přímka MM' je šikmější než ML ke směru $O'M'$. Tedy:

ubyde o NN' a přibyde o větší oblouček MM', tudíž přibyde celé deviace, t. j. $M'N' > MN$.

Patrno stoupá deviace, stále až paprsek dopadající na jedné (nebo vycházející na druhé) rovině hranolu, jde po této rovině, (t. j. $\alpha = 90°$, resp. $\alpha' = 90°$).

§ 71. Kolmý dopad paprsku na rovinu hranolu. Vztahy algebraické

Podmínkou, nichžby minimální je postup paprsků v hranolu

přímě určen, neboť je tím stanoveno, že paprsek lomený postupuje kolmo k rovině symmetrie Σ hranolu (obr. 108.) Relace


$$\beta = \frac{1}{2}\varphi$$
$$\alpha = \frac{1}{2}\varphi + \frac{1}{2}\delta$$

plynou ihned z obrazce samého. Poměr

$$n = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{\sin\frac{1}{2}(\varphi+\delta)}{\sin\frac{1}{2}\varphi},$$

kdež je δ nejmenší, udávají, jak lze exponent lomu n počítati.

(Methoda Fraunhofer.)



Obr. 108.


Postup paprsku z hranolu může se však státi určitým také touto podmínkou, že paprsek lomený má postupovati kolmo k zadné druhé rovině 2) hranolu, t. j že má vycházeti z hranolu ven jakožto paprsek hlavní bez lomu (obr. 109.). Při této podmínce je to tak, jakoby rovina Σ (obr. 108) postoupila na místo roviny hranolu (obr. 109) Patrno je zde

$$\beta = \varphi$$
$$\alpha = \varphi + \delta$$

tudíž

$$n = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{\sin(\varphi+\delta)}{\sin\varphi},$$

kterážto rovnice podobně jako dřívější stanoví exponent lomu. (Methoda Meyerstein.)




Obr. 109.

Obr. 109. je zde jako poloviční obr. 108; proto cv je zde φ, je tam $\frac{1}{2}\varphi$, cv je zde δ, je tam $\frac{1}{2}\delta$.

§ 72. Pokračování. Konstrukce.

Také geometricky nikazuje se, že podmínkou v § předešlém uvedenou se postup paprsku v hranolu stává určitým. Neboť měří CS' je dán (obr. 110), tudíž zbývá jen od bodu O na kruhu vnějším jíti směrem kolmým na 1) rovinu hranolu ke kruhu vnitřnímu; tím se stanoví bod M, který spojí se s C, čímž se má paprsek dopadající S.

[*§ 73. Meze methody Fraunhoferovy a Meyersteinovy.*)



ob. 110.

[* Vzhledem k totální reflexi stává se postup paprsku v hranolu nemožným, je-li $\beta = \beta^*$, kdež jest β^* krajní úhel odpovídající $\alpha = 90°$ a tudíž největší rozvití

$$\frac{1}{\sin \beta^*} = n$$

čili $\sin \beta^* = \frac{1}{n}$.

Abychom viděli, jak se úhel β^* účelně určiti, předpokládejme na př. světlo natriové a hranol ze skla buď korunového neb flintového

Pro hranol korunový se udává

$n_{Na} = 1,53$ až $1,61$,

tedy střední hodnota $= 1,57$;

počítáme-li $\sin \beta^* = \frac{1}{1,57}$,

vychází $\beta^* = 39,°6$.

Pro sklo flintové se udává

$n_{Na} = 1,61 - 1,75$,

tedy střední hodnota $= 1,68$;

počítáme-li $\sin \beta^* = \frac{1}{1,68}$,

vychází $\beta^* = 36,°5$.

Krajní touto hodnotou úhlu β je omezen též lámavý úhel hranolu.

Při methodě Fraunhoferově jest:

$\varphi = 2\beta$,

tedy mez: $\varphi \leq 2\beta^*$.

Při methodě Meyersteinově je $\varphi = \beta$,

tedy mez $\varphi \leq \beta^*$.

Jest viděti, že methoda Fraunhoferova připouští úhly hranolové dvojnásobné velikosti než Meyersteinova.

Vzhledem k horejším hodnotám, jak jsme je předpokládali, by tedy při methodě Fraunhoferově mohly míti lámavý úhel

hranoly korunové až asi 79,°2

" flintové " " 73,°0;

naproti tomu při methodě Meyersteinově jenom

hranoly korunové až asi 39,°6

" flintové " " 36,°5.

Vzhledem k tomu, že se při světle menší délky vlny než je Na-ová hodnoty n ještě zvětší, stanou se pro kraj spektra ony hodnoty ještě menšími.

Jisté však je jisto, že hranoly i ze silného skla flintového a pro světlo fialové mohou ještě úhel 60° dle methody Fraunhoferovy, naproti tomu jen 30° dle methody Meyersteinovy. Proto je poslední méně výhodnou. Přesto má některé výhody, na než poukázáno, až budeme jednati o úlohách spektrometrických. *)

§ 74. Spektrum slunečné. Podmínky čistoty spektra.


V předcházejících výkladech o hranolu kreslili jsme vždy jen jediný paprsek a sledovali jsme jej, jak se mění ve směru svém lomem na prvé i druhé rovině hranolové. Řekli jsme však již dříve, že tento paprsek považujeme jakoby za representanta mnoha jiných na hranol rovnoběžně dopadajících. Za takovéto paprsky rovnoběžné možno pokládati paprsky slunečné, avšak jen přibližně.—

Pustíme-li paprsky slunečné malým kulatým otvorem v okenici do síně zatemnělé, rozbíhají se od tohoto bodu v úhlu, který činí asi půl stupně; jest to týž úhel, pod kterým vidíme jasnou desku slunečnú. Zachytíme-li pak tento svazeček paprsků na bílé stěně, obdržíme malý obrázek slunce, kruhový neb elliptický.—

Abychom při tomto pokusu dostali paprsky slunečné do takovéhoto směru, jaký

si vzhledem k uspořádání pokusu přejeme, na př. do směru horizontálního, užíváme heliostatu, který se zasadí do okenice.

Postavíme-li do směru paprsků těchto hranol (obr. 111), pozorujeme úkaz dvojí:



ob. 111.

Přeložíme-li úchylku-deviaci-paprsků; obrázek slunce na stěně neobjeví se již na tom místě, kde byl dříve, nýbrž na jiném; při tom však pozorujeme ještě důležitý úkaz druhý: na místě kulatého obrázku bílého obdržíme podlouhlý proužek, ve kterém postupují barvy v určitém pořádku.

červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, (jasně- tmavě-) (cyanová) (indigová) fialová.

Tento proužek zovem slunečním vidmem čili spektrem.

Šířka tohoto barevného proužku jest ovšem při užívání jediného malého otvoru kulatého v okenici velmi malá; abychom obdrželi tento proužek širší, užijeme celé řady takových malých otvorů v nepřetržité souvislosti nad sebou, t. j. užijeme štěrbiny a sice kvadratické; necháme-li paprsky slunečné jíti horizontálně, pak jest nejjednodušší postaviti štěrbinu vertikálně; hranol pak umíníme postaviti tak, aby lámavá hrana byla rovněž vertikální, t. j. se štěrbinou rovnoběžná.


Spektrum slunce, které obdržíme při tomto uspořádání pokusu, nazýváme dostatečně čisté; poněvadž totiž paprsky od štěrbiny vycházející se rozlišují, třeba že jen v úhlu velmi malém, tedy má obraz na stěně zachycený přímo — bez hranolu — jistou šířku; užije-li se tedy hranolu, kterým se tento obraz uchýlí a sice pro každou barvu jinak, tu padnou tyto různě barevné obrazy částečně na sebe, jeden kryje poněkud následující, tím se barvy mísí a nejeví se úplně čisté. Tomu nelze snad odpomoci zúžením štěrbiny, poněvadž na divergenci paprsků slunečních

zůstává i při štěrbině velice úzké.

Čistějších barev obdržíme tím, že těsně před hranol postavíme ještě jednu úzkou štěrbinu vystřiženou na př. z černého kartonu rovnoběžně s první; tím se z rozbíhajících se paprsků některé eliminují, t. j. šířka obrazu se na stěně zmenší; následkem toho odpadá pak okolnost právě vytčená, obrazy různobarevné se nekryjí již tou měrou, nezasahují jeden velkou částí přes druhý, a barvy jsou tudíž čistější; ale ovšem také poměrně málo intensivní, poněvadž mnoho světla se zachycením paprsků okrajem diaphragmatem ztrácí.

Nejdokonalejší způsob obdržeti spektrum slunce spočívá v užití spojné čočky. Postavíme-li takovouto čočku (osou do směru paprsků slunečních) před štěrbinu — ale ovšem do větší vzdálenosti než jest délka ohniskové čočky — dává čočka na druhé straně v určité vzdálenosti ostrý obraz reálný štěrbiny, který lze na bílé stěně zachytiti. Když pak za čočku postavíme hranol tak, aby jeho hrana lámavá byla rovnoběžná se štěrbinou, uchýlí se hranolem tento obraz ostrý, uchýlí se však pro každou barvu jinak; obdržíme tedy celou řadu takových ostrých obrazů štěrbiny různých barev vedle sebe, takže ve své posloupnosti dávají jasné spektrum; když pak učiníme ještě štěrbinu úzkou, jsou veškeré barvy ve spektru zcela čisté, ale ovšem méně jasné, když jest štěrbina velmi úzká.

Toto uspořádání pokusu jest v obr. 112. schematicky znázorněno.



ob. 112.

S je štěrbina, která je do okenice zasazena, a kterýž se dá šroubem zúžiti neb rozšíriti; postavena jest vertikálně.

Ve vzdálenosti a stojí spojná čočka tak, že její osa jest horizontální procházející středem štěrbiny S. Dobře se hodí k tomu čočka dálky ohniskové na př. 100 cm; vzdálenost a může pak býti asi 130 - 140 cm. Tato čočka dala by ve vzdálenosti b v mžem příkladě asi 3-4 metry - ostrý, zvětšený reálný obraz S' štěrbiny, který bychom na bílém stínítku mohli zachytiti.

Postavíme-li však za čočku hranol, ukáže se tento obraz S' v jiném směru ale při tom objeví se ve všech možných barvách tak, že obdržíme celou posloupnost $S_1, S_2, S_3 \ldots\ldots$ takových obrazů S'; každá barva jinak se lámající dává svůj obraz na jiném místě. Posloupnost všech obrazů tvoří spektrum slunce.

Na čistotu barev má vliv též ta okolnost, zda-li má hranol postavení minimální, t.j. zda-li úchylka hranolem způsobená jest minimum. Považujž zde pro každou barvu úchylka je jiná, může se toto minimum vztahovati jen na určitou barvu, na př. žlutou.

Je tedy pravidlem, že se hranol postaví zkusmo tak, aby žlutá barva měla minimum úchylky.

Způsob uspořádání, jak byl právě popsán, je pohodlný, když se při experimentování ukazují spektra, jak různými hranoly vznikají; neboť hranoly lze pak rychle vyměňovati, kdežto veškeré uspořádání další zůstane. Při tom lze dobře užíti i velmi malých hranolků, které se pak kladou do té části svazku papsko-vého, kde je - blíže ohniska čočky - průměr zúžen, a obdrží se spektrum v celé šíře obrazu štěrbiny.

Pokusy takovými lze dokázati, jak při minimálním postavení hranolu (vzhledem k žluté části spektra) závisí deviace t.j. střední úchylka spektra, a disperse t.j. šířka spektra,

a.) na úhlu lámavém hranolu (hranol na př. kosmový, úhel 30°, 45°, 60°, 75°)

b) na materiálu hranolu (při úhlu lámavém 60° hranol vodní, sirouhlíkový, benzolový, kosmový, flintový,

thalliový, křišťálový, vápencový - u obou posledních v případě drahém -, atd.)

Jde-li naposti tomu o spektrum zvláště čisté, jako na př. když se mají ukazovati čáry Fraunhoferovy, o nichž jedna z následujících, je správnější dáti čočku projekční za hranol, aby totiž hranolem prostupovaly paprsky sluneční jak původně jsou, t.j. téměř rovnoběžné a nikoli čočkou konvergentními učiněné. Ovšem že pak žádá se hranol velikých délky, velikých ploch, má-li spektrum býti široké; hranoly takové jsou velmi drahé.

Čistota spektra při tom stoupá, jednak když je štěrbina užší, jednak když se spektrum promítá dále, aby jeho šířka byla větší, t.j. aby se barvy více od sebe vzdálily. Ale ovšem jedno i druhé prostředek oslabuje jasnost spektra.

§ 75. Čáry Fraunhoferovy.

Sejde-li se při demonstrování spektra slunečního pravidel v § předešlém vytknutých, a míří-li se hranolu (60°) z lepšího skla flintového, nebo ještě lépe thallioveho anebo také sirouhlíkového, ukáže se že posloupnost barev není v tomto spektru nepřetržitá, že barvy neplynou jedna v druhou, nýbrž že jich kontinuita je přerušena velmi četnými, ostrými, tmavými čarami kolmými na délku se spektra. Čáry tyto zovou se čarami Fraunhoferovými.

První jenž je objevil a pozoroval, nebyl sice Fraunhofer, nýbrž Wollaston (1802), nicméně Fraunhofer objevil čáry ty samostatně a pozoroval je a popsal obšírněji.

Aby čáry se objevily v celém rozsahu spektra na stínítku povinném co možná současně ostrými, dlužno pro projekci užíti čočky achromatické; o této bude jednáno níže.

Hlavní z čar těchto označil Fraunhofer velikými písmeny latinské abecedy, jsou to následující:

A na počátku barvy červené
B téměř uprostřed " "
C na počátku barvy oranžové
D téměř uprostřed " "
E " " " zelené
b Systém tří čar velmi charakteristických v blízkosti čáry *E*.
F na počátku barvy modré
G na konci " "
H v barvě fialové.

Tyto ostré čáry označují nám s velikou přesností určitá místa ve spektru slunečním; každá je jakoby indexem a více daleko určitějším než by bylo označení barvy; neboť jistá barva na př. zelená jeví se ve spektru v různém odstínění; naproti tomu ukazuje na př. čára *E* zcela určité místo v této barvě zelené.

Pokusy o rozkladu bílého světla v barvy prováděl v četných způsobech již Newton, i je o prohlášení, že týž nepozoroval také čáry Fraunhoferovy; že by byly jeho pozorovací síly, nelze si myslit; naproti tomu je pravdě podobno, že hranoly, jichž k pokusům svým užíval, nebyly dobře rovinně broušeny a hlazeny.

Po Fraunhoferovi pozoroval čáry ve spektru slunečním Kirchhoff (1861) způsobem velice dokonalým, o němž později bude pojednáno; týž napočítal mezi *A* a *G* jich asi 2000 čar více méně jasných a ostrých.

Čáry Fraunhoferovy označující určité místo ve spektru odpovídají též určitému exponentu lomu *n*. Kde tedy jde o nejpřesnější stanovení tohoto exponentu, udává se pro jistou čáru Fraunhoferovu.

§76. Disperse.

Exponent lomu *n* mění se s délkou λ vlny světelné. Zákon dle kterého

se mění, musí být zkoumán na základě skutečných pozorování. Dvojího druhu zde užívaných jeduá spektrometrie. Pozorováním zjednává se čistý materiál, který pro určitá místa k různým délkám λ dává příslušné exponenty lomu *n*. Při pozorování těchto konají velmi dobré služby čáry Fraunhoferovy tím, že ve spektru naznačují jakoby indexy, které odpovídají určitým délkám λ. Proto jest obyčejem stanoviti exponenty lomu *n* zvláště pro jednotlivé čáry Fraunhoferovy.

Když výsledky pozorování takových sestavíme tabellárně, anebo když zjednáme si grafické znázornění, ukazuje se, když od čáry *A* postupujeme dále až k čáře *H*, že u některých látek exponent lomu je menší a stoupá pozvolna, u jiných pak že je větší a stoupá prudčeji. Ukazuje se dále, že toto stoupání není nikterak stejnoměrné. Když naznačíme λ za úsečku, *n* za pořadnici, obdržíme křivky pro každou látku jinou, a když sledujeme křivku ve směru od čáry *A* k čáře *H*, tedy ve směru zpátečném, ve smyslu ubývajících λ, vidíme, že křivky stoupají dosti nepravidelně. Mathematicky jeví se tato nepravidelnost tím, že je velice nesnadno pro křivky ty nalézti příslušné rovnice, t. j. pro stoupání exponentu lomu *n* s klesající délkou vlny vyjádřiti relací jistou mezi *n* a λ.

Za příklad uvádíme relativní exponent lomu *n* pro jisté sklo korunové a flintové odpovídající různým čárám Fraunhoferovým.

	Silné sklo flintové (Borové)	Slabší sklo flintové	Sklo korunové
B	1,7697	1,6277	1,5258
C	1,7718	1,6297	1,5268
D	1,7777	1,6350	1,5296
E	1,7853	1,6420	1,5330
F	1,7924	1,6483	1,5361
G	1,8062	1,6603	1,5417
H	1,8186	1,6710	1,5465

Pozorovatel:
(Rutzow), (Fraunhofer).

Je patrno, že ústředí, u něhož průměrná hodnota exponentu lomu - nebo hodnota odpovídající střední části spektra, na př. čáře *D* a pod. - je větší, dává větší disperse.

Co se však disperse týče, o té pozhovoříje, jak spadne se exponent lomu měnící s délkou vlny. Abychom zde obdrželi jednoducha čísla ke srovnání, stanovíme tuto změnu od čáry B k čáře H, tedy stanovíme

$$\text{disperse} = n_H - n_B.$$

Dle toho by tedy byla disperse

onoho jiného skla flintového	=	0,0489
" slabšího " "	=	0,0433
" skla korunového	=	0,0207.

Patrně, že tím obdržíme jakousi disperse průměrnou.

Podobně se udává:

n	Voda 18° C	Sirouhlík (24° C)
B	1,3309	1,6114
H	1,3442	1,6956
Disperse =	0,0133	0,0832

Důležita je však poznámka následující. Disperse látek nestoupá stejným krokem s lámavostí. Tak je na př. disperse onoho jiného skla flintového proti disperse skla korunového více než dvojnásob tak veliká — máme zde čísla 0,0489 proti 0,0207; naproti tomu lámavost není v tom poměru větší; pro čáru D máme zde čísla 1,7777 proti 1,5296.

Sklo flintové láme tedy světlo oněm jiného skla korunové, ale poměrně daleko silněji je rozkládá.

Z toho následuje: Mámo-li dva hranoly (různých úhlů lámavých), flintový a korunový, a dávají-li (na př. pro čáru D) stejnou deviaci, tedy převládá značně disperse hranolu flintového.

Naopak, dávají-li stejnou disperse, pak zase převládá deviace hranolu korunového.

Tyto poznámky jsou důležité pro stavbu hranolů (a tedy i čoček) achromatických. Pravidlem je, že na př. sirouhlík má menší lámavost, ale větší disperse oproti skla flintovému.

Když hranolem sobě zjednáme spektrum jeví se — při určitém úhlu lámavém na př. 60° — větší disperse materiálu tím, že — při určitém postavení

stínítka — je délka spektra od čáry B k čáře H větší. To znamená, že změna deviace δ je větší, když od exponentu n čáry B postupíme k exponentu n čáry H. Také zde odpovídá úbytná délka spektra disperse průměrné.

Činak, počítá-li se disperse tato pro intervally dané jednotlivými čarami Fraunhoferovými, a srovnává-li se pak s intervally odpovídajícími délkám vlny, ukazuje se, že disperse není ve spektru rozdělena stejnoměrně, nýbrž že stoupá směrem k fialovému konci spektra. Jest tedy spektrum čím dále sem, tím více poměrně roztáhlejší.

Věc tato objasní se nejlépe číselně konkrétním příkladem.

Vezme hranol z toho jiného skla flintového (borového), pro které nahoře jsou exponenty lomu různým čarám Fraunhoferovým odpovídající udány. Úhel lámavý φ budiž = 60°. Postavme dále pro čáru D do polohy minimální. Z podmínky této udá se jednoduše úhel dopadu α světla bílého.

Nebot je pak:

$$\beta = \tfrac{1}{2}\varphi,$$

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\frac{\varphi}{2}} = n.$$

Z toho:

$$\sin\alpha = n \sin\frac{\varphi}{2}.$$

Pro $n = 1{,}7777$ vychází $\alpha = 62° 43{,}7'$.

Mající tímto způsobem určený dopad, počítejme, jak postupují dále hranolem paprsky různým čarám Fraunhoferovým odpovídající, dle rovnic:

$$\alpha \text{ dáno} = 62° 43{,}7'$$

$$\beta \text{ dle } \sin\beta = \frac{\sin\alpha}{n}$$

$$\beta' \text{ " } \beta + \beta' = \varphi$$

$$\alpha' \text{ " } \sin\alpha' = n \sin\beta'$$

$$\delta \text{ " } \delta = \alpha + \alpha' - \varphi.$$

Počet dává výsledky následující:

$$\alpha = 62° 43{,}7'$$

δ minimum pro D.

Čára	n	β	β'	α'	δ	λ $\mu\mu$
A						759,4
B	1,7697	30° 9'0	29° 51'0	61° 44'5	64° 28'2	686,7
C	1,7718	30 6,6	29 53,4	62 0,0	64 43,7	656,3
D	1,7777	30 0,0	30 0,0	62 43,7	65 17,4	589,3
E	1,7853	29 51,6	30 8,4	63 41,5	66 25,2	527,0
F	1,7924	29 43,8	30 16,2	64 37,3	67 21,0	486,1
G	1,8062	29 28,7	30 31,3	66 32,2	69 15,9	430,8
H	1,8186	29 15,5	30 44,5	68 22,4	71 6,1	396,9


Abychom souvislost deviace δ s délkou vlny jednoduše přehlédli, sestrojme příslušný diagramm naníšejíce za úsečku λ a za pořadnici δ. Tak vznikl obr. 113. Deviace δ je naníšena od hodnoty 64° počínajíc, rovněž délka vlny od hodnoty 300 $\mu\mu$ počínajíc, aby diagramm nenabyl velikých rozměrů; však se jedná jen o rozdílové hodnoty.

Křivka je velice pozoruhodná. Vidíme, jak prudce stoupá deviace, když se blížíme konci spektra fialovému. Křivkou je lépe než plovoucí znázorněno, že ve spektrech hranolových nejsou barvy stejnoměrně rozvrženy. Tím se důležitě rozeznávají od spekter mřížkových, u nichž na místě disperzní křivky nastupuje přímka, kde tedy rozložení barev je stejnoměrné, t.j. úměrné délce vlny, pro kterouž příčinu se spektra mřížková zovou rozměrnými.

{* §77. Pokračování. Disperse lokální. *}

{* Kdybychom znázornili graficky, jak se mění úhel α' — pod kterým paprsky z hranolu vycházejí druhou lámavou plochou — s exponentem lomu n pro různé λ, obdrželi bychom křivku, jí se stoupajícím n by též stoupal α'. Avšak nikoli dle zákona přímky, nýbrž nějaké křivky. Proto také rychlost tohoto stoupání, t.j. $\frac{d\alpha'}{dn}$, by byla pro různé n různá. Tato rychlost stanoví disperse lokální, t.j. pro určité místo ve spektru.

Obr. 113.



Abychom seznali, jak se hranolem tvoří disperse lokální ve spektru, sestavíme rovnice pro hranol platící a hledáme differenciací výraz $\frac{d\alpha'}{dn}$. Počet stojí takto:

Rovnice dané:
$$\sin\alpha = n.\sin\beta$$
$$\sin\alpha' = n\sin\beta'$$
$$\beta + \beta' = \varphi.$$

Differenciací vyjde:
$$\cos\alpha\, d\alpha = n\cos\beta\, d\beta + \sin\beta\, dn$$
$$\cos\alpha' d\alpha' = n\cos\beta' d\beta' + \sin\beta' dn$$
$$d\beta + d\beta' = 0.$$

Že tu rovnice snadnou vyloučíme $d\beta$ a $d\beta'$ hledíce k poslední rovnici. Násobíce první výrazem $\cos\beta'$, druhý výrazem $\cos\beta$ a sečtouce, obdržíme

$$\cos\alpha\,\cos\beta'\,d\alpha + \cos\alpha'\cos\beta\,d\alpha' = \sin\varphi\,dn$$

čili

$$\cos\alpha\,\cos\beta'\frac{d\alpha}{dn} + \cos\alpha'\cos\beta\frac{d\alpha'}{dn} = \sin\varphi .$$

Odvozujíce tuto rovnici předpokládali jsme, že by také bylo α různé pro různé n, t. j. že by na hranol dopadalo světlo již rozložené — tedy spektrum.

Rovnice pak udává, jak se původní lokální disperse $\frac{d\alpha}{dn}$ hranolem změní v novou $\frac{d\alpha'}{dn}$.

Rovnice je symmetrická vzhledem k $\alpha, \beta, \alpha', \beta'$ —, t. j. postup paprsků lze obrátiti.

Pro ten jednodušší případ, kdy na hranol dopadá světlo již rozložené, užitý bílé, t. j. kdy $\frac{d\alpha}{dn} = 0$, obdržíme disperzi $\frac{d\alpha'}{dn}$, hranolem tímto způsobenou, z rovnice:

$$\frac{d\alpha'}{dn} = \frac{\sin\varphi}{\cos\alpha'.\cos\beta} .$$

Že tedy viděti, že se lokální disperse ve spektru hranolem způsobením od místa k místu mění, ovšem nikoli dle jednoduchého zákona; neboť když rostou n, klesá β a stoupá α', tudíž stoupá $\cos\beta$ a klesá $\cos\alpha'$, takže v součinu obou nelze bez dalšího vyčtení si utvořiti představu, jak se mění. — K objasnění toho počítáme disperzi lokální pro ten hranol krovný, který jsme v § předcházejícím prozkoumali, hledíce k různým barvám Fraunhoferovým.

$\alpha = 62° 43{,}7$


Čáry.	n	β	α'	$\frac{\sin\varphi}{\cos\beta\cos\alpha'}$
B	1,7697	30° 9′0	61° 44′5	1,2213
C	1,7718	6,6	62 0,0	1,2312
D	1,7777	0,0	43,7	1,2600
E	1,7853	29 51,6	63 41,5	1,3009
F	1,7924	43,8	64 37,3	1,3435
G	1,8062	28,7	66 32,2	1,4425
H	1,8186	15,5	68 22,4	1,5550

Výsledek počtu ukazuje tabulka následující. Vidíme z těchto číselných dat, že disperse lokální $\frac{d\alpha'}{dn}$ (cos je totéž jako $\frac{d\beta}{dn}$) stoupá, když se blížíme k fialovému konci spektra. *)

§ 78. Hranoly achromatické.

Jak jsme viděli, má hranol dvojí účinek: deviaci a disperzi. Jednak totiž ohýbá se jím paprsek bílého světla z původního směru, jednak se rozkládá v barvy. Je otázka, zdali je možno docíliti účinku jednoho a vyhnouti se druhému, tedy zdali je možno docíliti deviace bez disperse — hranoly achromatické — anebo disperse bez deviace — hranoly přímohledné.

Hranol achromatický skládá se ze dvou hranolů jednoho korunového C o světlém lámavým úhlem φ a druhého flintového F o menším úhlem lámavým ψ a obráceně postaveného. Oba jsou kanadským balsámem k sobě přitmeleny (obr. 114.)



obr. 114.

Sklo flintové rozkládá světlo silněji než korunové; možno tudíž při hranolu F docíliti jeho menším úhlem ψ téže disperse, jakou jeví hranol C s velkým úhlem, následkem čehož nezpůsobí postavení hranolu F a disperse hranolu C zpět psaní. Výchylka však hranolem C způsobená zmenší se značně hranolem F, avšak, nemůže se úplně, poněvadž lámavost skla flintového není v téže míře větší jako jest větší jeho síla rozkládná. Zde má platnost poznámka v § předešlém v příčině achromasie nedosažené.

Obr. 114. ukazuje, jaký je asi chod paprsků krajních, červeného a fialového, v takovém hranolu achromatickém.

Lomem na hranolu korunovém paprsky červený a fialový sbíhnou; při přechodu do hranolu flintového, kde lom se děje obráceně, se poněkud již srovnají — jich sbíhavost se značně nemění —, až konečně vycházejíce do vzduchu postupují zcela rovnoběžně — předpokládajíc, že jsou úhly lámavé obou hranolů správně určeny.

Zbývající deviace je ve směru hranolu korunového.

(* §79. Pokračování. – Řešení počtem. *)

(* Důležita jest úloha hranol achromatický počítati. Dán je při tom materiál, t.j. sklo korunové a flintové; exponent lomu n a n' musí pro různé čáry Fraunhoferovy býti znám. Může dále býti dán lámavý úhel φ hranolu korunového, a může se žádati, aby paprsek bílý v počítaném úhlu α na hranol tento dopadající vycházel opět jako bílý z hranolu achromatického. Jde pak o to, počítati úhel ψ hranolu flintového.

V následujícím uvažuje se na řešení úkolu tohoto jen přibližné.

Učiň se totiž úhel ψ tak, aby paprsky krajní, t.j. červený (B Fraunhofer) a fialový (H Fraunhofer) rovnoběžně z hranolu flintového vycházely.

Jsou pak velmi přibližně také ostatní paprsky mezi těmi krajními obsažené rovněž rovnoběžně, tak že nevznikne již žádná disperse.

Když se úkol takto již zpředu zjednodušší, stává se jeho řešení velmi jednoduchým.

Dány jsou tedy:

Exponenty skla korunového n_B a n_H

" " flintového n'_B a n'_H.

Úhel lámavý hranolu korunového φ

Úhel dopadu na hranol korunový α.

Nyní se počítá – a sice pro čáru Fraunhoferovu B (světlo červené) i pro čáru Fraunhoferovu H (světlo fialové)

úhel β_B a β_H dle $\sin\beta = \frac{\sin\alpha}{n}$,

" β'_B a β'_H " $\beta+\beta' = \varphi$

" γ_B a γ_H " $\frac{\sin\gamma}{\sin\beta'} = \frac{n}{n'}$.

Označí-li nyní ψ neznámý lámavý úhel hranolu flintového, pak jest $\psi-\gamma$ úhel dopadu na poslední lámavou plochu.

Je-li α' úhel lomu, platí rovnice

$$\frac{\sin\alpha'}{\sin(\psi-\gamma)} = n' ;$$

i musí úhel α' býti týž jak pro B tak i H, t.j. musí býti součin $n'\sin(\psi-\gamma)$ týž pro B i pro H. Činí dostáváme rovnici podmiňující achromasii:

$$n'_B \sin(\psi-\gamma_B) = n'_H \sin(\psi-\gamma_H),$$

ze které se ψ má počítati.

Nejjednodušeji se upraví rovnice takto:

$$\frac{\sin(\psi-\gamma_B)}{\sin(\psi-\gamma_H)} = \frac{n_H}{n_B}.$$

$$\frac{\sin(\psi-\gamma_B)+\sin(\psi-\gamma_H)}{\sin(\psi-\gamma_B)-\sin(\psi-\gamma_H)} = \frac{n_H+n_B}{n_H-n_B}$$

$$\frac{2\sin\left(\psi-\frac{\gamma_B+\gamma_H}{2}\right)\cdot\cos\frac{\gamma_H-\gamma_B}{2}}{2\cos\left(\psi-\frac{\gamma_B+\gamma_H}{2}\right)\cdot\sin\frac{\gamma_H-\gamma_B}{2}} = \frac{n_H+n_B}{n_H-n_B},$$

z toho pak:

$$\operatorname{tg}\left(\psi-\frac{\gamma_B+\gamma_H}{2}\right) = \frac{n_H+n_B}{n_H-n_B}\operatorname{tg}\frac{\gamma_H+\gamma_B}{2},$$

z kteréžto rovnice se ψ pohodlně logarithmicky počítá.

Rovnice tato je odvozena na základě relace

$$\gamma+\gamma' = \psi,$$

kteráž je analogická s relací

$$\beta+\beta' = \varphi.$$

Může se pak státi, že úhel γ' vypadne negativní – jako také v obrazci 115 je naznačeno – tak že pak je

$$\gamma-\gamma' = \psi.$$

To záleží na úhlu α. V počtu se to hned ukáže, zdali je difference

$$\gamma_H-\gamma_B$$

positivní neb negativní. Když že vypadne negativní, platí

$$\gamma' = \gamma-\psi,$$

a difference $\psi-\frac{\gamma_B+\gamma_H}{2}$ změní znaménko.

Nejlépe objasní se postup počtu příkladem.


Budiž jakožto material dán.
Hranol korunový toho způsobu, jak nahoře byly exponenty lomu udány, totiž:

$n_B = 1{,}5258$, $n_H = 1{,}5465$.

Úhel lámavý $\varphi = 60°$.
Kompenzující hranol flintový budiž ze skla borového, pro které nahoře udáno

$n'_B = 1{,}7697$, $n'_H = 1{,}8186$.

obr. 115.



Úhel dopadu α budiž $= 30°$

Počet se provede pro čáru B i H. Postup ukazuje tabulka následující:

pro čáru B	pro čáru H
$\alpha = 30°$	$\alpha = 30°$
$n = 1{,}5258$	$n = 1{,}5465$
$\beta = 19° 7' 44{,}''6$	$\beta = 18° 51' 47{,}''8$
$\beta' = 40\ 52\ 15{,}4$	$\beta' = 41\ 8\ 12{,}2$
$n' = 1{,}7697$	$n' = 1{,}8186$
$\gamma = 34° 20' 41{,}''8$	$\gamma = 34° 0' 58{,}''7$
$\psi = 22° 17' 42{,}''7$	
$\gamma' - \gamma - \psi = 12° 2' 59{,}''1$	$\gamma' = \gamma - \psi = 11° 43' 16{,}''0$
$\alpha' = 21\ 40\ 52{,}8$	$\alpha' = 21\ 40\ 53{,}0$
$\delta = \alpha + \alpha' - (\varphi - \psi) = 13° 58' 36''$	

Kontrola počtu dána je úplnou shodou úhlů α'_B a α'_H.

V jakémž úhlopříčce δ působí hranol achromatický tak, jako hranol obyčejný úhlu lámavého $\varphi - \psi$ a jistého exponentu lomu; proto je rovnice pro δ formálně táž jako pro hranol obyčejný,

totiž $\delta = \alpha + \alpha' -$ úhel lámavý
zde $(\varphi - \psi)$. *)

§ 80. Pokračování. Řešení konstrukcí.

Velmi jednoduše a elegantně řeší se úhel hranolu achromatického konstrukcí. Objasníme způsob tohoto řešení tím, že je provedeme právě pro týž případ, který jsme v předešlém § početně řešili.

Data konstrukce jsou:

Čáry	hranol korunový	hranol flintový
B	1,5258	1,7697
H	1,5465	1,8186

Připomeňme poté konstrukci Rerichovou pro hranol.

Sestrojme kruh poloměrem 20 mm společný oběma hranolům plošticím pro prostředí vzduch.

Pak pro hranol korunový kruhy poloměry

20 mm × 1,5258 = 30,52 mm pro čáru B,
20 „ × 1,5465 = 30,93 „ „ H,

a pro flintový kruhy poloměry


20 mm × 1,7697 = 35,39 pro čáru B
20 „ × 1,8186 = 36,37 „ „ H.

Tím je vše pro konstrukci připraveno (obr. 116.)

Při studiu podrobnějším by se odporučovaly rozměry poněkud větší, aby oba kruhy pro B a H více od sebe se rozestoupily — tedy na př. pro menší kruh poloměr 30 cm.

Volme nyní paprsek dopadající směrem k hraně O. Prodlužme až ke kruhu společnému pro vzduch plošticímu a od průsečíku postupme ve směru kolmice dopadu na rovinu 1) ke kruhům B a H pro hranol korunový, odtud však hned dále ve směru kolmice dopadu na rovinu 2) ke kruhům B' a H' pro hranol flintový. Aby nyní paprsky body B' a H' odpovídající se při lomu rovinou 3) hranolu flintového projity, musí patrně tato rovina býti kolmá ke směru přímky B H spojující oboje průsečíky na kruzích

*) $\delta = \alpha + \alpha' - (\varphi - \psi)$



obr. 116.

pro hranol flintový platících. V tom jest vlastní jádro konstrukce.

Polohu roviny 3) a tím úhel φ hranolu flintového těsně ke korunovému přiléhajícího je tak ihned určeno.

Zároveň jest ihned dán paprsek achromaticky vycházející a úchylka δ.


(* §. 81. Dokončení. Řešení přesné. *)

(* Mathematicky přesné a všeobecné řešení achromasie vychází od dat následujících.

Jest dán hranol korunový úhlu φ. K tomuto jest obráceně přiřazen před úhlem ω hranol flintový úhlu ψ. Vzpředu předpokládá se tedy, že by hranol flintový těsně přiléhal ke korunovému (obr. 117.)

Postup paprsku, který před úhlem α na hranol korunový dopadá, je stanoven soustavou rovnic následujících:

α	libovolné		
β	určeno rovnicí	$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = n$	
β_1	" "	$\beta + \beta_1 = \varphi$	
α_1	" "	$\frac{\sin\alpha_1}{\sin\beta_1} = n$	
α_2	" "	$\alpha_1 - \alpha_2 = \omega$	
β_2	" "	$\frac{\sin\alpha_2}{\sin\beta_2} = n'$	
β_3	" "	$\beta_2 + \beta_3 = \psi$	
α_3	" "	$\frac{\sin\alpha_3}{\sin\beta_3} = n'$	



obr. 117.

K těmto rovnicím přistoupí nyní ještě rovnice vyjadřující podmínku achromasie.

Tuto obdržíme úvahou následující.

Dokázali jsme větu: Hranolem jakýmkoliv lámavého úhlu φ změní se daná

disperse $\frac{d\alpha}{dn}$ v novou disperzi $\frac{d\alpha'}{dn}$ dle rovnice:

$$\cos\alpha\cos\beta'\frac{d\alpha}{dn} + \cos\alpha'\cos\beta\frac{d\alpha'}{dn} = \sin\varphi.$$

V této rovnici dlužno applikovati dvakrát, jednou na hranol korunový, podruhé flintový. Pro hranol korunový je při tom $\frac{d\alpha}{dn} = 0$, poněvadž dopadá na něj světlo bílé nerozložené. — Pro hranol flintový je analogicky $\frac{d\alpha'}{dn} = 0$, poněvadž má vycházeti světlo bílé, t. j. opětně složené.

Dosadíce příslušné indexy obdržíme tedy:

Pro hranol korunový:

$$\cos\alpha_1\cos\beta\cdot\frac{d\alpha_1}{dn} = \sin\varphi;$$

pro hranol flintový:

$$\cos\alpha_2\cos\beta\cdot\frac{d\alpha_2}{dn} = \sin\psi$$

Poněvadž je

$$\alpha_1 - \alpha_2 = \omega$$

čili

$$d\alpha_1 - d\alpha_2 = 0,$$

vyjde

$$\sin\varphi\cdot\cos\alpha_2\cos\beta_3\,dn - \sin\psi\cos\alpha_2\cos\beta\,dn' = 0.$$

To jest ona hledaná rovnice formulující achromasii.

Avšak rovnici této nutno bylo vyhověno pro každé λ.

Tím že k hořejšímu rovnicím přistoupí ještě tato nová, jest jedna veličina již ostatními určena — nelze ji volně disponovati, tedy na př φ nebo α.

Avšak má-li řešení býti dokončeno, musí se místo dn a dn' dosaditi příslušné hodnoty konečné. To lze jen, když je známo, jak se u obou určitých materiálů mění exponent lomu s délkou vlny.

Za příklad uvedme formuli Cauchyho, která je jednoduchou. Dle této klademe:

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4}$$

a počítáme pro jistý materiál konstanty A, B, C.

Pak by bylo:

$$\frac{dn}{d\lambda} = -\frac{2B}{\lambda^3} - \frac{4C}{\lambda^5}$$

a podobně:

$$\frac{dn'}{d\lambda} = -\frac{2B'}{\lambda^3} - \frac{4C}{\lambda^5}$$

Tyto výrazy by se musily dosaditi do hořejší rovnice a musilo by jí býti vyhověno pro každé λ.

Patrně by tím vznikly rovnice dvě (koefficienty s $\frac{1}{\lambda^3}$ by prostě se musily rovnati a prostě koefficienty s $\frac{1}{\lambda^5}$).

Kdybychom přestali jen na tvaru

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2}$$

přibližném, pak by bylo

$$\frac{dn}{d\lambda} = -\frac{2B}{\lambda^3},$$

t. j. činnou B, kteréž by se tedy v hořejší rovnici musilo zavésti.

Není-li B známo, pak se určí ze dvou hodnot, na př. pro n_B (červené) n_H (fialové); patrně jest:

$$n_H - n_B = B\left[\frac{1}{\lambda^2_H} - \frac{1}{\lambda^2_B}\right]$$

a podobně

$$n'_H - n'_B = B'\left[\frac{1}{\lambda^2_H} - \frac{1}{\lambda^2_B}\right].$$

Tyto differencee exponentu lomu by se pak mohly do hořejší

rovnice zavésti na místě dn a dn' přibližně.

Bylo by pak:

$$\frac{n'_H - n'_B}{n_H - n_B} = \frac{\sin\varphi \cos\alpha_2 \cos\beta_3}{\sin\varphi \cos\alpha_1 \cos\beta}.$$

Je-li pak, jakož jsme v příkladech konkrétních předpokládali, $\omega = 0$, t. j. $\alpha_1 = \alpha_2$, zjednoduší se rovnice tato v následující:

$$\frac{n'_H - n'_B}{n_H - n_B} = \frac{\sin\varphi \cos\beta_3}{\sin\varphi \cos\beta}$$

Když se tedy na př. hledá φ, bylo by

$$\beta_3 = \varphi - \beta_2$$
$$\cos\beta_3 = \cos\varphi\cos\beta_2 + \sin\varphi\sin\beta_2$$
$$\frac{\cos\beta_3}{\sin\varphi} = \cot\varphi\cos\beta_2 + \sin\beta_2,$$

tedy: $\cot\varphi = -\operatorname{tg}\beta_2 + \frac{n'_H - n'_B}{n_H - n_B} \cdot \frac{\cos\beta}{\sin\varphi \cdot \cos\beta_2}$;

β_2 je týž úhel, který jsme dříve označili písmenem γ. *)

§ 82. Hranoly průmohledné.


U hranolů, které průmohledními zovemee, je naopak odstraněna úchylka, ale podržena disperse. Hranol průmohledný sestavuje se kombinováním hranolů flintových F a korunových C, dva flintové jsou uprostřed a mezi ně se vkládají tři korunové (obr. 118.) Tři vnitřní hranoly jsou vždy pravoúhlé; vnější korunové mohou býti buď též pravoúhlé, nebo se jsou tupoúhlé.

Rozumí se samo sebou, že u hranolu průmohledného může jen jediný paprsek — na př. zelený — procházeti přímo — ostatní pak lámou se v jedné i druhé straně.

Takovéto hranoly připojují se k dalekohledům k účeli pozorování spektrálních u hvězd, vlasatic a pod., a mají tu výhodu, že se při tom hledí se směru přímo proti předmětu pozorovanému.

Obraze 118. ukazuje chod paprsků průmětlehým hranolem složeným ze 2 hranolů flintových a tří hranolů korunových.

ob. 118.



§83. Rozklad světla při lomu plochami sférickými. Aberrace chromatická čoček.

Délka ohnisková f čočky nekonečně nebo aspoň velice tenké jest dána výrazem:

$$f = \frac{1}{n-1} \cdot \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}.$$

Ve výrazu tomto přichází — mimo veličiny konstantní r_1, r_2 — též exponent lomu n a to v differenci $n-1$. V této značí 1 exponent lomu vzduchem, poněvadž je n exponentem relativním. Výraz $n-1$ značí tedy přebytek exponentu skla nad exponent vzduchem. Tento se však mění s qualitou světla. Z toho plyne, že délka ohnisková čočky není stejná pro světlo červené a fialové, že tedy každé barvě příslušní zvláštní ohnisko. Tak velké jsou změny v délce ohniskové pro různé druhy světelné, závisí onen na qualitě skla (neb vůbec materiálu), z něhož je čočka broušena. Při tom je pozoruhodna okolnost následující. Tak již jednou podotčeno, nejsou percentuální změny exponentu lomu n pro různé barvy tak značné — na nejvýš 5 procent.

Kde však nepřichází veličina n sama, nýbrž

$$n - 1,$$

a tu onen jsou percentuální změny tohoto rozdílu, tohoto přebytku nad 1, značně větší. Tak je na př. pro silné sklo flintové, jak již jednou uvedeno,

$$n_B = 1,741 \qquad n_H = 1,811$$

$$\text{difference} = 0,070 \text{ t.j. asi } 4\%;$$


naproti tomu $n_B - 1 = 0,741$ $n_H - 1 = 0,811$

$$\text{difference} = 0,070 \text{ t.j. skoro } 10\%.$$

Poněvadž se tedy výraz pro f řídí přebytkem lámavosti $n-1$ skla nad vzduch, tedy jsou také procentuální differencе v délce ohniskové f pro různé barvy téže velikosti, t.j. pro sklo flintové 9–10%, pro sklo korunové činí jen 4–5%, tedy asi polovičku.

Dopadají-li tudíž na čočku paprsky bílé rovnoběžně, t.j. z bodu velice vzdáleného, nesbíhají se v bodě jediném, nýbrž v celém pásmu bodů na ose ležících, z nichž ten je čočce nejbližší, ve kterém se sbíhají paprsky fialové, a ten je od čočky nejvzdálenější, ve kterém se sbíhají paprsky červené (obr. 119.) Tím se vysvětlují nikaz, kterýž zvláště při světle slunečním pěkně můžeme pozorovati. Zachytíme-li tyto paprsky na bílou stěnu před ohniskem (stěna I), obdržíme kruhy červeně lemované; naopak na bílé stěně za ohniskem (stěna II) kruhy modravě lemované.

ob. 119.



A jako paprsky parallelní, tak také paprsky bílého světla divergentní, t.j. od blízkého nějakého bodu svítícího vycházející nesbíhají se v jediném bodě, nýbrž následkem rozkladu světla při lomu sbíhají se paprsky každé barvy v bodě zvláštním.

A jde-li o obrazy bílých předmětů, vznikají pro každou barvu, kteráž ve světle bílém je obsažena, příslušné obrazy v různých vzdálenostech, následkem čehož, když se všechny na téže ploše zachytí a tím kryjí, vznikají pěkné barevné obrysy obrazu.

Pravíme, že čočky mají (vedle aberrace sférické) aberraci chromatickou. Tuto vadu čoček lze odstraniti, t.j. sestrojiti čočky achromatické.


Základem této možnosti jsou tytéž úvahy, které jsme učinili v příčině

zhotovení achromatického hranolu v § předcházejícím.

Mějmeť čočku bikonvexní ze skla korunového. Tato láme paprsky a zároveň je rozkládá, lámajíc paprsky fialové silněji než červené.

Tento rozklad můžeme kompensovati čočkou rozptylnou ze skla flintového, t.j. můžeme paprsky barevné přivésti do téhož směru. Při tom se ovšem také lom změní, ale nekompensuje se úplně proto, poněvadž sklo flintové poměrně silněji světlo rozkládá než je silněji láme v porovnání se sklem korunovým, tak že jistý lom ještě zůstává. Čočka achromatická v úpravě nejjednodušší je tedy ta, jak ji znázorňuje obr. 120. – Čočka flintová bývá často plankonkávní, její rovina bývá pak obrácena směrem k předmětu. (ku př. u mikroskopů)

obr. 120.



Čoček užívá se v optice při rozmanitých apparátech. Účelem jejich jest na místě jistého světlého předmětu substituovati jeho obraz, který čočkami vzniká. – Má-li obraz tento býti jen virtuálný, musí vzdálenost předmětu od čočky býti v mezích $0 \ldots f$, má-li býti reálný a zvětšený, musí tato vzdálenost býti v mezích $f \ldots 2f$; má-li konečně býti reálný a zmenšený, v mezích $2f \ldots \infty$. Obraz reálný je vždy obrácený, obraz virtuálný vždy přímý.

Ve všech těchto případech užívá se čoček achromatických, aby obraz byl prost barevných okrajů; zejména v některých případech (dalekohledy, dalnohledy) jest otázka achromasie pro výkonnost přístroje velice důležitou.

Jedny dávno známé čočky z bikonvexní velmi tenké, na př. korunová, optické mocnosti $\frac{1}{f}$, kteráž je dána jakožto součin

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right);$$

jeden faktor $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}$ odpovídající středové (druhými slovy) křivosti čočky jest nezávislý na zvolené světle; jiný faktor $n-1$ závisí, že čočka má pro každý exponent lomu jinou dálku ohniskovou.

Kombinujme čočku tuto z druhou II velmi tenkou jiného materiálu, na př. flintovou, pro niž je podobně $\frac{1}{f'} = (n'-1)\left(\frac{1}{r_3} + \frac{1}{r_4}\right)$.

Kombinace má optickou mohutnost $\frac{1}{F}$ rovnající se součtu mohutností čoček daných t.j. $\frac{1}{F} = \frac{1}{f} + \frac{1}{f'}$.

Tato kombinace by byla přímo achromatickou, kdyby výraz $\frac{1}{F}$ byl pro všechny barvy, t.j. délky vlny λ, tudíž i pro všechny exponenty n a n', kteréž jsou touto délkou podmíněny, konstantním.

Mathematicky se požadavek tento formuluje rovnicí:

$$\frac{\partial}{\partial \lambda}\frac{1}{F} = 0.$$

Provedení differenciace vedlo by k výrazům:

$$\frac{\partial n}{\partial \lambda}, \quad \frac{\partial n'}{\partial \lambda};$$

i musila by závislost exponentů n a n' na λ býti známou, musila by rovnice býti vyjádřena, aby se pak naznačené differenciace daly provésti.

Rovnic takové bývají však velmi zřídka známy – neboť pro závislost exponentu lomu na délce vlny existují jen empirické rovnice – více méně theorií odůvodňující – jichž konstanty lze počítati jen na základě četných měření exponentu lomu, na př. pro různé čáry Fraunhoferovy, methodou nejmenších čtverců, tedy způsobem dosti otěžným.

Takovou rovnicí je na př. Cauchyho $n = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4} + \ldots$.

Pro účely naše postačí problém restringovati, a sice podobným způsobem jako se stalo pro hranoly achromatické.

Postačí totiž žádati, aby výraz $\frac{1}{F}$

byl identický pro krajní spektra, na př. pro čáry Fraunhoferovy B a H, tedy aby bylo $\frac{1}{F_B} = \frac{1}{F_H}$

čili $$\frac{1}{F_K} - \frac{1}{F_B} = 0.$$

Jest však: $$\frac{1}{F_B} = (n_B - 1)\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right) + (n'_B - 1)\left(\frac{1}{r_3} + \frac{1}{r_4}\right)$$

$$\frac{1}{F_K} = (n_K - 1)\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right) + (n'_K - 1)\left(\frac{1}{r_3} + \frac{1}{r_4}\right)$$

Odečteme-li tedy obě rovnice, obdržíme:

$$0 = (n_K - n_B)\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right) + (n'_K - n'_B)\left(\frac{1}{r_3} + \frac{1}{r_4}\right),$$

a z toho jakožto formulaci hořejší podmínky:

$$\frac{\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}}{\frac{1}{r_3} + \frac{1}{r_4}} = -\frac{n'_K - n'_B}{n_K - n_B}.$$

Podmínka achromasie v hořejším (rostlinovaném) smyslu stanoví tedy, v jakém poměru má býti summární křivost $\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right)$ a $\left(\frac{1}{r_3} + \frac{1}{r_4}\right)$ jedné a druhé čočky. Znamení – ukazuje, že je-li jedna čočka pozitivní (sběrnou), musí druhá býti negativní (rozptylnou). Místo zakřivení summárního vzorem se může bráti (s koefficientem $\frac{1}{2}$) zakřivení středové. Rovnici lze vyhověti na nekonečně rozmanitý způsob – neboť disponujeme čtyřmi veličinami r_1, r_2, r_3, r_4. Obyčejně se volívá

$$r_2 = r_3 \text{ (numericky)},$$

t. j. stanoví se, aby čočky přiléhaly k sobě těsně. Pak se stmelí kanadským balsámem. Tím disponujeme pak ještě třemi veličinami.

Lze tedy dále stanoviti, jakou dálku ohniskovou má míti kombinace obou čoček – čili kolik dioptrií $\frac{1}{F}$ má býti optická mohutnost kombinace.

Pak zbývají ještě 2 veličiny.

Můžeme tedy na př. r_1

volíti a pak r_4, anebo stanoviti poměr mezi jednotlivými poloměry atd.

Tato veliká volnost disposice má oproti svůj původ právě v tom,

že řešení jest jen approximativním, a mimo to, že zanedbáváme tloušťku čoček, považujeme tedy čočky za nekonečně tenké.

Nejlépe se věc objasní příkladem konkrétním.

Příklad. Budiž dán materiál:

	Korunové sklo.	Flintové sklo.
B)	$n = 1{,}5258$	$n = 1{,}6277$
H)	$n = 1{,}5465$	$n = 1{,}6710$
	difference $= 0{,}0207$	$= 0{,}0433$,

poměr $= \frac{207}{433}$.

Kombinace nechť má dvě dioptrie, tedy

$$\frac{1}{F} = 2$$

$$F = \frac{1}{2}\ m.$$

Podmínka achromasie stanoví poměr summárních křivostí obou ploch u jedné i druhé čočky. Zavedeme, což je pro počet pohodlné, faktor proporcionality k, vzorem neznámý.

$$\text{čočka I}: \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} = 433 \times k$$

$$\text{čočka II}: \frac{1}{r_3} + \frac{1}{r_4} = -207 \times k$$

Má-li kombinace míti určitou optickou mohutnost, na př. jak řečeno $\frac{1}{F} = 2$ čili $F = \frac{1}{2}$ metru (počet tedy provedeme v metrech), musí pro světlo na př. červené býti:

$$0{,}5258 \times 433 \times k - 0{,}6277 \times 207 \times k = 2.$$

Touto rovnicí je pak určen faktor proporcionality k.

Vychází:

$$227{,}6714\,k - 129{,}9339\,k = 2$$

$$97{,}7375 \times k = 2$$

$$k = 0{,}0205.$$

Čím jest nyní určena:

summární křivost čočky I i čočky II.

Musí tedy býti: u čočky I : $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} = 8{,}698$

u čočky II : $\frac{1}{r_3} + \frac{1}{r_4} = -4{,}235.$

Až dosud byl veden počet zcela všeobecně; vidíme, co podmínka achromasie-pří dané dále skleněné čočky achromatické – předpisuje, a co dále jest zůstaveno volbě libovolné. Klademe: $r_3 = r_2$,

a volme dále: $r_1 = 2r_2$

(Müllner, optika, str. 260, týž příklad).

Dva je rovnice pro nás ihned dán poloměr r_1. Neboť jest:

$$\frac{1}{r_1} + \frac{2}{r_2} + \frac{3}{r_2} = 8{,}698;$$

z toho: $\underline{r_1 = 0{,}339}$,

tudíž dále $\underline{r_2 = 0{,}169}$;

čočka I jest tím dána.

Pro ni musí býti: $\frac{1}{r_3} + \frac{1}{r_4} = -4{,}235;$


čočka II musí tedy býti negativní. Má-li těsně přiléhati k první, musí $r_3 = r_2$, ale znamení zde – a první plochy – nutno bráti záporně, poněvadž musíme vždy přihlížeti k typické čočce Fraunhoferově.

Jest tedy: $\underline{r_3 = -0{,}169.}$

Z toho pak plyne: $\frac{1}{r_4} = \frac{1}{0{,}169} - 4{,}235,$

což dává $\underline{r_4 = +0{,}598.}$

Čočka je tedy zde pozitivně zakřivená, t.j. jako první – tedy je konvexkonkávní.



ob. 121.

Jest viděti, jak by se počet vedl, kdyby na př. čočka I konvexní byla dána a měla se k ní hledati kompenzující a těsně k ní přiléhající čočka flintová, aby celek byl achromatický. Faktor k byl by čočkou první ihned dán;

a rychle by se musil poloměr r_4 zbývající pro druhou.

Volnost disposice je však jenom proto tak veliká, že přestáváme na výrazu $n = A + \frac{B}{\lambda^2}$;

kdybychom přibrali ještě člen $\frac{C}{\lambda^4}$, tedy by základní rovnice achromasie dala dvě podmínečné rovnice, čímž by volnost disposice v jedné veličině byla zmenšena. *)

§ 84. Experimenty o rozkládání a skládání světla bílého.

Při experimentech, kterýž lze provádětí o rozkládání a skládání světla bílého, a kterýž v podstatě provedl a popsal ve své optice již I. Newton, lze s výhodou užívati jak hranolů přímohledných tak achromatických, čímž se často dosáhne pohodlnějšího uspořádání anebo variace pokusů.

1.) Barvy spektrální se dále již hranolem nerozkládají, nýbrž jen uchylují a to tím více, čím blíže jsou ve spektru straně fialové. Velmi pěkně dokáže se tato věta dvěma stejnými hranoly flintovými lámavého úhlu asi 30°, z nichž jeden se postaví vertikálně rovnoběžně s vertikální štěrbinou, druhý hned za ním horizontálně. Spektrum prvním hranolem vytvořené uchýlí se druhým vzhůru, ale nerozloží se nijak, jenom že se rozestře pod úhlem 45°, minimum uchýlky u obou hranolů předpokládajíce. Tímto experimentem se zároveň dokáže, že příčinou spektra je různá lámavost barev.

2.) Experimentum crucis (Newton). Připraví se dvě štěrbiny vertikální, dvěma stejnými hranoly vertikálními vytvoří se spektra opačně rozložená tak, aby padla na sebe. Barvy se míchají; neboť na červený konec jednoho spektra padá fialový druhého a naopak. Když se nyní na tento barevný pružek díváme hranolem horizontálně postaveným, objeví se obě spektra uchýlená, ale tak, že kříží jsou před sebe. Výhodně béře se za tento horizontální hranol místo obyčejného přímohledný, pak celý jev zůstane v téže poloze, ale obě spektra tvoří přes sebe kříž.

3.) Barevné papisky vycházejíce z hranolu dají se zase složiti, čímž vzniká opět barva bílá. Experiment provádí se výhradně hranolem půmolledným s čočkou cylindrickou, která se za hranol postaví, aby na stínítku barvy spektrální se stálby – složily – v bílý puch.

4.) Je-li za čočkou cylindrickou, ne daleko od ohniska, malý navonký hranolek malého úhlu lámavého, lze jím některé papisky odchýliti stranou, tím vznikne na stínítku barevný puch zvláštní následkem čehož onen dřívější bílý se též zbarví; neboť do světla bílého ona barva splývá, ponévadž pak obě barvy by dohromady dávaly bílou, zovou se komplementálními. Způsobem tímto lze velmi pěkně předvésti celou řadu barev komplementálních v nepřetržité posloupnosti.

5.) Také dvěma stejnými hranoly lze ukázati, že spektrum jedním hranolem vznikající připojením druhého protivně působícího se skládá v barvu bílou.

6.) Této skládání, jak dosud bylo popsáno, je fysikální; barvy padnou fakticky na sebe a v oku vzniká dojem barvy bílé. Totiž lze i fysiologicky ukázati na základě trvání dojmu zrakového, kde tedy barvy zůstávají rozložením a jenom v oku se skládají.

K tomu cíli slouží rotační apparát s horizontální rotační osou. Do něho vloží se půmoledný hranol tak postavený, aby červená barva byla vyměšována a ostatní barvy spektra aby se nchylovaly.

Když se tento hranol otáčí, zůstává červená barva na svém místě na stínítku, ostatní barvy se otáčejí sprchu, vznikne tedy barevná deska s kruhovým rozvrstvením barev spektrálních.

K tomuto hranolu půmoledném připojí se ještě achromatický. Lámavé hrany obou mohou pak býti buď rovnoběžné nebo kolmé.

Při postavení rovnoběžném vzniká na stínítku opět barevná deska, jenom že jiného průměru než dříve dle toho, působí-li oba hranoly co do vychýlky summačně nebo differenčně.

Zajímavé úkazy vznikají, při vzájemném postavení kolmém. Spektrum se táhne po čáře kolmé, se žlutou a otáčí; tudíž padnou barvy

z největší části při otáčení na sebe a dávají pak proužek bílý. Pěkné jsou přechody v blízkosti postavení kolmého lámavých hran buď na jednu nebo druhou stranu.

7.) Hranol jehlancový, na př. čtyřbokový, dává čtyři spektra, hranol kuželový překrývané spektrum kruhové.

8.) Experimenty o skládání barev na základě fysiologickém lze též provádětí kotouči o barevných sektorv. Velmi dobře hodí se k tomu kotouče průsvitné se gelatiny na projekci. Pokusy lze uspořádati se velké jednoduchosti.

V. Optické stroje.

§85. Komora temná.

(Camera obscura.)

Komory temné užívá se hlavně ve fotografii. Nejdůležitější součástkou z objektiv, jehož vzdálenost lze relativně vzhledem k zadní stěně komory měniti. Zadní stěna bývá z mléčného skla, kde vzniká reálný převrácený obraz předmětu. Přístroje, které nemají takové desky, opatřeny jsou druhou menší čočkou, která orientuje fotografa o tom, jak obraz vypadne (hledáč).

Fotografický objektiv má míti následující vlastnosti:

1.) Musí býti achromatický a to tak, aby papisky chemicky nejúčinnější (tedy kolem H čáry Fraunhoferovy) a pak papisky nejjasnější (kolem D čáry) byly bezpečně vyjeknými.

2.) Musí co možná světla propouštěti.

3.) Nesmí míti vadu sférickou (nesmí skreslovati).

4.) Obrázek vytvořený musí býti všude stejnoměrně ostrý a přirozený (orthoskopický).

5.) Nesmí míti působivých vnitřních odrazů.

6.) Má míti velikou hloubku ohniska — t. j. kresliti předměty za sebou ležící v jedné rovině.


prohlížecí

§86. Komora světlá.

(Camera lucida).

Komora světlá (Wollaston) je čtyřboký hranol $ABCD$, při A pravoúhlý, při C 135 stupňový, při B a D 67,5 stupňový.

Obr. 122.




Paprsky z P vycházející odrážejí se totálně na plochách DC a CB a vycházejí normálně plochou AB do oka pozorovatele V, který vidí obraz P v Q.

Plocha AB zakrytá je diafragmatem, jelikož stroj hrana B půlí, takže pozorovatel vidí jednak hranolem obraz Q a jednak přímo plochu nákresnou. Z pravidla bývá předmět v daleko větší vzdálenosti od oka než plocha nákresná, následkem čehož oko akkomodováno na velkou vzdálenost nevidí jasně papír, na který se kreslí. Tomu odpovídá se dvojím způsobem, buďto (a to je výhodné pro zrak normální) klade se pod hranol čočka spojná (a) tak postavenou, aby rovina nákresná byla v její ohnisku, čímž se rovina nákresná optickky posune do velké vzdálenosti, na niž oko je akkomodováno, nebo se v cestu paprsků od předmětu přicházejících postaví čočka rozptylná (b) (t. j. zase výhodné pro krátkozraké), čímž se optickky předmět přiblíží do vzdálenosti roviny nákresné od oka.

§87. Hadleyův sextant (1731).

Přístrojem tímto se měří úhlová vzdálenost dvou vzdálených objektů; má podobu kruhového sektoru, jehož oblouk jest dělen, po tomto oblouku lze pohybovati pravítkem AC, které je v A spatřeno zrcátkem, jež s pravítkem je pevně spojeno. Vedle toho je v B jiné zrcátko z poloviny průhledné, které pevně s přístrojem souvisí. Dalekohledem D lze spatřiti předmět C přímo, předmět P nepřímo po dvojím obrazu při A a při B.

Obr. 123.



Splývají-li oba obrazy, pak úhel obou zrcátek PA a QB je patrně roven dvojnásobnému úhlu, o který bylo pravítko AC do této polohy otočeno z polohy, v níž obě zrcátka byla rovnoběžna. Tato poloha bývá zároveň počátkem (nulou) dělení, které je provedeno v půl-stupně; tyto se pak odčítají jako celé, čímž odpadá násobení dvěma. Rovnoběžnost zrcátek čili poloha nulová kontroluje se pozorováním předmětu nekonečně vzdáleného.

§88. Horizontální a vertikální apparát projekční.


Podstatnou částí všech apparatů projekčních je achromatická čočka dostatečně optická, silná, která dává reálné a zvětšené obrazy daných předmětů. Tyto předměty kladou se do kužele paprsků, který vzniká čočkou osvětlovací, t. zv. polní, dávající totiž optické pole. Paprsky konvergují na to místo, kde je projekční čočka, následkem čehož může tato býti malého průřezu a přece zobrazuje celé pole i s předměty v něm se nalézajícími. Okolnost tato je důležita, poněvadž čočky achromatické velkého průřezu jsou velmi drahé.

Zdrojem světelným je nejlépe světlo slunečné, které je výhodno soustřediti pomocnou čočkou do bodu, od něhož teprve paprsky dopadají na čočku polní. Světlo elektrické i Drummondské vychází již samo sebou divergentně od takového bodového místa.


Podle toho, zda-li jde o předměty vertikálně neb horizontálně rozložené, sestrojují se buď horizontální neb vertikální apparaty projekční. Obr. 124, 125, 126, 127 podávají schematické jich uspořádání jakož i pohled perspektivní.

U horizontálních apparátů projekčních nastává často okolnost, že obrazy jsou obrácené. Ke vůli je možno mnohdy je přímými obrácením předmětu — u diagrammů, fotografií atd., to sice jde, ale při projekci na př. nákresů

ob. 124.




ob. 125.




kapilárních, elektrolytických
atd. to ovšem možno není. V případech
takovýchto lze však užíti zvláštního
pravoúhlého hranolu reflexního,
kterým se pak obraz na stěně obrátí,
ovšem na úkor světlosti, poněvadž
mnoho světla četnými reflexy
se ztrácí. Také předměty neprů-
hledné lze promítati, když se
osvětlí silně na odraz.

ob. 126.



osvětlí silně
na odraz.


ob. 127.



§89. Jednoduchý mikroskop (lupa.)

Každé poněkud silnější spojné čočky lze při pozorování subjektivním užíti ku zvětšení pozorovaného předmětu, jako se užívá v projekčních appa-
rátech ke zvětšení při pozorování objektivním. Tamo je obraz objektivní
reálný, zde je obraz naopak subjektivní virtuální. Předmět AA' (ob. 128)
musí tedy býti mezi čočkou a
jejím ohniskem F v jisté od čočky
vzdálenosti $OA = a$, načež vznikne
virtuální obraz BB' ve vzdále-
nosti $OB = b$. Pro zvětšení
$\frac{BB'}{AA'}$ plyne z trojúhelníků
OAA' a OBB'.

ob. 128.



$$\frac{BB'}{AA'} = \frac{b}{a},$$

anebo z trojúhelníků FOM a FBB'

$$\frac{BB'}{AA'} = \frac{b+f}{f} = \frac{b}{f} + 1.$$


Poslední výraz je pohodlnější, poněvadž obsahuje na místě a dálku
ohniskovou f, která bývá známá.

Závisí tedy zvětšení především na dálce ohniskové f čočky, ale také
na vzdálenosti b; tato vzdálenost je předpokládající, že máme oko těsně
u lupy — dálka zřetelného vidění; tatáž lupa zvětšuje tudíž daleko-
zrakému více než krátkozrakému; pro oko normální je b asi 25 cm.
Poněvadž tedy veličina b pro určité oko je dána a nikdy ne mnoho se
mění, je možno velkého zvětšení docíliti malou dálkou ohniskovou f,
t. j. velmi silnou zakřivenou čočkou. Poněvadž by však v tomto případě
byla aberrace sférická značnou, kombinují se raději dvě slabší čočky za sebou
anebo i více jich, mezi ně vkládají se diafragmata k tomu účelu, aby
jen paprsky centrální čočkami procházely, aby tedy aberrace sférická byla

redukována na minimum. Složené lupy tohoto způsobu zovou se často doublety (dle francouzského double - dvojí).

Zvláštními lupami jednoduchými jsou lupy válcové, jichž průřezy ukazuje obr. 129.

obr. 129.




Lupa Sanhopeova (a) zamezuje vadu sférickou tím, že klademe k předmětu stranu, která je jen nepatrně zakřivena; křivější plocha přibližuje se k oku. Vadou této lupy je okolnost, že lupa musí býti velmi blízko k předmětu přiblížena — někdy předmět přímo na lupě leží.

Druhé dvě formy mikroskopu jednoduchého jsou lupy Caddingtonova (b) a Brewsterova (c), jichž obě plochy křivé náležejí téže ploše sférické. — Vybroušením hlubokého žlábku a vyplněním tohoto nějakou látkou nepůlkulovou docílíme se toho, že k platnosti přicházejí ponze paprsky centrální.

Základní myšlenka těchto lup pochází od Wollastona, který navrhoval slepiti dvě polokulové čočky rovinnými plochami na tenkou destičku obsahující malý otvor kruhový jako diafragma. Liší tedy mezi „doublety" uvésti především doublet Wollastonův.

Výtečný doublet Pritchardův docílíme až 300 násobného zvětšení.

Mimo doublet Chevalierův budiž ještě zmíněn aplanatický triplet Steinheilův, jehož průřez ukazuje obr. 130. Je složen ze dvou konvexkonkávních sběrných čoček flintových, obklopujících těsně konvexní čočku ze skla korunového, jejíž zakřivení je asi 2 krát takové jako vnější zakřivení lupy. Lupa tato vyniká čistotou obrazu a velikostí zorného pole.




obr. 130.

§ 90. Mikroskop složený.

Důležitý tento stroj — který se též mikroskopem vůbec (v užším slova smyslu) zove, dává veliké zvětšení kombinováním dvou čoček na téže ose. Jedna z nich ku předmětu obrácená, t. zv. objektiv dává zvětšený reálný obraz předmětu. Druhá k oku obrácená, t. zv. okulár, dává opět zvětšený, ale virtuálný obraz onoho obrazu reálného. Úhrnné zvětšení je tedy součinem obojího jednotlivého zvětšení, jednak již zvětšení objektivem, jednak zvětšení okulárem.

Schematický jeví se tedy uspořádání mikroskopu a postup paprsků pro bod charakteristických tak, jak obr. 131. ukazuje.

obr. 131.



Aby zvětšení mikroskopu bylo co možná veliké, je žádoucno, aby byl objektiv silným, t. j. malé délky ohniskové. Je-li takový určitý objektiv dán, pak závisí zvětšení též, na tom, jak blízko dáme předmět A A' k ohnisku F.


Dáme-li jej blíže, vznikne obraz reálný B B' větší, ale vzdálenější také ve větší vzdálenosti O B' — tak že pak by mikroskop musil býti delším. Z důvodů na mnohé ležících praktických —, aby se stroj pohodlněji dal ovládati — není žádoucno, aby byl příliš dlouhý; proto se vedá tímto způsobem zvětšení stupňovati vždy až do těch mezí, které jsou délkou podmíněny. Ostatně není také z jiných ještě důvodů radno jíti s předmětem příliš blízko k ohnisku F objektivu; neboť nebude v nejbližší blízkosti k ohnisku tomuto dělá nejmenší variace v poloze předmětu již velice mnoho v poloze obrazu, jelikož vzdálenost B' se pak zvětšuje rapidně s ubývající vzdáleností a. Uvážíme-li, že každý předmět mikroskopický má jistou tloušťku, třebas i malou, tedy by v příliš blízkosti k ohnisku F obraz přední plochy a obraz zadní plochy předmětu byly značně od sebe vzdáleny.

Délka stroje volí se tedy z důvodů zmíněných malá. Pak musí zvětšení se docíliti silným objektivem. Jedna čočka musila by tu býti velmi silně zakřivena, což by

nebo za následek silnou aberaci sférickou.

Objektivem je tedy vždy čočka složená a na mnoze užívá se tří doubletů, z nichž každý obsahuje konvexní čočku bikonvexní, k níž přilíhá plankonkávní čočka ze skla flintového. Systém je tak uspořádán, aby centrální paprsky byly achromatisovány. Všechny doublety jsou obráceny rovinnými plochami k předmětu, doublet s nejmenší dálkou ohniskovou je předmětu nejblíže, diaphragma jeho je také nejmenší.


Podobně jest okulár složen obyčejně ze dvou čoček v té formě, jež je známa pod jménem okuláru Huygensova neb Campanihо. Schematicky ukazuje okulár tento obr. 132.



ob. 132.

Skládá se ze dvou čoček plankonvexních 1) a 2), z nichž 1) má třikrát tak velkou ohniskovou dálku jako 2.) Vzdálenost obou čoček je dána rozdílem jich ohniskových vzdáleností. Okulár je tak postaven, že by reálný obraz objektivem utvořený vznikl v CC'_1, čočka 1) však změní a posune tento obraz do DD_1, kde se potom lupou 2) pozoruje. Výhoda okuláru spočívá ve větší jasnosti obrazu.

Někdy zvláště při quantitativních měřeních — užívá se okuláru Ramsdenova, jehož schema ukazuje obr. 133.



ob. 133.

Obě čočky plankonvexní, z nichž se také tento okulár skládá, mají tutéž ohniskovou vzdálenost a jsou postaveny tak, že jich vzdálenost 1) 2) se rovná dvě třetinám společné ohniskové dálky.


Podmínka achromasie vyžadovala by sice, aby tato

vzdálenost byla právě společná ohnisková dálka, avšak v tom případě by každý prášek na čočce 1), každá její nejmenší nepravidelnost působila nepříznivě na čistotu obrazu, ponévadž právě 1) by byla v ohnisku čočky 2).

Znamenitými okuláry jsou Abbého aprochromatty čili okuláry kompenzační, tak nazvané proto, že se jimi vady objektivu opravují, kompenzují.

Předmět, který mikroskopem pozorujeme, musí býti náležitě osvětlen, nebo, neboť kolikanásobné je zvětšení, tolikrát je menší intensita osvětlení. Osvětlení předmětu, jenž pro nepatrné své rozměry ve směru vertikálném je vždy průhledný, děje se ze zdola buď pouze silným zrcátkem, jež lze přiměřeně otáčeti anebo zrcátkem ve spojení se silnými čočkami sběracími.

Předmět pro pozorování mikroskopické upravuje se v preparát mikroskopický tím, že se klade na podložní sklíčko a přikrývá tenkým sklíčkem menším, které se na okraji přilepuje kanadským balzámem. Toto sklíčko krycí má nemilou vadu, záležející v tom, že loncem papsrky přestávají býti homocentrickými, jak v tom poučuje obr. 134. Pozorovatel místo obrazu bod A vidí body A', A'', atd.



ob. 134.

Této vadě odpomáhají mikroskopy s tak zvanou immerzí.

Při těchto mikroskopech ponoří se objektiv do kapky vody nebo do jiné vhodné kapaliny, která na krycím sklíčku spočívá. Abbé odporučuje olej dřeva cedrového, který má téměř tutéž index lomu jako krycí sklíčko — tím ovšem papsrky z A vycházející vcházejí beze změny směru neb intensity do objektivu, který může býti opatřen většími diaphragmaty než při stejných bez immerse.

Zvětšení mikroskopu nestanoví se nikdy počtem, nýbrž pokusem. Methoda nejschodnější je následující. Pod objektiv dá se horizontálně měřítko na skle, na př. milimetr rozdělený na desetiny nebo setiny; vedle mikroskopu postaví se pak vertikálně měřítko obyčejné dobře znatelné a sice do vzdálenosti 25 cm — do dálky zřetelného vidění. V mikroskopu

vidíme tedy dělení zvětšené, po straně je pak dělení původní. Jedná se nyní jen o to, obě měřítka dostati jakési vedle sebe, abychom je mohli srovnávati. To se děje umístěním malinkého zrcátka naklněného v úhlu 45° na okuláru anebo ještě lépe malým totálně reflektujícím pravoúhlým hranolem. Oko zírající do tohoto zrcátka neb hranolu a současně vedle di mikroskopu vidí zrcadlením měřítko původní a vedle něho měřítko zvětšené.

E. Abbe a H. Helmholtz udávají nejzazší meze mikroskopického zvětšování dané difrakcí čili ohybem světla (o kterém jedná optika theoretická), dle nichž nejmenší viditelná vzdálenost při obyčejném mikroskopu činí $\frac{1}{3636}$ mm, při mikroskopu s immersí $\frac{1}{3313}$ mm, dle Dippela $\frac{1}{3500}$ mm.

Ze zvláštních mikroskopů mediem budtež mikroskopy binokulární, jež při jedném objektivu mají dva okuláry, tak že lze pozorovati oběma očima.

Nejlepšími mikroskopy bez immerse dosahuje se zvětšení lineárního až 1500, s immersí lze prý mouti tyto meze až přes dvojnásobné, tedy na zvětšení přes 3000.

§ 91. Dalekohledy.

Princip dalekohledu je velmi jednoduchý. Chtějíce pozorovati velice vzdálený předmět, pozorujeme na místě něho blízký reálný jeho obraz, který sobě zjednáme buď zrcadlem neb čočkou. Poněvadž pak tento obraz za příčinou veliké vzdálenosti předmětu je velice malý, zvětšujeme si jej lupou, tak aby zvětšený obraz vznikl v dálce jasného vidění.

Máme tedy dvojí druh dalekohledů (teleskopů).

První jsou katoptrické. Obraz vzdáleného předmětu vzniká dutým zrcadlem.


Druhé jsou dioptrické. Obraz vzdáleného předmětu vzniká čočkou.

Dalekohledy katoptrické jsou pak též bývají reflektory, podobně jako se dioptrické nazývají refraktory.

§ 92. Reflektor Newtonův (1663).

Obraz velice vzdáleného předmětu, který dává zrcadlo umístěné na konci dalekohledné trubice, vznikl by uprostřed dalekohledu a nemohl by tudíž býti pozorován. Proto se paprsky sbíhají (obr. 135.) malým rovinným zrcátkem šikmo v úhlu 45° postaveném na bok dalekohledu, tak že se sbíhají a dávají obraz po straně; na obraz tento se pak dívá pozorovatel okulárem, t.j. lupou. Malé ono zrcátko zadržuje ovšem některé z paprsků, které od vzdáleného předmětu dopadají do dalekohledu, ale to nevadí, poněvadž průměr dutého zrcadla je proti rozměrům onoho malého zrcátka velmi veliký.

obr. 135.





§ 93. Reflektor Gregory-ho (1663) (obr. 136, 137).

Jest ve své konstrukci komplikovanější než předcházející. Paprsky od zrcadla hlavního odražené sbíhají se a dávají malý reálný a obrácený obrázek vzdáleného předmětu; tento obrázek je zase předmětem malému dutému zrcátku, které je pootočitelné a které se umístí tak, aby tento obrázek přišel před jeho ohniskovou čárou vznikne druhý zvětšený reálný a obrácený tudíž vzhledem k hlavnímu předmětu přímý — obrázek a na tento teprve dívá se pozorovatel lupou.

K tomu cíli je hlavní zrcadlo uprostřed provrtáno.

obr. 136.





ob. 137.

Okulár pám je pevný, ale malé ono zrádko je posunutelné šroubem mikrometrickým.


Obr. 137. ukazuje takový reflektor montovaný. Že ihned patrno, že jest – (proti dalekohledu Newtonovu) – konstrukce výhodnější, poněvadž pozorovatel se dívá v týž směr, ve kterém je předmět.

§ 94. Reflektor Cassegrain-ův (1672).

Podobá se předešlému; jen že na místě malého zrcádka konkávního je zrcádko konvexní, ale tak postavené, že by hlavní obrázek vznikl ovšem za ním; dříve tedy než vznikne, odrážejí se paprsky a dávají obraz zvětšený, na který se pozorovatel dívá okulárem.

Uložení tohoto dalekohledu je pěkným příkladem k tomu,


ob. 138. a).



co dříve o „virtuálních předmětech" u zrcadel bylo uvedeno.

V skutku je zde pro malé konvexní zrcádko předmět virtuálním, poněvadž se paprsky předmětové teprve za zrcadlem sbíhají; aby vznikl obraz reálný,

ob. 138. b)




musí onen virtuální předmět padnouti mezi zrcadlo a ohnisko jeho.

Budiž provedeno tím, co dříve se zrcadel uvedeno při konstrukcích na základě novější geometrie. Přesné provedení konstrukce obvyklými paprsky veleúzkým středem a ohniskem zrcadel ukazuje obr. 128, a), b). *)

§ 95. Reflektor Herschelův (1795).

Hlavní zrcadlo je u tohoto poměrně nejnovějšího a nejlepšího reflektoru poněkud nakloněno, tak že jeho osa tvoří s osou dalekohledu jistý nikoli úhel; obrázek vzdáleného předmětu vznikne tedy (obr. 139) na kraji trubice dalekohledné tam, kde s předním stroun vnikají paprsky od vzdáleného předmětu; tento obrázek se pak direktně pozoruje okulárem.

ob. 139.




Při tomto uspořádání zaclání se ovšem pozorovatel hlavou; avšak to zde nevadí proto, poněvadž průměr zrcadla bývá vždy velmi veliký, tak že malé toto zacláněn bývá nikdy nikdy. Za to však má tento dalekohled tu výhodu, že se centrální část zrcadla, – právě ta, která je opticky nejcennější – nemusí provrtávati, jako je tomu u obou systémů předcházejících.

Největší dalekohled, který William Herschel (1738–1822) zhotoval, měl délku 12 m, průměr téměř 1½ m; jím objevil nové dva satellity Saturna a učil dobu jeho rotace, mimo to pozoroval četné dvojhvězdy. Rozměry jeho dalekohledu překonal daleko lord William Rosse (1800–1867); jehož reflektor byl 16 3/4 m dlouhý a měl 1,83 metru v průměru; zrcadlo takové vážilo 3800 kg, trubice dalekohledné 6600 kg. Obrovským tímto dalekohledem studoval hlavně mlhoviny.


§ 96. Reflektor astronomický (Keplerův).

Objektiv (achromatický) dává reálný, obrácený obrázek vzdáleného předmětu; na obrazek tento díváme se okulárem jakožto lupou; obraz zůstává tudíž obráceným (obr. 140 a 141).

ob. 140.



ob. 141.




Při pozorováních astronomických neradí tato okolnost nikterak; díváme-li se na př. na měsíc v meridianu, vidíme severní kraj dole a jižní nahoře, podobně západní kraj na levo a východní na pravo; z této příčiny kreslívají se také jižní mapy měsíce nikoliv tak, jak jej vidíme okem prostým, nýbrž jak jej vidíme dalekohledem. Ve zřídlech umělých upraví se podobné mapy jednotlivých souhvězdí, aby poloha hvězd jednotlivých byla taková, jaká se jeví při pozorováních teleskopických.

Dalekohledu tohoto užívá se též při pozorováních fysikálních k odečítání na př. teploměrů, přístrojů atd. – V těchto případech mívá na tom místě, na kterém reálný obraz vznikne, tak zv. „nitkový kříž“, totiž válcový kovový rámeček, na kterém jsou napjaty vlákna kokonová anebo nitky pavučinové. V okuláru je pak viděti obraz předmětu a současně v téže rovině obraz nitkového kříže; nitkou horizontální – anebo vertikální – označuje se pak přesně určitý dílec předmětu.

Podobně bývá zařízen dalekohled u všech strojů, dělením opatřených, jako theodolitů, spektrometrů atd.

ob. 148.



Tak z trojúhelníka OBB' vyvítá, že zvětšení, velmi přibližně v poměru $= \frac{F}{f}$, kdež je F délka ohniskové objektivu a f délka ohniskové okuláru. Výraz je přibližný, poněvadž obraz BB' padne sice velmi blízko k ohnisku objektivu – odchylka vůči velké délce ohniskové není procentuálně velká – ale ne tak těsně k ohnisku okuláru, mimo to měříme úhly, na místo jich tangent.

Výraz $\frac{F}{f}$ udává zvětšení dalekohledu.

§ 97. Refraktor terrestrický.


Pro účely praktického života nebylo by vhodné míti dalekohled, který by dával obrácené obrazy pozorovaných předmětů, jako to činí dalekohled astronomický. Tomu lze však odpomoci velmi jednoduše tím, že se reálný obraz, který dává objektiv, jistou střední čočkou obrátí, a teprve tento obrácený – a tudíž vzhledem k předmětu pozorovanému přímý reálný obraz, že se

okulárem pozoruje. Často počítá se tato střední čočka také k „okuláru“ a pak jmenuje se takovýto okulár specielně „terestrickým.“ Tak náleží na př. každý větší dalekohled astronomický vedle obyčejných různě silných okulárů také okulár terestrický, tak že se pak jednoduchou výměnou dá dalekohled přizpůsobiti ku pozorování předmětů na zemi.


§ 98. Refraktor Galileův. (Hollandský).

U nejstaršího tohoto dalekohledu, jehož vynalezení se datuje z prvních let století sedmnáctého, nevznikne vůbec reálný obraz předmětu pozorovaného objektivem; neboť paprsky dříve než se protínají, zachytí se čočkou rozptylnou a jsouce před tím konvergentními stávají se lomem divergentními; následkem toho dávají jen v prodloužení svém obraz, který je tudíž virtuální a přímý (obr. 143).

ob. 143.



ob. 144.




Dle toho systému bývají upravovány dalekohledy polní, kukátka divadelní — obyčejně kinokulární — a pod. Jich délka může zde býti velmi malá (obr. 144).

Poněvadž tedy u tohoto dalekohledu obraz reálný vůbec nevznikne, proto nemůže tento dalekohled býti opatřen nitkovým křížem jako dalekohled astronomický neb terestrický.

[* Dalekohled tento dává pěkný příklad k tomu, co jsme dříve o času pravili o virtuálních předmětech u čoček jednajících a konstrukci na základě novější geometrie.

Je-li okulárem jeho předmět geometrickým, poněvadž paprsky na čočku dopadající konvergují k bodu B' (obr. 145.) Kdyby tento bod byl k čočce blíže než ohnisko, tedy by paprsky lámající se zůstaly konvergentními, ač méně než při dopadu, a vznikl by pak obraz reálný ve směru paprsků postupujících.

ob. 145.



Zde však má vzniknouti obraz virtuální ve zpátečním prodloužení paprsků; proto musí bod B' býti dále od čočky vzdálen než je její délka ohnisková. V obr. 145. je konstrukce obvyklými paprsky středem optickým a ohniskem vedenými přesně provedena. *]

§ 99. Paralleta mezi reflektory a refraktory.

Obrazy vznikající odrazem paprsků na zrcadlech sférických mají před obrazy, kteréž čočkami vznikají, důležitou předností, že jsou přísně achromatickými. Proto byly reflektory oblíbenějšími ve století předešlém proti refraktorům, dokud technika optická nedovedla bronziti čočky dostatečně achromatické. V dobách našich nabyly refraktory velmi nad reflektory. Příčina toho jest jednak ta okolnost, že moderní technika v bronzení čoček učinila pokroky skvělé, tak že otázka čoček achromatických je řešena velmi dokonale, jednak proto, že čočky skleněné jsou daleko stálejší než kovová zrcadla, jichžto lesk vlivem atmosférickým velice trpí.

VI. Emisse a absorpce světla.


§100. Apparát spektrální.

V oddílech předchozích seznámili jsme blíže původ a povahu světla, jehož odvaz, barvu a rozklad jsme v základních úkazech studovali; považovali jsme za dané světlo bílé, z pravidla slunečné, pro případě Drummondské, elektrické a jiné.


V oddílu, který nyní začínáme, jde o to, seznámati povahu rozmanitých zdrojů světelných, jakož i podmínky jich vzniku, jedním slovem studovati emissi světla (emittere = vysílati), ale též seznámati směry, jakéž nastávají s tímto světlem, když prošlo nějakým ústředím, tedy studovati absorpci světla (absorbere = pohlcovati).

Při tomto studiu je stálým naším původcem apparát, který dlužno tuhož hned z předu popsati, totiž apparát spektrální v té dokonalé úpravě, jakouž mu dali Kirchhoff a Bunsen (obr. 146.) Schematický objasňuje uspořádání jeho obr. 147.-

obr. 146.



obr. 147.



Podstatnou částí jeho je hranol jakožto analysator světla.

Hlavní jeho řez bývá z pravidla trojúhelník rovnostranný, úhel lámavý φ je tudíž = 60°. Hranol je ze skla flintového, tedy ze skla těžkého, aby papisky bílé značně rozkládal, přídavkem kyseliny borové (H_3BO_3) povstávají hranoly borové (žlutavé), přídavkem thallii hranoly thallové (zelenavé), kteréž světlo bílé ještě mohutněji rozkládají než obyčejné hranoly flintové. Hranol staví se tak, aby úchylka papisků světla natriového (čára D Fraunhofer) byla minimum. Požadavkem velmi důležitým jest, aby skelná massa hranolu byla úplně homogenní, jakož i aby plochy jeho byly přesně rovinnými a dobře hlazenými.

Další části apparátu spektrálního jsou:


α.) Kollimator,
β.) Dalekohled pozorovací.
γ.) Trubice se stupnicí.

α.) Kollimator. Účelem jeho je zjednati k pozorování papisky na hranol rovnoběžně dopadající, když jinými slovy, přimouti zdroj světla, který se má analysovati, opticky do nekonečné dálky. Neboť jinak, dopadají-li na hranol papisky od zdroje blízkého, tudíž divergentně, zobrazuje se lomem každý světící bod celou plochou kaustickou. Kdyby se pozorování dálo prostým okem, nebyla by věc tato valnou závadou, ale děje-li se pozorování dalekohledem, mohly by ony plochy kaustické na ostrost obrazů obr škodlivý.

Aby se z daného zdroje světelného vymezila úzká, lineární část, má kollimátor v předu na straně ke zdroji světla obrácené lineární štěrbinu, kterouž lze mikrometrickým šroubem zúžovati neb rozšiřovati. Tato štěrbina je v ohniskové rovině achromatické spojné čočky, která je rešroubována na druhém konci do trubice kollimátoru.

Tímto zařízením dopadají tedy papisky světelné na hranol rovnoběžně, lámou a rozkládají se hranolem a vycházejí též rovnoběžně, ale svazek papisků každé barvy ve svém určitém směru, jakož obr 148. zvlášť objasňuje.

β) Pozorovací dalekohled. Tyto papusky rovnoběžné vstupující do pozorovacího dalekohledu, kterýž ovšem musí býti pro rovnoběžné papusky – ať jak jinak, na nekonečnou dálku – zařízen; neboť štěrbina, na kterou zdaleka, nalézá se opticky v dálce nekonečné.



ob. 148.

V dalekohledu vidíme tedy obraz štěrbiny, a sice tolikrát vedle sebe, kolik jednotlivých barev je ve zdroji světelném, kterýž analysujeme, obsaženo. Tyto jednotlivé obrazy štěrbiny následují buď nepřetržitě vedle sebe, anebo přetržitě, tak že se její pozorovateli v určitém rozestavení.

γ) Stupnice. Aby se toto rozestavení dalo též pozorovati a popřípadě měřiti, je upparát ještě opatřen dalším přístrojem, totiž trubicí se škálou. Poněvadž však dalekohled je zařízen na nekonečno, musí také škála býti – opticky – v nekonečné dálce. Toho docílí se pak týmže způsobem jako při kollimátoru. Škála fotograficky zmenšená nalézá se na jednom konci trubice, na jejímž konci druhém je opět čočka. Škála je v ohniskové dálce čočky osvětlí se pomocným, na př. plynovým (malým) plamenem, papusky rovnoběžné z čočky vycházející zdržují se na ploše hranolu, i musí trubice škálová býti tak postavena, aby tímto odrazem papusky přišly do pozorovacího dalekohledu. Pak vidí pozorovatel spektrum i stupnici současně.

Z popisu tohoto jest též patrno, jak dlužno upparát spektrální k pozorování připraviti.

1.) Dalekohled se zařídí na nekonečno - zíráním na velmi vzdálený pozemský předmět – eventuálně na měsíc.

2.) Dalekohled takto zařízený postaví se proti kollimátoru a zde přimuje se štěrbina tak, aby v dalekohledu zcela ostře vynikla. Čím docílí se, že štěrbina je – opticky – též v dálce nekonečné.

3.) Štěrbina se osvětlí světlem natriovým (viz níže) a hranol postaví se empiricky do polohy minimální, t.j. stáčí se tak, – nejen tím co pozorovatel dalekohledem pozoruje – aby obraz štěrbiny právě stanul na tom místě, kde se jeho polovic dotýká; při tom se hranol ve svém postavení přirozeně upevní.

4.) Naposled zaměří se trubice se škálou; škála se osvětlí malým plamenem plynovým (značnější vzdálenými), a trubice otáčí se tak, aby obrazem na ploše hranolové vůbec papusky do dalekohledu přišly; pak teprve přimuje se škála tak, že obraz její stane se zcela ostrým.

Obraz štěrbiny nesmí proti obrazci škály při pozorování oka sem a tam ukazovati „parallaxu" t.j. musí státi na jistém dílci škály. Obyčejně se škála stáčí tak, aby obraz štěrbiny světlem natriovým osvětlené padl na určitý dílec, na př. 50 (Bunsen) neb jiný, dle toho, jak je škála dělena.

Škála má býti osvětlena jen tak, aby právě byla viditelnou; jinak je-li osvětlena více, vadí světlost čar její pozorování čar spektrálních; proto také, jde-li o čáry spektrální velmi slabé, je lépe škálu vůbec pro první orientaci – zastíniti.

K analysi lze užíti též dvou, po případě též více hranolů (Kirchhoff a Bunsen čtyř hranolů); spektrum se tím velmi značně prodlouží, ale v intensitě světla poklesá. Proto pro přehled a úhrnný dojem je lépe užíti jen jediného hranolu. K pozorování detailů je pak výhodno, užíti silnějšího okuláru v pozorovacího dalekohledu.

§101. Spektra emisní a absorpční.

Upparatu spektrálního možno užíti ve dvojím způsobu: buď ke zkoumání zdroje světelného – k analysi světla, kteréž zdroj takový přímo vysílá (emittuje). Spektrum zde vznikající zove se emisní,

anebo ke zkoumání ústředí nějakého, kterým bílé světlo projde nežli je hranolem analysujeme; zde jde tedy o změnu spektra, jaké dává světlo bílé ústředím, kteréž jisté druhy světla zadržuje, pohlcuje (absorbuje.) Proto

spektrum tím modifikované se zove absorpční.

Zdálo by se, že dle definice této není možno spektrum emisní v přísném slova smyslu obdržeti. Neboť když osvětlíme nějakým světlem přímo štěrbinu apparátu spektrálního, mezi papírky, nežli přijdou do oka našeho, projíti jednak vzduchem, jednak skleněnými čočkami kollimátoru a dalekohledu, dále hranolem samým a konečně i optickým apparátem oka našeho. V této příčině sluší však poznamenati následující. Vliv vzduchu mizí úplně; totiž v tak velice krátké dráze, jakou zde světlo vykonává, může se vzduch za úplně průhledný považovati. Co se týče oka našeho, nemáme od eventuální absorpce úplně abstrahovati. Neboť tím je dána přímému pozorování nižšími přírozená mez; kde je absorpce, tam přestává přímé vidění – i musíme pak zkoumání své chtějíce jíti přes tuto mez založiti na účincích jiných (tepelné, chemické a pod).

Jak později seznáme, šíří se záření i přes viditelnou část na obě strany, jednak před krajem spektra červeným (záření infračervené), jednak za fialovým (záření ultrafialové). Pro prvé, charakteristické svými účinky tepelnými, návrá se hranolů (i čoček) křišťálových. U látek jmenovaných je absorpce příslušných paprsků nejmenší.

§ 102. Emisní spektra žhoucích látek pevných a kapalných.

Žhoucí látky pevné neb kapalné dávají spektrum spojité. Vidíme při něm, aby jednotlivé barvy spektrální v souvislosti – jako continuum – jedna ve druhou přecházely, od červené počínajíc všemi odstíny až k fialové. Příklady: drát platinový rozžhavený na př. proudem elektrickým, křída při světle Drummondském, cihla při Auerově, uhlík při elektrickém, částečky uhlíka, jež nejsou dokonale spáleny, při světle plynovém, při světle lampy petrolejové, svíčky atd. Anebo: spektrum platiny roztavené v kapalinu, spektrum železa roztaveného v kapalinu, atd..

§ 103. Emisní spektra žhoucích par neb svítivých plynů.

Žhoucí páry neb svítící plyny dávají spektrum rozpojité. Spektrum takové skládá se z jednotlivých více méně jasných, ostře aneb i neurčitě ohraničených barevných čar (spektrum čárové). Tím vzniká při spektrech takových velká rozmanitost. Kdežto spektra projitá jsou mezi sebou zcela stejná – poznáváme se nad jen větší neb menší jasností – je spektrum rozpojité každé pro sebe zjevem zvláštním; neboť se může jedno od druhého lišiti počtem čar, jich jasností, ostrostí, jich rozestavením. Připojme ihned, že každé spektrum takové je charakteristickým pro zdroj světelný. Právě na tom zakládá se „spektrální analysa", která z povahy spektra takového soudí zpět na povahu zdroje světlného.

Aby pro snadnější takový zjednání byl široký základ, je nutno spektra celé řady žhoucích par a svítivých plynů pozorovati a podrobně propsati.

Žhoucí páry zjednáme si nejjednodušeji pomocí nesvítivého plamene hořáku Bunsenova. Do kraje tohoto plamene skládáme platinové drátky s obsahem, v němž se nalézá nějaká látka – na př. sůl; horkem promění se v páru, která plamen zbarví. Ukazuje se, že jsou to jen jisté prvky, jimiž toto zbarvení vzniká. Na př. ve sloučenině $NaCl$ nikoliv Cl, nýbrž Na, podobně ve sloučenině Na_2CO_3 opět Na atd. Tak přicházíme k tomu, uložiti o spektru, jež charakterisuje jistý prvek, jež v nějaké sloučenině se vyskytují.

Budtež zde uvedeny některé příklady zvláště zajímavé.
V nesvítivém plamenu hořáku Bunsenova dávají charakteristická spektra látky následující:

1.) Thallium. Spektrum je dáno jedinou čarou zelenou, velmi ostrou, jasnou, svítou, tak že se i po případě ve skupině jiných čar ihned svou skvělostí pozná. Páře par thallnových podobá se tedy okamžitě jedinému zvláštnímu tónu.
Thallium (θαλλός, ὁ, pučící zatvlast, analogie skvělé zeleni) bylo právě spektrálně
23. září

nalezeno (Crookes 1861).

2.) Natrium. Jeho jhoucí páry, kteréž barví plamen Bunsenův skvostně žlutě (zejména v chloridu $Na\,Cl$), dávají spektrum na první pohled rovněž tak jednoduché jako thallium, totiž jedinou žlutou čáru obsažnější, kteréž se však objeví jen i jedinou silnější lámajícím hranolem flintovým (při vaké šířce) dvojitou. Takto tedy podobá se tedy spektrum toto souzvuku dvou tonů výškou sobě velice blízkých. Přesněji možno světlo toto za velmi přibližně homogenní pokládati. Tak se ho též ve fysice velmi mnoho užívá, daleko více než thallia, kteréž je drahé. Reakce spektrální na přítomnost natria je neobyčejně citlivou. Poznává se ze natrium i tenčí všude v prachu obsažené, přicházející do vzduchu z moře, jehož vlny rozprašují se na malinké kapky, chlorid natria obsahující, kteréž větrem se přenášejí přes pevniny. Při pracích spektrálních užívá se buď chloridu ($Na\,Cl$), kterýž dává skvělé zbarvení, ale krátce trvající, kdežto uhličitan (Na_2CO_3 neb $Na\,HCO_3$) vytrvá déle.

3.) Lithium. Spektrum jeho červeně žhnoucích par dává skvělou ostrou čáru červenou, vedle toho pak ještě daleko slabší čáru oranžovou.

Komplikovanější spektra dávají již Kalium (čára červená, spektrum částečně zpožité, čára fialová); Baryum (čáry zelené charakteristické); Strontium (čáry červené charakteristické a čára modrá); Calcium, Rubidium (skvostné čáry červené), Caesium atd.

Plyny stávají se světivými, jsou-li zředěny (v trubičkách Geisslerových) výboji elektrickými (Ruhmkorff).

Zde zejména dlužno vésti vodík, jehož spektrum se skládá ze tří skvostných ostrých čar, červené, zelené a modré. Jeho spektrum je tedy jakoby akkordem tří tónů. Velmi skvostné spektrum dává dále dusík, argon a j.

Při rozboru spektrálním dlužno na dvě otázky důsledně upozorniti. První z nich zní: Má každá sloučenina chemická své vlastní emissní spektrum nebo ukazuje spektrum jedné nebo více ze svých součástek?
Druhé pak: Má každá látka pouze jediné spektrum?

K první otázce odpovídají již Kirchhoff a Bunsen, dle nichž spektra kovů jsou vždy totožná, ať onen kov je obsažen v jakékoli sloučenině. Dává tudíž

totéž spektrum chlorid sodnatý, bromid sodnatý a jodid sodnatý. Vysvětlení v tomto případě je ovšem jednoduché — soli tyto v žáru plamene se rozkládají a spektrum povstává pouze parami kovu, zde natria.

A. Mitscherlich přidává se k náhledu, že každá sloučenina má své vlastní, ovšem pokud trvá nezměněna v té temperatuře, jíž pozorování vyžaduje. Náhled tento potvrzují pokusy, při nichž částečně rozkladu soli bylo zamezeno.

Soli strontnaté, chlorid, bromid a jodid v plamenu Bunsenově dávají totéž spektrum. Zavádí-li se rozkladu působením Cl, $H\,Br$ a $H\,J$ do plamene, ukazuje každá sloučenina své vlastní spektrum.

Co se druhé otázky týče, ukazují se jisté rozdíly ve spektrech, hlavně při změně temperatury, ale změny tyto (pokud se týkají spektra pouhého) jsou povrchní, tak na př. že se stoupající temperaturou pouze nové čáry vystupují, některé z dřívějších mizí; dle toho lze za to míti, že každý prvek má své určité spektrum a dle něho že může býti určitě poznán.

§ 104. Absorpční spektra látek pevných a kapalných.


Při studiu absorpce volíme za zdroj světelný takový, který dává jasné spektrum spojité — tedy plamen drogandský nebo Auerův při subjektivním pozorování, světlo slunečních nebo elektrické nebo Drummondské při objektivním předvedení.

Co se látek pevných týče, náleží sem skla různě zbarvená, desky gelatinové a pod.

Zajímavá je absorpce skla červeně zbarveného, na př. kysličníkem měďnatým Cu_2O (cuprit, rudomědek). Sklo takové propouští jasně jasným červené světlo, takže spektrum absorpční dává se mnoho širokým červeným pruhem. Proto se tímto sklem zjednává červené světlo dosti homogenní.

Rovněž zajímavou je absorpce sklem modrým kobaltovým, jehož absorpční spektrum ukazuje pruh v červeném světle, široký pruh v žlutém a ku konci fialového.

obr. 149.



Velice pozoruhodné jsou absorpční spektra různých kapalin. K jich zkoumání užívá se zvláštních absorpčních nádobek, forem na př. takových, jako obr. 149 znázorňuje.

Praktické jsou nádobky prismatické pravoúhlé, z nichž dvě náležíte k sobě a tvoří absorpční nádobku jisté tloušťky, která se mění, když se jedna nádobka podél druhé na ploše hypotenusní posouvá.


Uvedeme některé zajímavé příklady. Abychom se mohli stručněji vyjadřovati, předpokládejme, že ve spektru máme na levo konec červený, na pravo fialový, takže barvy stoupají od nižších k vyšším — dle analogie akustické — od levé k pravé jako klaviatura.

Roztok dvojchromanu draselnatého ($K_2Cr_2O_7$) absorbuje celé pravé křídlo spektra od zelené (téměř od čáry E) k fialovému. Naopak roztok síranu kyproamonnatého ($Cu SO_4 \cdot 4NH_3 \cdot OH_2$) část centra a celé křídlo levé, propouštěje pouze paprsky modré a fialové. Obě — jinak průhledné látky — za sebou v nádobkách skleněných postavené nepropouštějí tedy žádné světlo, jeví se oku tmavými.

Jako dvojníkem k obému působí roztok permanganu draselnatého (kalium hypermanganicum $K Mn O_4$), který absorbuje centrum spektra, tedy hlavně část zelenou. Ve slabém zředění objeví se však místo absorpce úzkými jenom částečně — ukáží se v části zelené čtyři pruhy absorpční, které pak při stoupající koncentraci se stávají tmavšími při tom se rozšiřující, až konečně splynou v absorpci. Pojmaný tento postup lze pěkně ukázati při téže koncentraci nádobami klínovými

tými (obr. 150), různou tloušťkou absorpčně.

obr. 150.



Absorpci, při níž v jisté barvě — jako zde zelené — jenom zase jisté partie odpovídající zvláštním délkám vlny se absorbují, zoveme vybíravou elektivní.

Krásné příklady takové absorpce dávají roztoky solí didymových (na př. dusičnan didymový $Di_2(NO_3)_6$ nebo síran didymový $Di_2(SO_4)_3$, které se oku jeví ve slabém zředění téměř nápadně průhledným jen se slabým nádechem růžovým, ve spektru však působí absorpci pro didym zvláště charakteristickou, četnými pruhy zejména v části žluté spektra, také v zelené a modré.

Zvláště zajímavou a prakticky důležitou absorpci způsobuje barvivo krevní, haemoglobin (značka Hb, že na to kdo a globus = koule, kuličky krevní, krvinky), jehož složení je sice procentuálně známo, ale jehož chemická formule ani dosud stanovena (obsahuje C 54%, O 22%, N 16%, H 7%, dále v malém množství Fe a S). Sám v sobě dává Hb absorpční pruh v zeleném, na začátku části zelené, mezi čarami D a E. Oxydovaný Hb, tak zv. Oxy-haemoglobin ($O Hb$) dává na místě onoho jediného pruhu v zeleném pruhy dva, jakoby v jeho sousedství, t. j. blíže čáry D a E, tak že když kyslík — jeho jen velmi volně vázán — se odlučuje a haemoglobin redukuje, jest to oku patrné tím, že ony pruhy se estompují dohromady v jediný pruh. Sloučenina $O Hb$ použití totiž snadno kyslík, na př. pod vývěvou nebo vyvářením. Naopak redukovaný Hb snadno kyslík přijímá, na př. již třepáním se vzduchem. Krev obsahující O-Hb je šarlachová, obsahuje-li více jen Hb, fialově červená (jako červené víno).

Důležitá je sloučenina haemoglobinu s kapalinkem uhelnatým, CO-Hb, jasně červená, vznikající při zavření tímto plynem.

Spektrálně dává absorpční spektrum podobné jako oxyhaemoglobin, avšak podstatný rozdíl je v tom, že se nedá redukovati, t. j. oku by absorpční

pruhy nesplynou i když se užije redukujících prostředků (jiníku, ammoniatého $S(NH_4)_2$).

Zajímava je absorpce alkoholického roztoku chlorofyllu, který obsahuje celé pravé křídlo spektra a propouští jen barvu červenou a zelenou, pomenší však ve větší intensitě než druhou; proto při silnější vrstvě absorbující nebo při větší koncentraci jeví se roztok v propuštěném světle tmavočervenym.

Zajímavé další příklady absorpce u kapalin dávají roztoky barviv rozmanitých, jak vodní tak alkoholické, jichž řada jest všem velmi rozsáhlou.

§ 105. Absorpční spektra plynů a par.

Ke zkoumání absorpce způsobené parami neb plyny při obyčejné teplotě užívá se podobných absorpčních nádob jako u kapalin, jenom že rozměry (tloušťky) značně většich; bývají to buď balony neb válce značné délky, které jsou uzavřeny oboustranně deskami zrcadlovými.

Absorpce způsobená parami a plyny vzniká tím, že na místě absorpčních pruhů více méně širokých a neurčitě ohraničených, kterýž — z pravidla — u těles pevných a kapalných se pozoruje, vystupují zde ostré čáry — zcela na Fraunhoferovy upomínající — často se množství velmi značném, čímž úkaz se stává — zejména při slunečním světle — zvláště skvělým a charakteristickým.

Příklady zvláště zajímavé jsou následující:

Páry jodu. Baliony obalující kousky jodu dá se do lázně vzduchové asi 70°–80°; naplní se parami kadaně fialovými (odtud jméno jodu $\iota o \epsilon \iota \delta \eta \varsigma$, což znamená fialka), kteréž dávají skrostné absorpční spektrum s velmi četnými ostrými čarami.

Podobně páry bromu, co se chlorem tyče, ukazuje též absorpci, ale teprve při velmi značné tloušťce (asi 2 metry) absorbující vrstvy.

Kyslíčník (dusičelý) (NO_2) dává spektrum absorpční s velmi četnými čarami Fraunhoferovými podobnými místy širšími, jichž počet jde na 2000 (Brewster) a které jsou rozděleny přes celé spektrum. Při stupňující teplotě plynu stoupá

absorpce velmi značně, plyn, který při obyčejné teplotě je žlutavě oranžový, stává se nejdříve a poněkud tmavorudým až tmavý a nepropouští pak, světlo žádné, absorpce jest úplnou.

V příkladech zde uvedených jsou páry a plyny barevné. Zajímavo je však, že i plyny a páry úplně bezbarvé způsobují absorpční čáry ve spektru.

Tak je tomu u vzduchu a u par vodních. Tak konstatovali již Brewster (1860), že některé z čar Fraunhoferových ve spektru slunce jsou původu atmosférického, způsobené dílem vzduchem, ale zvláště vodními parami ve vzduchu obsaženými. Tak značně páry tyto na vzezření spektra slunečního působí, lze snadno se přesvědčiti, když se spektroskop za duhy obrátí proti značnému dešťovému (nimbus); objeví se tu v levém křídle spektra, hlavně v části červené a žluté, nové čáry, které jinak ve světle denním nejsou. Ale i vzduchem samým vznikají absorpce, jakož lze pozorovati, když pozorujeme při teplotách vzduchu velmi nízkých (Angström −24°), množství par vodních tím se zhusta zmenší, absorpční čáry vodních par mizí, ale některé z Fraunhoferových — zejména A a B — jeví se ve své intensitě závislými na stavu slunce a tudíž jsou původu atmosférického. Jiné naproti tomu, jako zvláště D, F atd., jsou rozhodně původu slunečního.

§ 106. Pokračování. Absorpce parami zhoucími. Vysvětlení vzniku čar Fraunhoferových.

Jak tyto čáry Fraunhoferovy, jež jsou rozhodně původu slunečního vznikají, ukázalo se překvapujícím způsobem při pokusu, který nahodile provedl Kirchhoff. Krátká publikace o důležitém jeho objevu datuje z roku 1859. („O čarách Fraunhoferových.") Již zkoumal spektrum plamene svíčky, do něhož dal něco kuchyňské soli. Plamen ukazoval známé

zabarvení natriové. „Sluneční paprsky, nežli dopadly na štěrbinu, nechal jsem," — tak píše — „projíti silným plamenem kuchyňské soli. Bylo-li světlo sluneční dostatečně oslabeno, objevily se na místě obou tmavých čar (Fraunhoferových) D dvě světlé čáry; když však intensita mnoho slunečního světla překročila jistou míru, objevily se ony tmavé čáry D v dalekovětší zřetelnosti než bez plamene kuchyňské soli." A dále: „Soudím z toho, že barevné plameny, v jichž spektrech přicházejí světlé, ostré čáry, papraky barvy těchto čar, když jimi procházejí, tak oslabí, že na místě jasných čar vystoupí tmavé, jakmile za plamenem se umístí zdroj světelný dostatečné intensity, v jehož spektru čáry ty jinak scházejí. Soudím dále, že tmavé čáry spektra slunečního, kteréž nejsou způsobeny atmosférou zemskou, vznikají přítomností těch látek v rozžhavené atmosféře sluneční, které ve spektru plamene světlé čáry na témže místě způsobují."

Objevem tímto vedeným Kirchhoff k podrobnějším zkoumání spektr rozmanitých barevných plamenů, kteréž provedl zároveň s Bunsenem. Ještě téhož roku 1859 vyslovil větu, že pro paprsky téže délky v ony při téže teplotě poměr mohutnosti emisní k mohutnosti absorpční je u všech látek týž. Objevy jeho objasnil a odůvodnil Kirchhoff tuto větu r. 1861.

Mohutností emisní rozumí se ta intensita paprsků určitého druhu, mohutností absorpce poměr intensity absorbovaných paprsků k intensitě paprsků (téhož druhu) na látku absorbující dopadajících.


Vysvětlení zákona Kirchhoffova theorií undulačních lze provésti na základě jednoduché analogie — resonancí v akkustice. Emise určitého druhu paprsků záleží v tom, že látka sdílí své výchvěje okolnímu éthern, absorpce pak v tom, že těleso výchvěje ethern okolního přijímá. Právě tak jako jsou tělesa na jisté tony naladěny, tak že ponze na ty tony resonují, které samy vydávají, tak jsou tělesa ve smyslu optickém jsou naladěna na určitý druh paprsků, t. j. na určité výchvěje étherové, které samy (při emisi) vykonávají anebo které (při absorpci) jedině mohou sdíleti.

Pokus Kirchhoffův lze opakovati ve způsobu velice přehledném následovně. Postavme před štěrbinu spektrálního apparátu plamen lithiový. Objeví se v dalekohledu ona skvělá, ostrá červená čára (Li α). Postavme pak na štěrbinu ve směru kollimátoru paprsky světelné slunce. Objeví se spektrum slunce, ona jasná čára červená zmizí a na místě jejím se ukáže ostrá tmavá čára, která jinak ve spektru slunce na tom místě není.

Žhavé páry lithiové zadrží tedy z bílého světla slunečního ten určitý ton barevný, který páry lithiové samy světlice vysílají.

Pokus v tomto způsobu je proto pozoruhodným, ponévadž jde o vznik čáry tmavé, která jinak ve spektru slunce není, kdežto u par natriových jde jen o zesílení čáry, která i tak již ve spektru jest.

Tento pokus „obrácení čáry lithiové" lze provésti jen subjektivně vůči světlu slunečnímu nebo elektrickému a Drummondskému. Pro objektivní provedení pokusu slunečním nebo elektrickým světlem nemá světlo lithiové dostatečné intensity. Za to lze pokus takový objektivně provésti parami natriovými, na př. dle Fraunhofera způsobem následujícím (obr. 151.)



V lampě elektrické vyznačuje se dolejší uhlík za obyčejnou tyčinku uhelnou, která byla ponořena do zředěného roztoku chloridu sodného a vyznačena. Před štěrbinu složíme horizontálně plíšek (a, b,) aby štěrbinu půlil. Plech tento zahříváme kahanem nesvítivým, do jehož plamene vedeme platinovou lžičku s kouskem natria.

Dokud natrium nehoří, ukazuje spektrum jasnou žlutou čáru natriovou, ponévadž oblouk elektrický vaklada chlorid sodnatý a rozžhavuje páry natria. Jakmile však zaplane natrium ve lžičce platinové, objeví se v příslušné polovině spektra (v projekci je to obrácené polovice hořejší) natriová čára tmavá, obrácená.

24. mch

Smak lze užíti též pak chloridu sodnatého v nesvítivém kahanu Bunsenově. Užije-li se světla slunečního, objeví se absorpce na témže místě, kde je Fraunhoferova čára D, která se ukazuje značně sodíkem, po případě dvojitou.

Pravíme, že tmavé čáry vznikají ve spektru slunečním na témže místě na kterém by vznikly čáry jasné, kdyby ony páry v obalu slunečním samy svítily, t.j. kdyby bylo možno paprsky od centrálního tělesa slunečního zadržeti. To však děje se v míře velkolepé při totálním zatmění slunce! Zde tedy, když fotosféra samojediné svítí, musíme pozorovati obrácení spektra slunečního - jasné čáry Fraunhoferovy na témže místě. Pozorování při zatmění totálním slunce konané potvrdily tento důsledek plnou měrou.

Srovnáváním tmavých čar Fraunhoferových s jasnými čarami látek na zemi známých lze konstatovati, které to látky se nalézají ve fotosféře co páry rozžhavené. Tak je konstatováno, že se nalézá na slunci Natrium, Kalium, Magnezium, Železo a j. - naproti tomu nikoli na příklad Lithium a j.

Čím nabyly čáry Fraunhoferovy významu netušeného pro zkoumání fysikální povahy těles nebeských (Astrofysika).

§ 107. Užívání spektrální analyse.

Na základě předešlých úvah můžeme souborně sestaviti případy, v nichž spektrální analyse se stává důležitou. Tato slouží:

1.) K zjištění a snadnému se orientování o přítomnosti prvků (zvláště vzácných kovů) ve sloučeninách i když ony prvky jsou tam obsaženy v míře pranepatrné. Dík $\frac{1}{3\,000\,000}$ mg některé soli natrové prozrazuje se žlutou čárou ve spektru, kterážto citlivost je tak ohromná, že se téměř nelze při pracech spektrálních ubrániti vznikání čáry natrové, neboť v těch nepatrných množstvích jsou soli natrové ve vzduchu, prachu atd. vždy a všude obsaženy).

U jiných prvků není ovšem citlivost této methody tak veliká, ale přece daleko přesahuje jakákoliv zkoumání jiná.

2.) Spektrální analysou objeveny byly nové prvky; tak nalezl Bunsen rubidium, Kirchhoffer caesium, Crookes thallium, Reich a Richter indium, Lecoq de Boisbaudran gallium atd.

3.) Spektrální analysa je důležitou pomůckou ke zkoumání fysikální povahy těles nebeských, učiníc na př. látky, které se nalézají na slunci, dokazuje, že mohutné ony sloupy ohnivé, které v chromosféře slunečí pozorujeme, jsou ohromné výbuchy žhavého vodíku atd.

4.) Při měření rychlosti těles nebeských užívá se analysy spektrální. Dle principu Dopplerova (viz akustika : 346) snadno vyvinuje, že barva zdroje světelného musí se měniti, pohybuje-li se tento zdroj k pozorovateli nebo od něho s rychlostí, která proti rychlosti světla nemizí. Při pozorování protuberancí pozoruje se modravá čára vodíku F k fialovému konci spektra, když na protuberance děje se ve směru k pozorovateli (počet vzchvějů za vteřinu se zvětšuje); naopak děje-li se protuberance ve směru opáčném (počet vzchvějů se zmenšuje), pak se čára F přiblíží ke konci červenému.

Lockyer počítal na základě takovýchto pozorování rychlost protuberancí na slunci a nalezl jimi 32 mil za sekundu.

Podobně Huggins (1868) měřil rychlost, jíž se od nás vzdalují Sirius, Arkturus měřil (1881) rychlosti: Siriův na 32 $\frac{km}{sec}$, Kapelly 43 $\frac{km}{sec}$, Aldebaranův 32 $\frac{km}{sec}$; hvězdy ty pohybují se od země, oproti tomu Arkturus s rychlostí 53 $\frac{km}{sec}$, Pollux 42 $\frac{km}{sec}$ a Wegas maj. 43 $\frac{km}{sec}$ přibližují se k naší zemi.

5.) Pozorování spekter absorpčních je velmi důležité v poznávání barviv, potravin, léků atd, pokud lze tyto upraviti tak, aby byly průhlednými. Spektrálním pozorováním lze zjistiti, zda-li na př. červené víno je umělé barvené, pravost másla, sýrů, zapáchu lze také zkoušeti, ano i v lékařství přítomnost jedu v krvi, žlučí v krvi atd, bilirubin v moči zkouší se analysou spektrálnou.

6.) Dějí-li se s látkami processy chemické, pak spektrální pozorování je pro svou jemnost a dokonalost na svém místě. Při chemických titracích s hypermanganem draselnatým je velmi spolehlivým znamením skončené reakce vystoupení absorpčních pruhů. Podobně důležitým je spektroskop při přípravě

oceli z litiny způsobem Bessemerovým. Záleží totiž proces Bessemerův v tom, že se roztavenou litinou železnou mísitelnou v tak zvaném konvertru prohání atmosferický vzduch, aby přítomný uhlík v litině spálil se až na 2% z původních 5%. Konec reakce oblozí se nejchlýmí zjevením se 4 modrých a jednou fialové čáry ve spektru, které dává plamen z konvertru mocně šlehající.

§108. Znázornění spektra.

Nejvěrnější obraz spektra byl by ten, který by v barvách úplně věrných spektrum představoval. Poněvadž zvláštní a živé ty tony barevné, jak se ve spektru v přirozenosti objevují, je velmi nesnadno vyšetřovati, kreslí se výkres spektra jednoduše tak, že se v něm dává pouze relativní jasnosti čili intensity osvětlení. V tomto způsobu bývá pak výkres nejčastěji proveden negativně – t. j. kreslíme-li na bílou půdu, označují se místa nejjasnější nejtmavšími pruhy.

Horizontální rozměr spektra řídí se škálou anebo délkou vlny, když pro určitý hranol je význam škály znám. Takováto graduace škály spektroskopu provede se pro určitý hranol pozorováním emisních spekter prvků jako jsou: Kalium, Lithium, Natrium, Thallium, Strontium, vodík atd. Určité místo škály zvolí se pro určité světlo, nejčastěji natrové, za základní.


Příklad takové graduace obsahuje následující tabulka, dle níž zkonstruován diagram 152.

Označení čáry	Dílec škály střed čáry.	délka vlny $\times 10^{-6}$ mm	barva
Kalium α	282,6	768,0	červená
Lithium α	268,7	670,8	červená
Strontium α	261,9	641,0	oranžová
Natrium	250,0	589,0	žlutá
Calcium β	238,5	558,8	žlutá
Barium γ	237,4	558,6	zelenožlutá
Thallium	231,3	534,9	zelená,
Strontium δ	192,5	460,7	modrá,
Kalium β	147,6	404,0	fialová

§109. Spektrometr.

Ke spektrálnímu aparátu druží se přístroj záření podobného, tak zvaný spektrometr (obr. 153). Účel jeho jest, jak jméno samo naznačuje, měřiti

obr. 152.



a to jiné úlohy; proto má dělený kruh se vším, co k odčítání náleží, tedy s nonií, mikroskopy a pod.

Jinak obsahuje také dalekohled pozorovací a kollimátor jako aparát spektrální, dále stolek, na nějž klade se hranol, jehož exponent lomu n pro různé druhy světelné se má měřiti. Toto měření provádí se buď methodou minimální úchylky (Fraunhofer) anebo možno-li methodou normální incidence (Meyerstein).


Jak jsme svého času odvodili platí tu vzorce

$$n = \frac{\sin \frac{1}{2}(\varphi + \delta)}{\sin \frac{1}{2}\varphi}$$

resp.

$$= \frac{\sin(\varphi + \delta)}{\sin \varphi}$$

obr. 153.




Jest tudíž ke stanovení exponentu lomu nutno měřiti především úhel φ hranolu a pak úhel δ, t. j. úchylku popřípadě měřeného druhu – měřené délky vlny – buď při úchylce minimální neb při normální incidenci. Měření vztahuje se vždy na jistou čáru ostrou ve spektru – poněvadž takové čáry

representuje vzdálenost čárou dělící vlny k světla — ať již je to čára světlá neb čára tmavá; různá se tu hlavně jasných čar, jež dávají Natrium, Lithium, Thallium, Kalium, Strontium, vodík a j. aneb tmavých čar Fraunhoferových ve spektru slunce. Podrobnosti o spektrometru náleží do fysiky praktické. —

[* § 110. O disperse anomální.

[* Důkaz o absorpci světla druží se zjev jiný, kterýmž se rozšiřuje názor o lomu světla. Tělesa, která dávají ve spektru absorpčním tmavé pruhy, lámou paprsky blíže těchto pruhů se nalézající rozdílně od těch pravidel, která jsme dosud při lomu poznali.

Obr. 154.



Představme si, že obyčejné spektrum A, B, ... L, jak je dává skleněný — zplna bezbarvý — hranol, pozorujeme prodlužujíc hranolem, jehož hrana lámavou však postavíme k předešlé kolmo. Spektrum se tím uchýlí a to tak, že nejvíce odchýlen bude konec fialový, avšak celý proužek zachová pravidlo, že postupně více jsou uchýleny paprsky barev k fialovému konci bližších. Užijeme-li však hranolu, jehož látka tvoří ve spektru absorpčním tmavé pruhy, tedy na př. pronostu s fuchsinem neb hypermanganem draselnatým, pak vzniknou spektra formy velmi nápadné, jak to ukazuje obr. 154. Od konce červeného až k prvnímu pruhu absorpčnímu přibývá tu úchylky usychleně, za prvním absorpčním jsou pak, paprsky méně lomené než červené, jichž lámavosti zase přibývá až k následujícímu pruhu absorpčnímu atd., a úkaz tento se ve pruhu k pruhu opakuje.

Tato změna lámavosti je při roztoku fuchsinu, který zelené světlo úplně absorbuje, tak velika, že paprsky barvy žluté a červené jsou silněji nežli paprsky barvy modré a fialové. Exponenty lomu pro různé Fraunhoferovy čáry ukazují zde tento sled:

Čára Fraunhoferova:	B	C	D	F	G	H
exponent lomu:	1,387	1,392	1,398	1,361	1,367	1,376.

Úkaz tento plyne disperse anomální, souvisí patrně velmi úzce s absorpcí a lze jej tudíž velmi dobře pozorovati při plynech, které ve spektrech absorpčních jeví pruhy absorpční.

Tak na př.: páry jodové pro světlo červené, mají exponent lomu $n = 1{,}00205$
" " fialové " " " $n = 1{,}00192$.

§ 111. Barva předmětu

Na absorpci světla záleží, jak patrno z předešlého, barva předmětu ve světle procházejícím. Sklo zbavené kyslíčníkem manganatým jeví se ve světle procházejícím býti červeným, poněvadž všechny ostatní paprsky absorbuje a pouze paprsky barvy červené propouští. Avšak i barva předmětu ve světle rozptýleně odraženém na absorpci záleží. Odráží se totiž paprsky světelné nejen od nejhořejší plochy předmětu, ale vnikají poněkud i pod ni a vycházejíce jsou částečně absorbovány, když těleso na povrchu zbarveno je z částeček barevných. Vidíme tudíž křídu, mramor, kondensovanou páru vodní v světelném bílém jako předměty bílé, poněvadž světlo vnikající do těchto látek prochází částicemi bezbarvými, které světlo neabsorbují. Naproti tomu vidíme v odraženém světle list květiny zelený právě tak jako ve světle propouštěném, poněvadž paprsky bílého světla jsou povrchovými vrstvami částečně absorbovány, tak že pouze paprsky zelené se odrážejí. Tím také se vysvětlí, proč ty předměty jeví se býti červenými, když na ně

dopadne světlo, jemuž scházejí paprsky, které ono propouští.

Instruktivní v té příčině je předměty barevné jako zejména květiny vkládati do spektra na př. slunečního a prověsti je od konce červeného k fialovému a pozorovati, jak se okem jeví v různých částech spektra. Rovněž poučný je pokus zachytiti spektrum slunce na př. zeleným neb červeným papírem a pod.

§ 112. Barvy povrchové a lesk kovový.

Často ukazují i tělesa bez odrazu rozptýleného, tedy na povrchu v rovinné neb jinak pravidelné plochy upravená, zvláštní zabarvení, jehož původ sluší hledati v absorpci, neboť všechna tato tělesa vynikají zvláštní neschopností absorpční pro některé barvy barevné. A právě ty barvy, které silně jimi jsou pohlcovány, jeví značnou intensitu při pravidelném odrazu bílého světla.

Tak se vysvětluje živé zbarvení povrchu barev anilinových, které je vždy komplementární s barvou ve světle procházejícím. Totéž platí i pro pravidelný odraz na plochách kovových. Zlato na př. jeví se býti v tenkých vrstvách ve světle procházejícím zeleným, absorbuje zvláště intensivně paprsky žluté, proto že také intensivně odráží, proto se ukazuje žlutým i při odrazu na ploše pravidelné. Kovy nikoli vynikají velikou schopností absorpční téměř pro všechny druhy paprsků ve spektru obsažených, proto je také odraz na hraničních plochách kovových tak intensivní. Pro vysvětlení se lesk kovový (chvorby broukův ku př.)

Odraz na plochách kovových připomíná odraz totální, proto často říkáme v plochách totálně reflektujících, že se lesknou jako stříbro.

[* § 113. Koefficient extinkce a quocient absorpce.

[* Vniká-li světlo intensity = J do vrstvy nějakého předmětu, jejíž tloušťka je $= 1$; pak se absorpcí redukuje původní intensita na $\frac{J}{n}$; při průchodu druhou stejně silnou vrstvou redukuje se opět v tomto poměru, tak že na třetí vrstvu dopadá světlo intensity $\frac{J}{n_2}$ atd., tak že vrstvou

o tloušťce d vychází světlo intensity $J' = \frac{J}{n^d}$;

není tedy absorpce úměrna tloušťce předmětu, ale přibývá jí v řadě geometrické, když tloušťce přibývá v řadě arithmetické.

Vezmeme-li logarithmy (mat.), obdržíme

$$\lg J' = \lg J - d \lg n$$

čili

$$\log J - \lg J' = d \cdot \lg n;$$

jest tedy logarithmický dekrement intensity světla úměrný tloušťce absorbujícího ústředí. Konstanta úměrnosti

$$\lg n = \alpha$$

nazývá se koefficient extinkce (též absorpce). Je tedy

$$\alpha = \frac{1}{d} \lg \text{nat} \frac{J}{J'} = \frac{1}{d} \cdot 2{,}30 \lg \text{brigg} \frac{J}{J'}.$$

Jiná forma rovnice je:

$$J' = J \cdot e^{-\alpha d}.$$

Zkoumáme-li absorpci roztoku barviv, pak je patrno, že roztok c-krát koncentrovanější, ve vrstvě $\frac{d}{c}$ krát tenší působí jako roztok původní; z toho vychází koefficient extinkce

$$\alpha = \frac{\lg \frac{J}{J'}}{\frac{d}{c}} \quad \text{čili} \quad \alpha = c \frac{\lg \frac{J}{J'}}{d}$$

čili koefficient extinkce jest přímo úměrný koncentraci.

Jsou-li α_1, α_2 koefficienty extinkce pro koncentrace c_1 a c_2, pak patrno, že

$$\frac{c_1}{\alpha_1} = \frac{c_2}{\alpha_2} \cdot A.$$

A slove poměrem nebo quocientem absorpce (Vierordt).

Koncentrace c měří se v tomto případě obyčejně množstvím látky v grammech, které je rozpuštěno v 1 cm³ roztoku. Známe-li veličinu A, lze koncentraci stanoviti měřením koefficientu extinkce dle vzorce

$$c = A \cdot \alpha.$$

Všechny tyto úvahy platí ovšem pro světlo homogenní.

Při měření koefficienta α nastává oslabení světla též reflexí na př. na skle. Dle Fresnela reflektuje se část $\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2$ světla při kolmém úhlu. Při skle tedy proti vzduchu, kde je $n = \frac{3}{2}$, činí tato ztráta $\left(\frac{\frac{3}{2}-1}{\frac{3}{2}+1}\right)^2 = \frac{1}{25} = 4\%$.

Takovéto ztráty nutno při měření koefficientu absorpce diminuovati nejlépe methodami differenčními. Učiní se totiž jedno pozorování při jisté tloušťce a pak druhé při tloušťce o d větší a v differenci obou pozorování se ony ztráty vyloučí.

Působení světla absorbovaného.

§ 114. Fluorescence.


S absorpcí světla souvisí ještě jiné zjevy opticky velmi zajímavé. Dopadá-li bílé světlo na roztok chlorofyllu, jeví se tento ve světle procházejícím zeleným, ve světle odraženém rudým. Podobný úkaz objevil Cumberland na kuzivci, fluoritu, jenž ve světle procházejícím je jasně zelený, pozorujeme-li krystal ze strany, ukazuje se cesta paprsků tmavě modrým zabarvením.

Podobnou změnu světla pozorujeme na eosinu, fluoresceinu, aesculinu (látce obsažené v kaštanové kůře), síranu chininovému, skle uranovém, petroleji atd. Dle Stokesa nazván byl zjev tento fluorescencí. V pověstlivém si pak fluorescenci změnou světla, kterou působuje látka, jíž světlo přijímá. K objasnění poslouží následující pokus: Vložka skla uranového, dopadá-li na ni světlo modré, svítí zeleně, naopak ve světle červeném mizí tento úkaz. Podobně nájde nitěný kanálem platičitobarnatým (látka ve světle bílém žlutá) vidíme pod modrým sklem záři intensivním světlem zeleným, naopak mizí veškerá fluorescence ve světle červeném. Pokusy bylo potvrzeno z té příčiny pravidlo Stokesovo, dle něhož fluorescencí mění se vždy světlo větší lámavosti ve světlo lámavosti menší. Důkazem tohoto pravidla je pokus, při němž světlo procházející látkou fluorující dopadá na jiný předmět fluorescence schopný — na tomto dalším tělese fluorescence již nepozorujeme.

Zvláště názorně a přesně vyniká pravidlo Stokesovo užitím methody

spektrálních. Za pouzdro pojmu, jenž je potřen do dolejší poloviny roztokem síranu chininového nebo kyanidem platičitobarnatým, vrhneme plameň spektrum, tak že rozhraní mezi papírem potřeným a bílým je kolmo k štěrbině. Obr. 155. ukazuje výsledek pokusu. V horější polovici papíru vidíme obyčejné spektrum s čarami Fraunhoferovými. V dolejší polovici svítí zelenavým světlem fluorescence, které se vykládá daleko za fialový konec spektra obyčejného. Tím se nejen potvrzuje pravidlo Stokesovo, že barva fialová tu mění se fluorescencí v barvu zelenou, menší lomivosti, ale objevuje se jiný nový a velmi zajímavý úkaz, že spektrum neskončí světlem fialovým, nýbrž že za tímto viditelným „koncem" spektra je ještě celá řada paprsků větší lámavosti, které na základě fluorescence můžeme spatřiti. Také tato část spektra za obyčejných poměrů neviditelná, již nazýváme vzhledem k poloze její ultrafialovou, obsahuje čáry Fraunhoferovy, jak je v obrazci naznačeno.

Obr. 155.



Ještě libého názoru o fluorescenci nabýváme užitím dvou zkřížených hranolů. Spektrum obyčejné dopadá při tom na látku fluorující na př. od štěrbiny vertikální; toto spektrum pozorujeme hranolem, jehož hrana lámavá je horizontální. Tím se ukazuje, že světlo fluorescence není homogenní, nýbrž se skládá z paprsků velmi různé lomivosti.

Konečně pomocným je též pozorování spekter absorpčních látek, které fluorují. Ukazuje se, že ty paprsky jsou absorbovány, které fluorescenci působí. Avšak, tato absorpce je velice rozdílná od té, kterou jsme dříve poznali. Při absorpci obyčejné mění se energie světelná paprsků absorbovaných v teplo, kdežto při absorpci, která působuje fluorescenci, forma energie se nemění, pouze jen lomivost paprsků.

Pravidlo Stokesovo nepřipouští se spektru fluorescenčním paprsků o menší lomivosti, neboť je lomivost paprsků původních fluorescenci vyvolávších. Proti tomu tvrdí Lommel, že nalezl látky, které vysílají světlo fluorescenční, obsahující také paprsky větší lomivosti. Ale tolik lze látky

fluorující rozděliti ve tři třídy:


I.) Látky, při nichž každý paprsek fluorescenci vyvolávající dává celé spektrum fluorescenční. Absorpční spektra těchto látek jeví mnohé tmavé pruhy absorpční, látky ty vznikají živou intensivní barvou, fluorující spektrum jich je všude stejně zbarveno. Sem náleží: chlorofyll, červeň naftalinová, eosin, purpurin rozpuštěný v aethem, fluorescein a uranové sklo.

II.) Látky druhé třídy jsou ty, jež vysílají paprsky nanejvýš stejné a vyšší lomivosti, než jsou paprsky původní. Jsou to látky barvy zažloutlé anebo bezbarvé, fluorující spektrum jich ukazuje nestejné zbarvení, barevné tony jeden v druhý přecházejí a jsou teprve tam stejně zabarveny, kde spektrum původní mizí. Všechny tyto látky dedují pravidlo Stokesovo. Jsou to na př. Sandarak, Diphenilamin, Kurkuma, sladový cukr, anthracen v alkoholu rozpuštěný, síran chininový, petroleum, aeskulin, kazivec atd.

III.) Látky třetí třídy jeví vlastnosti látek obou předešlých tříd společné. Sem náleží: zeleň, modř a červeň chameleonová, lakmus, fluoramilin, brasilein atd.

Obrazce 156., 157., 158. ukazují spektra hranolu křišťálového vržená na různé látky fluorující a pozorovaná hranolem skřížením.


I. Chlorofyll.



ob. 156.

II. Aeskulin.


ob. 157



Pozorování děje se methodou Pierrovou (1866), jenž obyčejné spektrum zjednané hranolem křišťálovým, (aby nebyly paprsky fialové absorbovány) odrazil kovovým zrcadlem na povrch kapaliny fluorující, křišťálovou cylindrickou čočkou bylo spektrum koncentrováno na úzký proužek, jenž byl pozorován hranolem skřížením. Původní spektrum skřížením hranolu vzniklé je pro větší názor k obrazcům připojeno. Rozdíl tří uvedených tříd látek fluorujících na

těchto representantech v obrazcích velmi pěkně vyniká.

III. Lakmus.



ob. 158.

§ 115. Fosforescence.


Některé látky bývše osvětleny světlem slunečním nebo elektrickým, nebo výbojem elektrickým ve zředěném ústředí světlo potom kratší nebo delší dobu vysílají, aniž by při tom měnily svou temperaturu nebo konstituci chemickou. Podle známého světelkování fosforu byl nazván tento úkaz fosforescencí. Souvisí patrně jako fluorescence se zvláštní absorpcí světla a je jakousi fluorescencí, která pokračuje a trvá, neboť nalézáme nejen látky, které pouze fluorují, ale i jiných celou stupnici, které fosforují po dobu velmi různou od několika vteřin až do mnoha hodin.

Velmi pěknou fosforescenci ukazují sirníky kalcia, strontia a barya a zvláště směsi z nich připravené. Důležitou podmínkou jich přípravy jest úplné vypuzení a zabránění vysokou temperaturou několika set stupňů. Proto dodávají se nejčastěji v zatavených trubicích, často v takových, které obsahují vnitřní trubici vyčerpanou a dvěma elektrodama opatřenou, tak že lze velmi účinnou fosforescenci vzbuditi střídavými výboji z přístroje Ruhmkorffova.

Zkoumání fosforescence dálo se dříve tak, že pozorovatel v zatemnělé světnici přijímal předměty před tím určitý čas světelnému zdroji vystavené. Zkoumání toto ovšem postrádalo dokonalosti, hlavně pokud se týkalo velmi krátkých exposicí předmětu nebo fosforescencí, brzy mizících.

E. Becquerel zařídil zvláštní přístroj — fosforoskop — jímž možno vyšetřiti fosforescenci pouze 0,0006 sec trvající.

Těleso, jehož fosforescenci zkoumáme, klade se ve fosforoskopu mezi dvě kruhové desky na téže ose společné se otáčející a takovými otvory opatřené, že, je-li těleso z jedné strany osvětleno, druhá deska je zakrývá, naopak, není-li těleso osvětleno, bez s druhé strany pozorovati fosforescenci.



Obr. 159.

Na desce skleněné bez ukázati fosforescenci zařízením, jež jest obr. 159. dostatečně illustrováno. Čočka A sbírá paprsky slunečními do bodu B na desku skleněnou C, která se kolem osy D velmi pomalu otáčí. Bod B jeví se na rotující desce jakoby prstencový ve směru otáčení se světlý proužek, jehož intensita pozvolna se ztrácí. Zvláště sklo uranové fosforuje pěkně zeleně. Korundy, safíry a rubíny fosforují jasným světlem červeným, méně jako při fluorescenci má i zde každé těleso svůj zvláštní vliv absorpční, jenž se jeví pak barvou při fosforování. Ke zkoumání spektrálnímu nejlépe hodí se praeparát rozmělnění (někdy ne v příliš jemný prášek) a nanesení jím (pomocí sirky) papíru stejnoměrně arabskou gumou potřeného.


Ačkoliv fosforescence tak se průvodním úkazem fluorescence, je zajímavo, že fluorují hlavně kapaliny, naopak fosforují pouze tělesa pevná, téměř veškerá tělesa, která fluorují, fosforují, jsou-li ztuhlá v želatině. Tato pravidla od E. Wiedemanna pocházející mají ovšem své výjimky.

§ 116. Změna energie světelné v energii chemickou.

Fotochemie.

Světelné energie paprsků mění se absorpcí obyčejně v energii tepelnou aneb, jak právě bylo uvedeno, při úkazu fluorescence a fosforescence nastává pouze změna v homogenosti paprsků. Velmi zajímavou změnou energie světelné je případ, kdy tato mění se v energii chemickou. Tak jako mnohé reakce chemické provázeny jsou zjevy světelnými, tak naopak světlo může se státi příčinou reakcí

chemických. Zjevy takové nazýváme fotochemickým neb aktinickým působením světla. Jsou papírky, které zjevy popsané vyvolávají, aktinickými neb fotochemickými. Bunsen zkoumal aktinické působení světla na směsi rovných dílů chloru a vodíku, kteréž ve světle slunečním tvoří sloučeninu HCl za náležitého výbuchu, podobného výbuchu třaskavého plynu. Akce chemická zaká zala se býti proporcionálním intensitě světla. Ne všechny papírky světelné nalezeny prostě aktinickými. Obr. 160. představuje spektrum zjednané čočkou a hranolem křišťálovým, a něhož jsou naneseny ordinaty označující svou velikostí množství aktinickou příslušných paprsků. Patrno z tohoto výkresu, že papírky červené a zelené nepatrně působí chemicky, za to však modré a fialové, tyto i v části neviditelné, kde teprve mezi čarou T a U jich působnost chemická mizí. Maximální působnost chemickou nalézáme mezi čarami G, H a druhé takové maximum poblíže čáry J.



Obr. 160.

Zajímavo je, že chemické působení paprsků aktinických nenastává ihned, jakmile tyto dopadnou na látky, reakce chopné, ale teprve po nějakém čase. Tuto fotochemickou indukci dobře lze studovati při slučování chloru a vodíku ozářením papírky slunečními. Zdá se, že světlo nepůsobí tu ihned sloučení vodíku a chloru na HCl, ale že povstávají jakési sloučeniny přechodné, kterých teprve jisté množství podmiňuje tvoření se chlorovodíku. Poznámku tuto doplňuje zkušenost, která učí, že suché plyny H a Cl slunečním zářením velmi nesnadno se slučují — naopak že přítomnost vodních par úkaz ten podporuje.

Příklady chemického působení světla jsou: Bílý fosfor přechází světlem v červený, síra mění svou modifikaci, selen stává se osvětlením krystallinickým a nabývá tím zvláštních vlastností elektrických, že totiž vede lépe elektrický

proud jsa osvětlen než ve tmě (fotofon), červená zrnečka světlem černá, achat mění svou barvu atd.

Zvláště zajímavými a důležitými zjevy jsou ty při nichž světlo způsobuje chemický rozklad. Jododuzík, chlorovodzík rozkládají se světlem, kyselina dusičná rozkladem takovým barví se žlutočerveně, soli jodové vylučováním se jodu barví se na žluto, šroubík podobně, soli kyseliny chromové, chlorid železnatý redukují se světlem za přítomnosti organických sloučenin. Zvláště pak působí světlo na sloučeniny kovů: zlata, platiny a stříbra s halogeny chlorem, bromem a jodem. Na tomto rozkladu chloridu, bromidu a jodidu stříbrnatého zakládá se fotografie. Tyto látky byvše osvětleny po dobu kratší než by nastal viditelný rozklad nabývají vlastnosti srážeti stříbro z roztoku dusičnanu stříbrnatého, k němuž bylo přidáno nějakého prostředku redukujícího. Proces tento nazývá se vyvoláním fysikálním - vedle něho rozeznáváme vyvolání chemické, jelikož užíváme při chloridu a bromidu stříbrnatém, jenž byl jen krátce osvětlen. Kov se tu redukuje chemicky redukčními roztoky, které nazýváme vývojkami.

* První počátky fotografie padají do začátku tohoto století, kdy Wedgwood (1802) pokoušel se, obrázky vzniklé v temné komoře zachytiti na desce potřené chloridem stříbrnatým. Po jiných mnohých pokusech (Davy, Niépce) podařilo se Daguerre-ovi nalézti způsob, kterým bylo možno ficovati reálné obrázky vzniklé čočkou na měděné desce pokryté slabou vrstvou stříbra.

Čistou takovouto desku vystavil Daguerre účinku par jodových, tak že na povrchu povstala vrstva jodidu stříbrnatého. Takto ve tmě připravená deska vložena byla do komory fotografické na místo, kde vznikal ostrý obraz čočkou utvořený a ponechán světlu na ni působiti po jistý čas - dle intensity osvětlení zvolený. Potom deska, na níž působením světla dosud nebylo nikterak znáti - položena nad páry rtuti a konečně, když se obraz rtuti vsáklo, vyjmuta roztokem thiosiřičitanu sodnatého, který rozpouští přebytečný jodid stříbrnatý. Rtuť kondenzuje se pouze na těch místech, kde světlo účinkovalo - tedy na místech jasných a to velmi

drobných kuličkách, které světlo dopadající z obrazu rozptylují tak, že odráží-li se od ostatních částí desky (stříbrného zrcadla) paprsky temného nějakého předmětu, spatřujeme na desce obrázek, fotografii (daguerrotypii).

Kdyby světlo v temné komoře na desku dále působilo, pak se jeho působením ukáže bez jakéhokoliv „vyvolávání" deska na místech osvětlených černá, prostane obrázek, při němž místa na předmětu světlá jsou temná a naopak, obrázek, jemuž říkáme negativ.

Roku 1840 Talbot a pak 1847 Niepce de St. Victor zavedli mnohem dokonalejší methodu fotografování nežli byla daguerrotypie.

Fotografií získaný totiž především negativ na desce průhledné, z níž mohlo býti průsvitem, kopírováním na papíře citlivý zjednáno jakékoliv množství positivů.

Původní desky fotografické připravovány byly přímo před exponováním tím, že se deska skleněná bílkem, jemuž bylo něco jodkalia přimíseno, pokrytá ponořila do roztoku soli stříbrnaté. Zlepšení nastalo zavedením kollodia na místě bílku a značného zdokonalení a zobecnění doznala fotografie vynálezem suchých desek gelatinových (Harrison 1868 a Maddox 1871).

Provedení fotografie od těchto dob vede těmito pěti stadiemi:

1.) – přípravou desek fotografických,
2.) – exposicí,
3.) – vyvoláním negativů,
4.) – ustálením negativů a jeho úpravou,
5.) – zhotovením positivů, kopie.

1) Příprava suchých desek děje se nyní ve velkých továrnách, a to různým způsobem dle toho, k jakému účeli desky se hotoví. Nejdůležitější na desce je citlivá vrstva gelatinová, obsahující stříbrnatou sůl (nejčastěji bromid stříbrnatý); deska sama musí zřejmě býti průhledná a čistá (bez kazů ve skle). V novější době užívá se též tak zvaných filmů, tenkých, ohebných a pružných listků z celluloidu.

Desky neb filmy takovéto uschovávají se v temném a suchém prostoru po delší

dobu (kolik měřičů), aniž by pozbyly své citlivosti.

2.) Exposicí nazýváme dobu, po kterou světlo na desku v aparátu fotografickém působilo. Když totiž matná deska temné komory aparátu byla tak postavena, že na ní se jeví měřitý, ostrý obrázek předmětu, který fotografovati chceme, vloží se na místo matné desky kazetta, v níž se nalézá deska fotografická pečlivě od prachu jemnou plochou štětkou očištěná. Délka exposice půdí se intensitou osvětlení předmětu a citlivostí desky fotografické a vším i povahou objektivu. Tak jsou exposice „momentní" trvající 0,01 až několik desetin vteřiny při osvětlení slunečním neb při fotografování venkov, naproti tomu exposice až několik minut trvající při fotografování interiérů, reprodukcí obrazů a rytin, zvětšování atd.

Voliti správnou exposici za daných poměrů je velmi důležitou okolností pro zdar fotografie; poněvadž pak posouzení intensity osvětlené matné desky pouhým dívánímse vyžaduje delší zkušenosti, sestrojeny byly přístroje k měření exposice – fotografické fotometry (Decondun, Goerz, Watkins). Při daném osvětlení musíme měniti exposici užitím větších neb menších diafragmat na objektiv připevněných neb k tomu cíli již upravené „clonky irisové", již. můžeme v mezích objektivu jakkoliv veliký stroz realisovati.

3.) Vyvolání desky exponované děje se (jakož i vkládání desk do kazet) v temné komoře při červeném světle zjednaném buď lampou s červeným sklem neb tím, že skleněná komora je červeným sklem zaskleno.

Roztoků, jimiž se vyvolávání děje, je mnoho velké množství. Připravuje se pak každá „vývojka" obyčejně ze dvou neb více roztoků, které se v jistém poměru před upotřebením teprve míchají. Takovými vývojkami jsou: síran železnatý a šťovan draselnatý, pyrogallol (smíšený se sodou neb ammoniakem, hydrochinon se sodou, eikonogen, metol se sodou, amidol, glycin, rodinal. Zvláště intensivních vývojek docílíme, smísíme-li dvou vývojek různých jako: eikonogen – hydrochinon, glycin – pyrogallol atd.

Deska fotografická klade se do ploché misky, v níž se vývojkou polévá, aneb kde už se vývojka nalézá. V tomto druhém případě deska dříve se ve vodě

dobře smočí. Miskou se neustále kolébá tak, aby vývojka se promíchávala a působila stejnoměrně na všech místech desky. Vyvolávání děje se tak dlouho, až i místa na předmětu nejméně osvětlená přijímají poměrně šedé zabarvení a až negativ proti světlu pozorovaný nkazuje se býti do detailu propracován. Negativ v tomto stadiu jest obyčejně tmavší než po-fixaci – okolnosti této nesmí býti zapomenuta. Opraný negativ nejlépe jemně rozptýleným proudem vody klade se do lázně fixačního. Rychlý postup vyvolání zdržuje se přidáním bromidu draselnatého, pozvolný urychluje se přidáním ammoniaku neb kapkou lázně fixačního.

4.) Lázeň fixační – obyčejně 15–20% vodní roztok jinatanu podnatého rozpustí v několika minutách na desce dosud nerozložený bromid stříbrnatý – deska, která před tím z druhé strany kde není vrstva citlivá – jeví se nažloutlá, stane se průhledná a jeví se v odraženém světle jako úplně černá. Po tom se negativ řádně v proudící vodě vypere od zbytků fixáže a postaví (nejlépe na roh desky) svismo k oschnutí na suchém místě, kde se nepráší a kde nevystoupí temperatura nad 30°. Má-li negativ býti na některých místech poopraven, retušován, musí býti lakován. Na místech, kde retuš hodláme provésti, učiní se lak pomocí succinolu dmatným, takže chytá velmi dobře tužku i barvu.

5.) Kopie – obraz pozitivní provádí se na papíře podobně připravením jako je deska fotografická. Papír pokryt je vrstvou albuminu, želatiny nebo kollodia a impregnovaný chloridem neb bromidem stříbrnatým. Papíry takové různě preparované vyrábějí se jako desky fotografické v továrnách pod různými jmény (papír celloidinový, aristotový atd.) Negativ položen do rámu kopírovacího vrstvou želatinovou dovnitř, pokryje se citlivým papírem, dále vrstvou měkkého papíru neb látky a rám se zavře tak, že papír a deska jsou všude v stejnoměrném kontaktu. Na papíru necháme pak působiti rozptýlené denní světlo (nejlépe od oblak) skrze negativ, dívajíce se občas, otevřevše část rámu, jak daleko kopie pokročila. Takto tu ve většině případů je jadno obrázek učiniti trochu tmavším, poněvadž v následujících lázních kopie stává se světlejší.

Kopie kladou se pak do ploché misky, kde jest zlatá lázeň,

roztok obsahující chlorid zlatový neb chlorid sodnato-zlatový. V této lázni dostávají kopie postupně nejdříve barvu temně hnědou, pak světle hnědolovu, červenou, znovu pak přecházejí barva hnědá, modrá, tmavomodrá neb červenohnědá, dle povahy papíru a užité lázně. Opraté kopie se pak ustalují v lázni fixačním a konečně perou dokonale a usuší. Někdy bývají obě lázně, zlatá a fixační, spojeny. Snadno se pak zaleží poněkud ještě světlé kopie různě se dle potřeby a nalepí čistým přepuštěným škrobem na kartou. Fotografie — po případě s dostatečnou retuší pozitivní — se konečně patinují a tím dohotoví.

Dle § 116. mívají papírky všech barev stejnou působivost chemickou, následkem čehož při fotografii předmětu barevného na obyčejnou desku fotografickou jsou některé části předmětu nedostatečně a některé po případě přepracovány. Tak vypadne barva žlutá neb červená na pozitivu velmi tmavá, kdežto barva modrá zase velmi světlá. Vadě této odpomáhá se užíváním zvláštních desek, které jsou i pro barvu červenou a žlutou velmi citlivými. Tyto desky jmenují se orthochromatickými. H. V. Vogel (1873) a J. M. Eder na lezli barviva, která přimíchána bývše do emulse (neb do kterých se deska hotová před vlastním ponořuje), činí vrstvu citlivou pro ty papírky, které barvivo absorbuje. Barviva tato slují sensibilisatory; pro papírky žluté a zelené sensibilisují se deskytetra-jod-fluorescein-natrium (erythrosinem), pro papírky červené chinolinovou červení

Citlivost desky pro papírky modré a fialové musí býti však zároveň zmírněna, to se děje filtrací papírků do apparátů obsahujících žlutým sklem. Doba exposice ovšem se musí přirozeně (až na deutinátovou) zvětšiti.

Fotochromie. Obyčejná fotografie (pozitiv, kopie) podává obrázek předmětu v jedné barvě, která nestejnou intensitou ponkazuje k různým barvám předmětu. Poněvadž pak úkolem fotografie je podati co možná a přesný obrázek originálu, čelí snahy doby nejnovější ke zhotovení barevného obrázku.

Fotochromie přímá. Přímý způsob takové fotochromie navedl již 1865 Ranconnet, fotografuje totiž barevný předmět třikrát a to jednou skrze sklo červené,

podruhé žluté a po třetí modré. Tyto fotografie nanesou se na kámen a provede se lithografie tiskem třemi barvami odpovídajícími příslušným fotografiím na lůj papír.


Methodu tuto zdokonalil, takže jí v praxi — o chromolithografii — mohlo býti užito, H. W. Vogel, který pro každou desku fotografickou z počátku užívané vynalezl zvláštní sensibilisator, který spektrus kopicky zkoumal a k němu vyhledal pak pro tisk barvu co možná s barvou sensibilisátorovou souhlasící.

Directní fotografie v barvách, ale intruvantivé, provedli první E. Becquerel a Niepce de St. Victor, kteří fotografovali spektrum slunečné. Methoda tato záleží v tak zvaných kovových tenkých vrstev (viz optika theoretická) a byla v nejnovějším čase Lippmannem a Wienerem zdokonalena tak, že mohou býti zhotoveny hezké obrázky barevné. *]

VII. Optika fysiologická.

§117. Popis oka.

Oko lidské má celkem podobu kulovou, mimo přední stranu, kde vynikají části více zakřivená. Vrchní tuhá jeho obálka (B) nazývá se bělinou (sclerotica) podle své barvy; tato vrstva je na zakřivenější části průhledná a nazývá se zde rohovkou (cornea). (R)



Bělina pokryta je na vnitřním povrchu cevnatkou C (choroidea), jejíž vnitřní plocha pokryta je černým pigmentem, jehož účel je papírky světelné pronikající retinou, sítnicí, (Jakobovati. Cevnatka zakončena je duhovkou

D (Iris) opatřenou kruhovým otvorem – pupillou (P) který duhovku pa-
mačinně při světle intensivním zmenšuje a naopak ve tmě zvětšuje. Přední
plocha duhovky je u různých lidí různě zbarvena a dle ní jdí se barva
očí.

Cévnatka obsahuje za duhovkou zvláštní zálivky (počtem 70 až 72), které
obklopují čočku (lens crystallina); tyto zálivky ciliární (c) souvisí s bělinou
svalem ciliárním složeným z vláken radiálně vybíhajících. Retina je
jemná pak průsvitná membrána složená z vláken a buněk nervových,
které vyplňují vnitřní stěny oka až k ciliárním zálivkům. Uprostřed
retiny nalézá se žlutá skvrna ž, místo poněkud vyvýšené v průměru
asi 1,25 mm měřící. Žlutá skvrna obsahuje „fovea centralis", místo na
retině nejcitlivější. Stranou od žluté skvrny tam, kde nerv zrakový do oka
vchází, je místo pro světlo úplně necitlivé, které se nazývá slepým bodem (s).

O existenci slepého bodu přesvědčíme se, díváme-li se, zakryjeme levé oko
okem pravým na křížek (obr. 162). V určité
vzdálenosti oka od papíru černá tečka
zmizí a objeví se jen, pohneme-li okem.

ob. 162.

Čočka (lens crystallina) je těleso
měkké, průhledné, mající podobu čočky dvojvypuklé, jejíž přední část
je méně zakřivena než zadní. Obklopena je zálivky ciliárními. Čočka tato není
homogenní, nýbrž složena z vrstev o nestejné lomivosti a to tak, že index
lomu čím dále do středu čočky, tím více přibývá. Tím je docílena
větší lomivosti než kdyby čočka v téže podobě byla homogenní a měla
lomivost nejvnitřnějšího jádra, a zároveň je odstraněna aberrace sférická.

Prostor mezi rohovkou a čočkou vyplňuje mok vodnatý, průhledný
„humor aqueus," mitřek mezi čočkou a sítnicí kapalina hustší, sklo-
vitá, která slove „humor vitreus." Obě tyto kapaliny jsou úplně obalený
velmi jemnými a průhlednými blanami. Indexy lomu obou zmíněných
kapalin neliší se příliš od indexu lomu vody, naproti tomu úhrnný index lomu

čočky je poněkud větší než u vody.

Dioptrický apparát lidského oka složen je tedy ze čtyř ústředí:
rohovky, moku vodnatého, čočky a sklovatky.


Má-li tento apparát býti přesně (kvantitativně) stanoven, pak je třeba znáti:
především exponenty lomu oněch ústředí,
dále poloměry křivosti oněch ploch sférických
a konečně vzdálenosti jich vrcholů na ose.

Avšak věc komplikuje se ještě více. Čočka není totiž ústředím homogen-
ním — jak jsme dosud předpokládali — nýbrž ústředím, jehož lámavost
stoupá od mejších ploch čočky směrem do jejího nitrka. Je to asi tak,
jakoby čočka ta složena byla z jednotlivých lístků, jichž lámavost je směrem
dovnitř čočky větší. Bylo by tedy přesně vzato, také třeba znáti exponent
lomu vrstev jednotlivých a jich ohraničení.

Aby se však věc co možná zjednodušila, substituujeme na místě oka
skutečného, oko, jak říkáme, schematické.

Především nemusíme ústředí rohovky vůbec bráti v úvahu. Plochy sfé-
rické rohovky jsou totiž vespolek rovnoběžné. Avšak ústředím, rovnoběžnými
plochami omezeným, nenastane
lom, nýbrž jen posunutí paprsku.
K této přičině nestřeba míti zřetele
k tomu, že vlastně plocha rohovky
je z přední oka překrývána slzným
mokem.

ob. 163.



Můžeme tedy rohovku pokládati
za jednoduchou sférickou plochu. Tak
odpadne jedno ústředí a jedna
plocha hraniční.


Dále můžeme čočku pokládati za ústředí homogenní t. j. substituovati
takový index lomu (na místě různých indexů skutečných), kterým by se při
stejném ohraničení čočky dosáhlo téhož účinku dioptrického. Index tento slove totální.

Konstanty zbývajících ploch a útvarů jsou pak následující:

1.) Cornea. Poloměr = 7, 7 mm
2.) Humor aqueus. Exponent lomu = 1, 377
3.) Lens (čočka) Poloměr vnější = 10, 3 mm
" vnitřní = 6, 1 mm
Exponent lomu (totální) = 1, 454.
4.) Corpus vitreum. Exponent lomu = 1, 336
5.) Vzdálenosti vrcholů lámavých ploch sférických.
Cornea . . . . vnější plocha čočky = 3, 4 mm
Vnější plocha čočky . . vnitřní plocha čočky = 4, 0 mm
Vnitřní " " . . . sítnice " " = 14, 6 "

Dle těchto číselných dat kreslíme v obr. 164. „oko schematické" a to jak v rozměrech původních tak i v rozměrech 2 krát zvětšených.

Oko schematické
obr. 164.



Konstrukci lze pak snadno postup paprsku světelného v takovémto oku sledovati.

Avšak ve snaze zjednodušovati optický problém, o kterýž tu jde, postupujeme ještě o krok dále. Na místě oka schematického zavádíme" totiž tak zvané,

oko redukované.

To, oč vlastně jde, jest obraz předmětu na sítnici vznikající. Poznati jeho polohu a velikost, toť je vlastní problém dioptriky. Nespočívá tedy na tom, jak paprsky světelné v skutku okem postupují, nýbrž jak bychom je konstrukcí co nejjednodušeji vedli, abychom dostali týž obraz, jaký vzniká v pravdě postupem paprsků komplikovanějším.

Zjednodušení toto je uvnitř zavedením oněch základních čili kardinálních

bodů a rovin, jakéž charakterisují každý systém dioptrický (na př. čočky) ať již kollektivní nebo disperse.

Především jsou to: roviny hlavní; dále: body (roviny) ohniskové; konečně body uzlové.

Význam těchto rovin a bodů známé. Jich poloha dá se na základě číselných dat dříve uvedených dle jistých vzorců — které zde odvozovati nemůžeme — vypočísti. Nás zajímá především výsledek:

1.) Roviny hlavní. Určí se polohou bodů hlavních na ose. Vzdálenosti jejich od vrcholu rohovky je

= 2, 17 a 2, 57 mm

Vzdálenost obou rovin je tedy: = 0, 40 mm.

2.) Body (roviny) ohniskové. Určí se ohniskovou dálkou počítanou na ose od příslušné hlavní roviny.


První dálka ohnisková je = 15, 00
druhá " " " = 19, 48.

Z toho lze snadno počítati, kde leží — od vrcholu rohovky vycházejíc — ohniskové první (před rohovkou) a druhé (za rohovkou). Dálky ohniskové nejsou zde totožné. To souvisí — jak již svého času bylo řečeno — s tím, že paprsky světelné vycházející ze vzduchu nevracejí se zpět do vzduchu; nýbrž naposledy procházejí tělesem skelným.

3.) Body uzlové. Jich odlehlost od sebe je taková jako odlehlost bodů hlavních od sebe, t. j.

= 0, 40 mm.

obr. 165.



Každý z nich je pak od příslušné hlavní roviny o tolik vzdálen, o kolik je jedna dálka ohnisková rozdílná od druhé, tedy

= 19, 48 − 15, 00 = 4, 48 mm.

Dle těchto číselných dat je postaveno kardinálních rovin a bodů (v sítě 27 sech.

dvojnásobné) v obr. 165. nakresleno.

Uvážíme-li konečně, že vzdálenost jak obou bodů hlavních od sebe, tak i obou bodů uzlových je velmi malá, totiž $\frac{1}{2}$ mm, totiž

$$= 0,40 \text{ mm},$$

můžeme je nechati splynouti v jediný bod hlavní a v jediný bod uzlový, tak že položíme


jedinou hlavní rovinu do vzdálenosti 2,37 od rohovky
jediný bod uzlový " " 4,48 od této roviny hlavní.

K tomu pak přistupují:

první ohnisko F_1 ve vzdálenosti 15,20 od této hlavní roviny v před
druhé " F_2 " " 19,68 " " " " v zad.

Tato soustava tvoří oko redukované (obr. 166).

obr. 166.



Vzpomeneme-li, že jsme pro lom na jediné ploše sférické poloměru r obdrželi rovnici

$$\frac{1}{a} + \frac{n}{b} = \frac{n-1}{r},$$

ze které pro obě dálky ohniskové f_1 a f_2 plyne:

$$b = \infty,\ a = f_1 = \frac{1}{n-1} \cdot r$$

$$a = \infty,\ b = f_2 = \frac{n}{n-1} r$$

čili $$\frac{f_2}{f_1} = n,$$

a že při tom střed této jediné plochy sférické týčež měl vlastnosti jako bod uzlový C, tedy můžeme vyloviti následující větu:

Lom v našem oku děje se tak, jako při jediné lámavé ploše sférické poloměru $r = OC = 4,48$ mm,

která by dělila vzduch od sítnice, jehož exponent lomu je


$$n = \frac{f_2}{f_1} = \frac{19,68}{15,20} = 1,30,$$

což jest téměř exponent lomu sklovatce (corpus vitreum) a co do velikosti téměř tak veliký, jako exponent lomu vody.—

Vidíme tedy, že zavedením „oka redukovaného" dioptrický problem lomu světla v oku je zjednodušen měrou největší. Smíme říci:

Obrazy v oku okulečením vznikají skoro tak, jakoby sklovatec (corpus vitreum) sahal až k jisté ploše sférické mičitě v oku položené (t. j. v mičitém prolomeném a mičitém středu) a jakoby zde ihned hraničil se vzduchem (obr. 167)


obr. 167.



Budiž zde ku konci poznamenáno, že se číselné konstanty oka od různých pozorovatelů poněkud různě uvádějí, čemuž nelze se diviti vzhledem k tomu, že jich stanovení není tak snadné, aby nevznikly chyby pozorovací. Konstanty, jak jsme nyní je uvedli, zdají se býti pravdě nejpodobnějšími.

§ 118. Pokračování. Akkomodace.

Mající oko „redukované" můžeme nyní ke každému zvláštnímu bodu daného předmětu velmi jednoduše jeho obraz. Na místě nákresu prozatímního obr. 168., který je kreslen v rozměrech oka redukovaného původních,



obr. 168.

C je „střední" bod uzlový, F_1 a F_2 obě ohniska.

Z konstrukce plyne poměr mezi velikostí předmětu a obrazu následující:

$$\frac{AA'}{BB'} = \frac{a - f_1}{f_1}$$ z trojúhelníků $AA'F_1$ a F_1SN, $BB' = SN$;

$$\frac{BB'}{AA'} = \frac{b - f_2}{f_2}$$, " $BB'F_2$ a F_2SM, $AA' = SM$.

Z čehož pak dále plyne:

$$(a-f_1)(b-f_2) = f_1 f_2 .$$

(srovnej §60)

Z relací těchto je možno velikost obrázku v oku vznikajícího ze vzdálenosti jeho a pře okem vypočísti. Obrázek tento, reálný a obrácený, je vždycky zmenšený; neboť je vždy

$$a > 2 f_1 .$$

Pro $a = 2 f_1 =$ asi 30 mm bylo by $B B' = A A'$.

Důležitá je však) poznámka následující:

Při učitém exponentu lomu n a poloměru r byla by dálka obrazu b měniva s dálkou předmětu a. Kdyby tyto nebyly by jsa velmi veliké, považovaly jsme a vždy velmi značná, a je známo, že když a dostoupí jisté velikosti, pak další jeho vzrůstání není již tak značného vlivu na dálku b.

Oko normální čili, jak říkáme, emmetropické je tak způsobeno, že ve stavu klidu obraz F_2 padne do sítnice. Jinak řečeno: předměty velice (nekonečně) vzdálené zobrazí se na sítnici, a tudíž je oko vidí zřetelně. Z toho plynulo by mimo to, že při vzdálenostech a menších by obraz předmětů padl za sítnici.

Tvrdí však tomu není tak. Oko vyniká tou vlastností, že jeho optický apparát není, abychom tak řekli, ztuhlý, že může optické své konstanty poněkud měniti, tak aby i při menších vzdálenostech a obraz padl na sítnici. Vlastnost tuto zoveme akkomodací oka. Říkáme tedy, že oko akkomoduje na vzdálenosti a menší. Akkomodace tato má ovšem své konečné meze; jde až k určité hodnotě minimální veličiny a, kteráž se u oka emmetropického udává asi na 12 až 10 cm (t. j. asi ohniskovou dálka ohniskovou f_1).


Základ akkomodace oka spočívá v jeho možnosti zakřivenost čočky poněkud zvětšovati. Při velmi velké vzdálenosti a je akkomodační apparát v klidu. Stává-li se vzdálenost a menší, pak zvětšuje se zakřivení čočky, kteráž tím stává se silnější, následkem toho padne obraz i předmětů málo vzdálených na sítnici.

Jaký je mechanismus této možnosti akkomodační, vyvětlíme se blíže ve fysiologii. Zde budiž jen tolik poznamenáno, že se vlastními svaly zakřivení

čočky zvětšuje a sice nikoliv na obou její plochách, nýbrž hlavně na její ploše přední. Čočka jakoby vystupuje tím blíže k rohovce.

Na základě akkomodace stává se konstrukce obrazů ještě zase jednodušší, než jak dosud bylo udáváno. Neboť víme-li, že obraz vždycky vzniká na sítnici, pak máme úlohu velice zjednodušenou; znajíc totiž tuto plochu pro jakéhokoli, můžeme vésti jen hlavní paprsky, t. j. paprsky středním bodem valovým C procházející a kde tyto protínají sítnici, tam vznikne obraz B' B" daného předmětu A A" (obr. 169). Tím nabývá střední valový bod C zvláštní důležitosti. Paprsky jím vedené zovememe paprsky zornými;

obr. 169.



jich úhel rovné se úhlem zorným.

Třeba zbytečno připomenouti, že tyto „paprsky zorné" mají význam jen geometrický — ve skutečnosti nejde žádný paprsek tak, jak u zvaného paprsku kreslíme — ale ovšem obraz vzniká tak, jakoby paprsky zorné v skutku tak šly, jak je kreslíme.

§119. Ammetropie. Brejle.

Jak jsme v § předcházejícím vykládali, vidí oko emmetropické ostře ve vzdálenosti

$$a = \infty \ldots \text{asi } 10 \text{ cm}.$$

Jeho akkomodace je dokonalá.

Avšak ne každé oko jest emmetropické; říkáme pak, že je ammetropické.

Ammetropie oka jeví se však ve dvojím — jakoži opačném — smyslu, buď co myopie (krátkozrakost) neb co přestrojpie (dalekozrakost);

jiné výrazy jsou: brachymetropie a hypermetropie.

Vždyť předevšim, jak se rozdíly tyto ukazují, je-li akkomodační apparát oka v klidu.

Oko emmetropické spojuje tu na sítnici papsky rovnoběžné; oko myopické však papsky divergentní, naproti tomu oko presbyopické papsky konvergentní.

Jinak řečeno: oko emmetropické vidí v klidu vždy předměty nekonečně vzdálené, oku myopickému musí tyto předměty býti přivedeny blíže až do jisté vzdálenosti, aby je — bez akkomodace — zřetelně vidělo, tak že papsky dopadají na oko divergentně. Naopak musí oku presbyopickému býti předmět ještě do větší dálky oddálen než je dálka nekonečná, aby jsouc v klidu je zřetelně vidělo — což má ovšem smysl optický, nikoliv skutečný — aby totiž papsky dopadaly konvergentně, jakoby mířily k předmětu za okem.

Bod, který oko zřetelně vidí, když jeho akkomodační apparát je v klidu, nazývá se punctum remotum; jeho oddálenost od oka = R

Blíží-li se bod takový oku, musí oko akkomodovati, a to měrou tím větší, čím více bod oku více se blíží — až k jisté minimální od oka vzdálenosti, přes kterou akkomodace již dále stupňována býti nemůže. Bod, který zde ještě oko zřetelně vidí, zove se punktum proximum, a oddálenost jeho od oka = P.

Differenze $R - P$ označuje akkomodační interwall oka.

U oka myopického přibližují se oba body blíže k oku, zejména bod R až na vzdálenost jen několika metrů, ba mnohdy jen decimetrů — následkem čehož akkomodační interwall $R - P$ mnohem zkrátí. Posunutí bodu P k oku blíže je již poměrně malé (10 cm až 8 cm).

U oka presbyopického přibližují se oba body od oka dále, čímž Pozstane negativní — akkomodační interwall zůstává velmi velikým jako u oka emmetropického, od něhož se oko presbyopické tím rozličuje, že pro vzdálenost ∞ musí již akkomodovati a že P je značně větší.

Pokud se předmět, na nějž oko zírá, nalézá v jeho akkomodačním intervallu, vidí je zřetelně. Když předmět je mimo akkomodační interwall, tedy zejména u oka krátkozrakého ve větší dálce než je R, a u oka dalekozrakého v menší než je P, musí se oku pomáhati brejlemi, aby se, jak říkáme, korrigovalo.

U oka krátkozrakého postačí, když se brejlemi nekonečně vzdálené předměty optický přivedou do vzdálenosti R. To se děje čočkou rozptylnou. Dálka R je pak přímo její dálka ohnisková. Oko vidí pak nekonečně vzdálené předměty zřetelně a jeho akkomodační apparát je v klidu. Jsou-li předměty blíže, může s brejlemi akkomodací je též zřetelně viděti. Netřeba však brejlí, když předmět přibližuje se oku tak, že již padne do akkomodačního intervallu.

U oka dalekozrakého není ovšem pro velkou dálku brejlí potřeba: oko si pomůže akkomodací. Ale pro blízkost je jich potřeba, aby, když je předmět oku blíže než P, brejlemi se posunul opticky do vzdálenosti větší než P. To se děje čočkami spojnými. Dálka ohnisková volí se tak, aby oku se posunul předmět do dálky $> P$, při níž oko bez značného namáhání ještě akkomodovje. Počtem se tyto věci nedají zjistiti nýbrž nejlépe pokusem.

Číslem brejlí zvala se dříve dálka ohnisková f v pařížských palcích. Nyní se zavádí jich optická mohutnost $\frac{1}{f}$ v dioptriích.

V tomto smyslu mluví se též o síle optické oka našeho. Poněvadž zde je $f_2 = 19{,}48$ mm čili $0{,}0195$ m, jest


$$\frac{1}{f_2} = \frac{1}{0{,}0195} = 51{,}3 \text{ dioptrie.}$$

Vedle zmíněných vad zrakových zavinuje nesymmetrické uspořádání oka kolem jeho osy optické vadu, kterou nazýváme astigmatismem. Díváme-li se, majíce oči akkomodovány na předměty blízké, na vzdálený jasně svítící (neb osvětlený) bod, nespatřujeme jasný kruhový kotouček, jakovýchom očekávali, nýbrž obrázek hvězdovitý, který zdá se nám několik radiálně vycházejících paprsků vysílati. Při světle bílém ukazují se okraje obrázku modře orouleny, vnitřek je do červenožluta

zabarvený. Příklady tohoto zjevu známe při pozorování hvězd poutým okem nebo světel v noci zvětší vzdálenosti. Naopak, je-li oko akkomodováno na větší vzdálenost než ve které se nalézá světlý bod, vznikají podobné úkazy hvězdovité.

V některých případech je příčinou těchto úkazů vlhkost pohovky, mrkacím oka zjevy ty mizí, nejčastěji však zaviněny jsou nepravidelnostmi oka samého, pak nazýváme je irregulárním astigmatismem. Tento astigmatismus irregulární nelze opticky nijak korrigovati. Častějším - vlastně téměř všeobecným jest astigmatismus regulární záležející v nesymmetrické křivosti lámavých ploch v oku vdolělých od sebe různá ústředí. Tato vada oka je příčinou, že téměř žádné oko nemůže viděti zřetelně zároveň příčky horizontální a vertikální. Díváme-li se na obr. 170, zpozorujeme některé příčky ostře, jiné za to velmi nezřetelně.

Obr. 170.



Tento astigmatismus lze tak zvanými čočkami astigmatickými odstraniti.

Chromatická vada oka vystupuje jen při velmi intensivním světlení anebo za zvláštních poměrů světlení. Již Fraunhofer (1814) pozoroval při zkoumání spektra dalekohledem, že umístí okuláre nitkovým křížem více přiblížiti ve světle fialovém nežli v červeném, chtěl-li spatřiti nitkový kříž ostře. Sférická vada je velmi nepatrna.

§ 120. O vztazích mezi dojmy zrakovými a jich vnější příčinou.

Obrázky světelné vznikající na sítnici oka přicházejí ke vědomí našemu v tom zvláštním způsobu, že se dojem jimi způsobený ihned promítá s úsudkem o jich příčině vnější.

Tomuto promítání nezkáme od nejútlejšího mládí, co roste s námi, stává se nám druhou přirozeností. O vlastním dojmu na sítnici my tedy ničeho nevíme — nýbrž dojem ten promítáme ihned na venek — a důsledně činíme tak i tehda, když dojem ten ani nevzniká příčinou vnější, nýbrž i jinými procesy na sítnici samé. Vznikne-li tudíž na sítnici obrázek vnějšího nějakého předmětu, my ihned na místě jeho substituujeme originál ve vnější míru a při tom činíme od nejútlejšího mládí, od prvního počátku vidění, samo sebou rozuměnost, že ty části obrázku, které v oku jsou „dole", odpovídají částem originálu, o nichž říkáme, že jsou „nahoře". Otázka, proč nevidíme předměty „obrácené", postrádá tedy při bližším zkoumání všeho základu.

Jiná však otázka je velmi zajímavá a důležitá. Všechny obrázky na sítnici vznikající leží na ploše sítnice vedle sebe. Dle toho zdálo by se, že také předměty jim ve vnější odpovídající, musíme viděti na ploše vedle sebe t. j. ve stejné vzdálenosti. Tomu však není tak, ale jakživ jsme anebo lépe řečeno očima máme názor světa prostorový, tedy je základem názoru toho opět rozeznávání vzdáleností. Proto vidíme slunce a měsíc a veškeré hvězdy ve stejné vzdálenosti, všechny jakoby vedle sebe na téže (sférické) ploše, ačkoliv jsou v prostoru od sebe nesmírně různě vzdáleny.

Při rozeznávání vzdáleností jsou nám vodítkem mnohé okolnosti, jimiž se tato rozeznávání usnadňuje.

Především uvádíme akkomodaci. Oko emmetropické, jehož akkomodační ústrojí — svaly akkomodační — je v klidu, vidí zřetelně předměty ve velké dálce se nalézající. Ten měřou, kterou jiné předměty oku bližšími jsou, musí oko akkomodovati, aby také tyto předměty zřetelně viděla; můžeme tedy námahu akkomodační býti jakousi pomůckou při odhadování vzdáleností; ovšem je tato pomůcka ve valné vydatná. Důležitější je již t. zv. úhel, tohož úhel, jejž uzavírají krajní paprsky vedené uzlovým bodem; úhlem tímto je měřena velikost obrázku na sítnici a tím i velikost předmětu vzdáleného.

Vzdaluje-li se určitý předmět od oka, stává se zorný úhel menším, a tím i obrázek předmětu na sítnici. Vidíme-li tedy jistý předmět, který nám je znám, v úhlu zorném velmi malém, soudíme, že je předmět tento velmi vzdálený. Kde však předmět nám není znám, přestává také poznávání vzdálenosti dle zorného úhlu. Slunce a měsíc, které oba vidíme v témže zorném úhlu, asi ½°, zdají se nám býti stejně vzdáleny, poněvadž nevíme se zkušenosti, že jsou různě veliké; s tím souvisí zase, že na př. měsíc při východu svém i při západu, kde jej klademe do větší vzdálenosti, jeví se býti větším; a vzdálenější zdá se nám býti proto, poněvadž mezi ním a sebou vidíme množství předmětů pozemských, dle nichž soudíme stejně, že ona tělesa nebeská jsou velice daleko; když se nalézají ve větší výšce na obloze, schází oku takové přirovnání a proto jeví se nám býti bliže. S tím souvisí též tvar oblohy nebeské, která se nám nezdá býti koulí, nýbrž jakoby klenutím v nejvyšších místech ztlačeným. — Při poznávání vzdálenosti předmětů nám dobře známých, jako domů, stromů, lidí, zvířat atd., na základě zorného úhlu napomáhá též ta okolnost, že známé tyto předměty, jsou-li vzdálené, vidíme méně zřetelně — podrobnosti nelze nám jednotlivé — jenom obrysy hlavní vystupují. S tím souvisí opět, že když vyjímečně jisté předměty známé vidíme jasněji a zřetelněji — následkem na př. osvětlení silného při požáru v noci a pod. anebo následkem zvláštní průhlednosti vzduchu — že pak předměty takové zdají se nám býti bližšími. Tak zdají se nám býti vzdálené hory bližšími a vyššími, je-li vzduch průhlednější. To vše, co zde řečeno platí již při vidění monokulárním — při vidění binokulárním přistupuje k tomu též úhel tak zvaný oční čili konvergenční, který tvoří osy obou očí zrajících ku předmětu pozorovanému; také dle tohoto úhlu lze vzdálenosti poněkud posuzovati. Důležitější je ještě ta okolnost, že perspektivní obrázky v obou očích jsou tím různější, čím bližší předmět očím jest. Proto lze též naopak názor prostorový vzbuditi obrazy, jimiž říkáme stereoskopické; proto je stereoskop nazván též nejlepším tohoto důkazem, že názor prostorový vzniká hlavně viděním binokulárním.

2.) Počet světelný prostírá při podráždění nervu zrakového nejen světlem, nýbrž i mechanickými příčinami. Ťuk uhozen do oka, náhlý pohyb oka vyvolávají pocity světelné, zvláště pak elektrická jiskra vzbuzuje intensivní pocit světelný.

Místo na kterém se podráždění nervu děje, jsou malé políčky sítnice, jichž průměr obnáší asi 0,002 mm; rozsah pocitu světelného souvisí patrně s velikostí obrázku na sítnici. Z rozměru výše udaného lze počítati nejmenší zorný úhel, předmětu, který ještě rozeznáváme. Počet dává 30". Menší předměty, jichž zorný úhel obnáší méně než 30," mohou však býti také viděny, když jsou dostatečně intensivně osvětleny, takže se podráždění dopadající na část povrchu políčky sítnicové rozdílí po celé ploše. Ťak lze na př. viděti stříbrný drát na tmavém pozadí i při zorném úhlu 2," některé stálice i při úhlu menším než 1."

Také <u>určitost</u> pocitu světelného je poněkud závislá na povaze sítnice — nemohou patrně býti viděny dva body oddělené je-li jich vzdálenost taková, že obrázky jich padají na týž element sítnice.


<u>Intensita</u> pocitu světelného souvisí s citlivostí a dokonalostí oka, s <u>intensitou osvětlení</u> předmětu a s <u>barvou</u> světlení. Při obyčejném osvětlení (t. j. takovém, na které je oko nejvíce) rozeznává oko nejlepší nuance světelné intensity), stoupá neb klesá-li intensita světlení v řadě geometrické, měnívá se možnost dojmů v řadě arithmetické (Fechnerův zákon psychofysický) ovšem až do jistých mezí. Nejmenší změna intensity, kterou oko ještě rozeznává, je ⅓67 až 0,77 %. Stín způsobený světlem měsíčním mizí ve světle lampy, stín způsobený touto mizí ve světle denním. Hvězd vedle sluce nevidíme. Dle Younga - Helmholtze je oko normální <u>trichromatické</u>, t. j. obsahuje tři druhy nervů zrakových vedle sebe, a každý reaguje <u>hlavně</u> na barvu pro <u>základní</u>: zvlášť červenou, zvlášť zelenou, zvlášť fialovou — na ostatní barvy reaguje <u>méně</u> dle křivek v obr. 171.

Abnormální oko: <u>dichromatické</u>

velmi zřídka: <u>monochromatické</u>,

které by se podobalo jako praeparované desce fotografické.


Dle bádání, jež provedli A. König a Dietrici a William Pole v Edinburghu
ním je dichromat, nelze předpokládati, že oko dichromatickému chybí
jeden ze základních druhů nervů – a tudíž jedna barva, – neboť by pak dojem
bílého nebyl možný – musí to tedy býti druhy nervů pro barvy
komplementární žluté + modré.
(viz Himmel und Erde 1894/5, str. 101).




ob. 171.

2.) Irradiace (Képler 1604)

Na obr. 172 zdají se bílé čtverce větší
než černé, ačkoliv jsou přece stejné, vedle
toho bílé plochy stýkající se (obr. 173.)
zdají se splývati, kdežto tmavé zdají se
býti odděleny. Úkaz tento nazýváme
irradiací. Vyskytá zvláště při nedokonalé
akkomodaci oka, ale i při normální
akkomodaci povstává, zavinění tím, že se na
sítnici podrážděná větší
místa, než která geometrickému obrázku odpovídají.
Příkladem jsou: Černý čmý
drát mříže pozorován jsa
proti jasnému plamenu.
Špiček měsíce zdá se odpo-
vídati většímu poloměru než
ostatní tmavá část měsíce. Lidé zdají se v černých šatech štíhlejší než ve světlých atd.


ob. 172.


ob. 173.

3.) Trvání dojmu zrakového.

Dojem zrakový trvá i potom, když příčina jeho, světelný popud, přestal.
Trvání toto je tím menší, čím bylo světlo působící intensivnější a čím méně
oko bylo unaveno. Se zmenšením světla nabývá více dojmu zbylého rychleji než při světle
méně intensivním, ale v převážné případě trvání dojmu je delší. Jdeme dále ve
trvání na barvě světla, nejvíce působí světlo bílé, pak žluté, červené a nejkratčeji

trvá dojem zbylý po světle modrém. Opakují-li se podobné popudy světelné
v intervallu kratším, nežli je trvání dojmu zrakového, má oko dojem světla
nepřetržitého (intermittující zdroje světelné). Na tom zakládají se světelné
thaumatropy, stroboskopy, zootropy, fenakistoskopy atd.

Podrážděný nerv na sítnici mění se na dotčeném místě ponenáhlu jeho
citlivost, oko je na tom místě unaveno. Místa postižená intensivnějším osvětlením
jsou více unavena než místa méně osvětlená. Při novém dojmu zrakovém budou
tedy některá místa méně citlivá a některá více. Jakmile přestane první popud
zraku, vzniká obraz v stínech a světlech s předmětem souhlasný, po druhém
přetrvaném popudu světelném vznikne však obraz ve stínech a světlech v po-
rovnání s předmětem převrácený, negativní.

Zavřeme-li oči, abychom všechny dojmy světelné zmařili, a podíváme-li
se na krátký čas na okno, ukáže se positivní trvání dojmu zrakového při
opětném otevření víček. Díváme-li se však delší čas 5–10 sec. na okno,
pak při zavření očí zmizí positivní trvání velmi brzy a objeví se negativní
obraz, který potrvá až i 10 minut.

Díváme-li se na kus černého papíru na šedé ploše položeného, který pak
náhle vzdálíme, vidíme místo, kde papír byl, světlejším než okolní půdu na
důkaz, že část sítnice více podrážděná je unavena více než část, na kterou
velmi málo světla dopadalo.

Při pozorování předmětů barevných obdržíme takovým způsobem zdojmu
barev komplementárních; má tedy sítnice elementy citlivé pro různé barvy –
jsou-li unavený elementy pro jistou barvu, ukazuje se citlivost neunavených
právě tímto dojmem barvy komplementární.

4.) Kontrast.


Kontrastem nazýváme působení různých barev neb ploch nestejné intensity, které jsou
vedle sebe a které najednou nebo po sobě pozorujeme. Dle toho, jeli pozorování barev
neb různých intensit současné, jmenuje se kontrast simultánní, je-li složeno z dojmů
po sobě následujících, buje kontrast successivní. Bříchá nazývá barvu
kontrastem vyvolanou indukovanou, barvu, která jest její příčinou indukující.

Zjevy kontrastu ... ...ického mají svůj původ v zemdlení oka jako komplementární zjevy při tvrdém dojmu zrakového. Díváme-li se na pole barvy žluté, unaví se oko pro tu barvu, a proto nemůže potom z bílé desky tuto barvu tak plně přijímati jako barvy ostatní — výsledek toho je, že vidí onu bílou desku zabarvenou modře. Je-li deska druhá nikolivěk bílá, ale také žlutá, objeví se kontrast tím způsobem, že se nám deska zdá býti bělavou, je-li zabarvena komplementárně modře, pak se stane sytější kontrastem.


Simultání kontrast je dle Helmholtze nikolivěk změna dojmu, ale změna úsudku o něm. Tak na př. zdá se, že rovnoběžky ve výkresu 174. se rozbíhají, poněvadž jimi jsou střídavě vedeny různky divergentní.

Otáčíme-li výkresem 175 (viz Plateau), tak že střed jeho zůstane malý kruh, zdá se, že se všechny koncentrické kruhy otáčejí v jednom směru, mimo pak oranžový kolíček ve směru opačném.

ob. 174.



ob. 175.



Zajímavy jsou kontrasty simultání při pozorování barev. Představme si tyčinku kolmo na bílé ploše stojící, která vrhá dvojí stín, jeden spůsobený denním světlem, druhý světlem svíčky. Stín denním světlem vržený zdá se nám žlutočervený, druhý stín namodralý. Lze jednoduchým pokusem ukázati, že ona modrá barva je pouze zdánlivá,

že jest jen kontrastním úsudkem naším. Díváme-li se totiž trubicí (uvnitř přemalovanou) tak, že v poli zorném je část bílé plochy, část pak onoho žlutého svíčkou, je tento stín stále modrý, přiměme-li trubici tak, že stín onen vyplňuje celé zorné pole je stále modrým, i když se svíčka zhasne, — ona barva zmizí teprve, když trubici od oka vzdálíme.

VIII. Optika meteorologická.


§ 121. Refrakce astronomická.

Do tohoto oddělení náleží ty zjevy optické, se kterými v přírodě se setkáváme, a mezi nimi nejdůležitější jsou astronomická refrakce, přízemní refrakce (fatamorgana), kola kolem měsíce a slunce, vedlejší slunce atd.

Astronomická refrakce. Světlo, které k naší zemi od slunce, neb ostatních těles nebeských přichází, prochází atmosferou naší země, vzduchem, jehož hmotné částky se v různých vrstvách táží, které však od země do výše ubývají.

Přichází-li od stálice S (obr. 176) paprsek $S B_1$, láme se dopadnuv na vrstvu hmotných částek měnou $B_1 B_2$ a pokračuje na následující vrstvě částek měnou $B_2 B_3$ a tak dále, tak že dopadne do oka pozorovatele stojícího v A měnou $B_n A$, v níž pozorovatel hvězdu vidí.

obr. 176.



Odchýlí se tedy paprsek původní SB_1 o úhel $S'AS''$, a tento úhel nazýváme astronomickou refrakcí.

Vzájemná změna v refrakci astronomické nalézá se ve spise Cleomedově, kde se vyjímá z zatmění měsíce, které bylo pozorováno, ačkoliv současně slunce i měsíc byly nad obzorem.

Záleží tedy refrakce astronomická na lomu paprsků světelných vrstvami vzduchovými a řídí se její velikost jednak dle zákona lomu, jednak dle prostředí

vrstev vzduchových úhlů, určitěji řečeno, dle způsobu, jakým hustoty a tím i lomivosti vzduchu přibývá, blížíme-li se k povrchu zemskému. Dále jednodušení předpokládáme, že tvar země je kulový a že také vrstvy vzduchové jsou kulové, t. j. že v stejné výšce nalézá se všude vzduch téhož optických vlastností.

Z toho ihned následuje, že refrakce astronomická nemůže je pozorovací těleso v zenitu (proměřovací papratky dopadají kolmo na vrstvy vzduchové), dále že v stejných výškách (aneb vzdálenostech zenitových) je stejně veliká refrakce a konečně že při obzoru je tato refrakce maximálnou. Co se týče změny indexu lomu vzduchu s výškou, předpokládáme ponejprv, že je spojitou — tím směrem bude dráha paprsku skutečná křivka — nikoliv lomenou přímkou, jak v obr. 176 naznačeno.

Úkol atmosférickou refrakci k účelům astronomickým přesně zkoumati a zdánlivé prvce hvězd příslušnými korrekcemi na pravé prvce počítati, náleží k nejnesnadnějším problémům mathematicko-fysikálním, kteréž vůbec jsou. Příčinou toho je, že vzduch náš je prostředím, jehož optická povaha (láměravost) následkem vlivů tepla, tlaku, vodních par atd. dalším změnám je podrobena. Proto také je pravidlem v astronomii praktické někdy nepozorovati hvězdy blízko horizontu za účely quantitativními, poněvadž zde refrakce je velmi značná. Následující tabulka dává o tom ponětí; je z ní viděti, jak asi střední refrakce postupuje se vzdáleností zenitovou.

Tabulka astronomické refrakce pro exponent lomu

$n = 1{,}00028$ čili pro tlak 760 mm Hg 0° a 10° C


Zdánlivá vzdálenost zenitová	atmosf. refrakce	Zdánlivá vzdál. zenitová	atmosf. refrakce	Zdánlivá vzdál. zenitová	atmosf. refrakce
5°	5,1″	40°	43,3″	80°	5′ 18,9″
10°	10,3	50	1′ 9,3″	85	9 49,8
15°	21,2	60	1 40,6	87	14 21,8
20°	33,6	70	2 38,6	89	24 36,7
				90	35 24,2

Ustrojsen pozorování prvic hvězd v astronomii na rozvýšce do vzdálenosti zenitové asi 70°.

§ 122. Fata morgana.

Všeobecně ubývá hustoty vzduchu, vzdalujeme-li se od povrchu zemského. Dává se vždy v pováženích, že se vzduch země se dotýkající od vyhřátého písku tak ohřeje, že jsou vrstvy dolejší řidší než vrstvy hořejší. Hustoty vzduchu pak až do jisté výše přibývá a pak teprve ubývá. Tam, kde je hustota vzduchu maximální, je index lomu jakoby nejmenšený.

obr. 177.



Šlechť (obr. 177.) pozorovatel V a předmět, na který se dívá, P, nalézají se oba nad vrstvou maximální hustoty $\Sigma\Sigma'$, pak některé paprsky refrakcí ve vrstvách hořejších přicházejí do oka posledními směrem křivky SBO, jiné po případě posledním směrem křivky SBO, která musí obsahovati bod obratu ve vrstvě $\Sigma\Sigma'$. Stane se tedy, že pozorovatel vidí obraz předmětu poněkud výše nežli je skutečně a to zpřímený — jindy zase poněkud níže a to převrácený. Tak povstává zjev, „fata morgana" zvaný, známý na př. z francouzské výpravy do Egypta a z J. M. Bernatzových pozorování v Alexandrii.

Půda pevného Egypta podobá se rozsáhlé rovině, po které se vody Nilu v čas rozvodnění jako jezero rozlévají. Na březích řeky a dále až ke krajům povodí zdvihají se mírné pahrbky, na nichž jsou patrny bílé domky vesnic. Obyčejně je vzduch klidný a průhledný. Při východu slunce spatřuje se předměty na obzoru ostře a jasně, s vystupujícím slunce však stoupá temperatura vzduchu, půda se silně paprsky slunečními zahřívá a dolejší vrstvy vzduchové, přijímající tuto vyšší teplotu, ukazují onen třesavý pohyb, jenž velmi dobře patrný, a i nám z letních pamětí dnů známý. Jsou-li vrstvy pak vrstvy vzduchové nehybně leží jedna na druhé a zjev fata morgana ukáže se v celé své kráse. Pozorovatel dívající se dálky spatřuje tam ještě přímý obraz věcí vzpřímený, pod těmi však vidí jich převrácený obraz, mezi by

pozemávati půdy, na které ony předměty stojí. Všechny tyto předměty zdají se nyní vznášeti se v ohromném moři. Jižer tento byl velmi ukrutným divadlem pro francouzské vojáky za výpravy Napoleonovy do Egypta. O daleka viděli obrácený obraz domů a palem, i domnívali se, že spatřují tento obraz kdesi v hlubině velikého jezera. Unavení namáhavými pochody, žárem slunečním, žíznící, dýchající horký vzduch plný písku, běželi vstříc mnohoslibnému břehu — ale ten unikal jich toužívým zrakům — byly to pouhé vrstvy rozpálěného vzduchu, které zrcadlily obraz nebe a vyvýšenin pevné. Jižer ten pak obyčejně náhle zmizel. (Viz Flammarion „L'atmosphère").

Podobný jižer na konci papesků různými vrstvami vzduchovými založený pozoroval Vincc 6. srpna 1806 večer v $7^{\frac{1}{4}}$ a to dívaje se z Ramsgate k Doveru dalekohledem. Obyčejně spatřoval čtyři hroty zámeckých věží Doverských, ostatní část budovy zakrývá totiž hřbet horský. Druhého večera však spatřil celý zámek až k zemi.

[* § 123. Duha. *]


[* Již roku 1611. Antonius de Dominis, biskup Spalatrovský ve spise „De radiis visus et lucis" vysvětluje povstání duhy dvojnásobným lomem a vnitřním odrazem slunečního světla v kapkách deštových.

Descartes přidržuje se tohoto vysvětlení ukázal pokusem, naplniv skleněné koule vodou a přiměřeně je přeostavuje, „duhu" smělou.

Newton odstranil theorii duhy vysvětlením barev rozptýlením světla. Úplnou theorii založenou na mnohých větách optiky theoretické podal Airy.

Dopadá-li slunečný paprsek SP na kapku vody $QRPP$, tu se částečně odrazí (do směru PP'), ale také částečně láme a rozkládá, a prochází ve směru PQ kapkou vody, aby opětně u Q z části znova se lomil a vyšel ve směru QQ' a z části odrazil se ve směru QR teprve zde kapku ve směru RR' opustil.

Takových vnitřních odrazů může býti i více, jak to ukazuje chod paprsku ve směru RTT.



Obr. 178.

Pozorujme ponze ty paprsky, které v jisté rovině symmetrie (rovina jdoucí rovnoběžnými paprsky SO a SP) leží a uvnitř kapky je jedenkráte se odrazí — representantem těchto paprsků je tedy v výkresu $SPQRR'$.

Je patrno, že všechny paprsky uvažované nevyjdou v témže směru, neboť deviace bude záviseti na úhlu dopadu, jenž bude tím větší, čím více paprsek SP se vzdálí od SO. Úchylka (deviace) bude se měniti však) pro jisté úhly dopadu nejvíce tak, že paprsky z kapky vycházející budou pro jistý směr nejintensivnějšími. Tento směr, postihnutý deviací musí v tom případě býti maximální nebo minimální.

Z toho, co dříve při lomu hranolem bylo řečeno, vyvítá, že paprsky nejintensivnější vycházejí ve směru, který je dán deviací minimální.

Je-li slunečními paprsky osvětlen celé množství kapek, pak ty kapky, které jsou tak postaveny, že vysílají do oka pozorovatelova právě paprsky nejméně uchýlené, budou se jeviti nejsvětlejšími. Úkaz tento platí pro všechny roviny proložené slunce a okem pozorovatele, a proto utvoří ony nejvíce svítící kapky oblouk kruhový, jehož střed leží na přímce, spojující slunce a oko pozorovatele, a jehož poloměr bude souviseti s exponentem lomu.

Poněvadž však exponent lomu pro světlo fialové je největší a postupně pro ostatní barvy menší, až zase pro červené nejmenší, bude poloměr onoho oblouku pro každé světlo rozdílný a povstane široký pruh spektrální.

Úchylku paprsku, je-li index lomu n a m-násobný vnitřní odraz uvnitř kapky vypočítáme postupně takto:

Úchylka u P je $\alpha - \beta$. — U Q je úhel dopadu β a proto úchylka paprsků u Q odvážených je $\pi - 2\beta$. — U R je opět úhel dopadu β

a proto úhel, pod kterým paprsek kapkou vyjde, opět α.

Je tedy celková deviace pro m-násobným odrazem:

$$\delta = 2(\alpha - \beta) + m(\pi - 2\beta) \quad \ldots\ldots\ldots (1)$$

Nejintensivnější paprsky jsou ty, pro něž je δ minimum

Abychom nalezli příslušný úhel dopadu, derivujme δ dle α a položme $\frac{d\delta}{d\alpha} = 0$; tím povstane:

$$0 = 1 - (m+1)\frac{d\beta}{d\alpha} \quad \ldots\ldots\ldots (2)$$

Z rovnice $\sin\alpha = n \sin\beta$ pravidelně

$$\cos\alpha = n\cos\beta \frac{d\beta}{d\alpha} \quad \ldots\ldots\ldots (3)$$

Spojením (1) a (2)

$$n\cos\beta = (m+1)\cos\alpha \quad \ldots\ldots\ldots (4)$$

Rovnici tuto umocníme na 2. mocninu a sečteme ji se čtvercem rovnice $n \sin\beta = \sin\alpha$. Tím povstane:

$$n^2 = (m+1)^2 \cos^2\alpha + \sin^2\alpha$$

čili

$$\cos\alpha = \sqrt{\frac{n^2-1}{m^2+2m}} \quad \ldots\ldots\ldots (5).$$

Veličina α leží mezi 0 a $\frac{\pi}{2}$; má tudíž tento výraz jen jedinou hodnotu.

Exponent lomu vody je přibližně asi $\frac{4}{3}$; má-li α míti hodnotu reálnou, musí jmenovatel zlomku (rovnice 5) býti větší než čitatel:

$$m^2 + 2m > n^2 - 1$$

čili

$$(m+1)^2 > n^2$$

aneb

$$m + 1 > \frac{4}{3}$$

Musí tedy nejméně <u>jeden</u> vnitřní odraz nastati, v tom případě

$$\cos\alpha_1 = \sqrt{\frac{7}{27}}$$

čili

$$\alpha_1 = 75°.$$

Sled paprsků vzhledem k vzdálenosti jich lomovosti odvodíme z rovnic (1) a (4).

Píšeme (1) ve formě: $\delta = m\pi + 2\alpha(m+1) - \beta$

$$\frac{d\delta}{dn} = 2\left\{\frac{d\alpha}{dn} - (m+1)\frac{d\beta}{dn}\right\}$$

Z rovnice $\sin\alpha = \sin\beta$ vyplývá podobně

$$\cos\alpha \frac{d\alpha}{dn} = n\cos\beta \frac{d\beta}{dn} + \sin\beta,$$

a tudíž

$$\frac{d\delta}{dn} = \frac{2}{\cos\alpha}\left\{\sin\beta + \left[n\cos\beta - (m+1)\cos\alpha\right]\frac{d\beta}{dn}\right\}$$

$$\frac{d\delta}{dn} = \frac{2\sin\beta}{\cos\alpha} - \frac{2}{n}\operatorname{tg}\alpha \quad \ldots\ldots (6)$$

Jest tedy $\frac{d\delta}{dn}$ pravidelně, to znamená, že odchylky přibývá, vzrůstá-li index lomu, čili odchylka pro paprsky fialové je největší, pro paprsky červené nejmenší.

Všimněme blíže, že pro vznik duhy je nejméně jednoho vnitřního odrazu potřebí — každým dalším odrazem mizí vždy něco světla z jiného směru, tak že duhy pro druhém, třetím atd. vnitřním odrazu vzniklé jsou stále méně a méně intensivní.

Duha, která vzniká pouze jediným odrazem vnitřním, slyje <u>duha hlavní.</u>

Úhel dopadu lze tu počítati dle $\cos\alpha = \sqrt{\frac{n^2-1}{3}}$,

deviaci pak dle $\delta = 2(\alpha - \beta) + \pi - 2\beta$.

Učiníme-li index lomu vody pro čáru B . . . 1,33096

H . . . 1,34417,

pak $\alpha = 59°,526$ . . . B . . . $\beta = 40°,356$


$= 58,765$ . . . H . . . $= 39,503$,

a tudíž δ pro B . . . $137°,628$

pro H . . . $139°,518$.

Jsi-li v O (obr. 179) oko pozorovatele, $\angle OS$ mezi paprsky slunečními, je-li dále $\angle POB = 137°,628$ a $\angle POH = 139°,518$, pak přímky HO a BO

Ob. 179.



udávají směry, v nichž přicházejí do oka nejintensivnější paprsky fialové a červené. V úhlu H O B spatřuje se pak ostatní barvy.

Otáčíme-li celý systém kolem OS, pak je zřejmo, že všechny kapky, které leží na plášti kužele otočením se BO kolem SO vzniklého, vysílají nejintensivnější paprsky ~~paprsky~~ červené do oka pozorovatelova, jakož že všechny kapky na plášti kuželovém, povstalém otočením se přímky HO kolem SO, vysílají nejintensivnější paprsky fialové. Podobně to platí pro barvy ostatní. Tím se pak vysvětluje, že vidíme duhu jako barevný oblouk kruhový.

Přechod barev v duze není takový, jako v čistém spektru, poněvadž úhlový průměr obrázku asi 33', tak že se jednotlivé barvy před sebe kladou. Vedle duhy popsané vzniká též duha způsobená paprsky dopadajícími na dolejší polovinu kapky, které také vycházejí z kapky s nejmenší deviací. Tyto paprsky míří však od země – nemůže tudíž duha tato být viděna pozorovatelem na zemi se nalézajícím, ale ovšem známy jsou případy, kdy pozorovatel nalézá se v balonu neb na vrcholu hory, pod níž se oblaka pohybují – a tedy může, jestli slunce dosti nízko, spatřiti úplný duhový kruh.

Duha vedlejší vzniká při dvojnásobném odrazu vnitřním. Příslušné rovnice změní se na

$$\cos\alpha = \sqrt{\frac{n^2-1}{8}}$$

a

$$\delta = 2(\alpha-\beta)+2\pi-4\beta$$
$$= 2[\alpha-3\beta+2\pi].$$

Výpočet dává:

$\alpha_B = 71°\,908$ $\quad \beta_B = 45°,577$ $\quad \delta_B = 230,354$

$\alpha_H = 71,485$ $\quad \beta_H = 44,866$ $\quad \delta_H = 233,774.$

Úhlové δ_B, δ_H jsou zde větší než 180° – to značí, že vnikají do oka pozorovatelova ty paprsky, které zasahují při úhlu dopadu α na


dolejší polovinu kapky. Sestrojíme tedy výkres především podobný nanesením

$\delta_B - 180 = 50,354$ pro paprsky červené

$\delta_H - 180 = 53,774$ „ „ fialové, avšak

od směru OS'.

Ob. 180.



Sled barev jest patrně obrácený nežli v případě duhy hlavní. Jasnost duhy sekundární jest ovšem menší než duhy primární, jednak že část světla míká dvojím odrazem (oproti jedinému odrazu při duze hlavní), jednak že je větší disperse při duze sekundární, jak to ukazují také rozdíly

$\delta_B - \delta_H = 1°,890$ pro duhu hlavní

$= 3,420$ „ „ sekundární.


Duhy odpovídající odrazu trojnásobnému nebo i vícenásobnému mohou býti spatřeny pouze za okolností velmi zvláštních, neboť padají za mraky, kde pozorovatel je vedle jasnějších přímých paprsků slunečních nemůže pozorovati.

Ukaz duze podobný jsou duhová kola, která se někdy kolem slunce nebo měsíce objevují, a jichž poloměr měří okrouhle 22° neb 46°. Frekvence jsou částější, hlavně pak v krajinách polárních. Vnitřní kruh je červený, vnější fialový u kruhu s poloměrem 46°-ovým, který původní obklopuje, jest týž pořádek barev.

Za příčinou těchto zjevů považují se malé krystalky ledu v ovzduší rozptýlené, které za klidného počasí padají k zemi, stavíce se tak, aby odpor prostředí byl nejmenší. Jednové ty částice mají podobu jehličeček a destiček, tak že ukazy onech kol jsou často dosti složity. Obr. 181. ukazuje především kruh 22° $\alpha\,\beta\,\gamma\,\delta$,

dále kruh 46° $\varepsilon\,\vartheta\,\iota\,\varkappa$, mimo to „kruh horizontální" čili parhelický OHJK, kruhy tangenciální u C a A a vertikální jasný kruh jdoucí slunce.

ob. 181.



O slunce málo nad obzorem AM. — P pozorovatel.

Na kole parhelickém OK JK které je bílé, spatřuje se často obrázky slunce, buď bílé nebo barevné, tak zv. slunce vedlejší čili *parhelia*.

Slunci právě naproti (v J) bývá bílý jeho obrazek, který slove *antihelion*, jemu blízké obrázky na parhelickém kole ležící slují *paranthelia*.

Kruhy půlící v H a K slují též oblouky Lowitzovy neb kruhy Heveliovy.

O vysvětlení těchto úkazů pokusili se Mariotte, Lavenbrich, Galle a Bravais, Franklyn a Lamins. *)

Optika theoretická.

Úvod.

§182. Historický rozvoj theorie undulačních.

Do optiky theoretické zařazujeme úkazy světelné, k jichž vysvětlení nutno je přijmouti theorii o *podstatě* světla. Náleží sem oddíly o *interferenci*, *ohybu*, *polarisaci* a *dvojlomu světla*. Theorie na její základě budeme o jevech těchto jednati, jest *theorie undulační*.

Základní myšlenka theorie undulační připisována se kdysi *Descartesovi*, ovšem že mylně; neboť náhled jeho, že vidění povstává tlakem, který se okamžitě od tělesa příčícího k oku rozšiřuje nestředním nekonečně pružným, nemá nic společného s *postupným* šířením se *vlny* světelné. Podobné Descartesovým podobné nalézáme ostatně již u *Leonarda da Vinci* a v některých dopisech *Galileiho*. První, jenž hlavní myšlenku theorie undulační uznával, byl *Grimaldi* a *Hooke*, ale tak temně a nejasně, že vám právem teprve *Christian Huygens* (1629–1695) za vlastního zakladatele této theorie se pokládá. Obšírný výklad této nové theorie podal ve spise: „Traité de la lumière" (Leyden 1690), o němž u Pařížské akademie přednášel již r. 1678; jelikož vydání se však prvotilo tím, že Huygens vzdav se členství akademie, v srpnu r. 1681 (z důvodů politických) Paříž, odebral se do svého rodiště Haagu. O předmluvě praví o tom pánu Huygens: J'écrivis ce Traité pendant mon séjour en France, il y a 12 ans; et je le communiquai en l'année 1678 aux personnes sçavantes, qui composoient alors l'Académie de mr. Colbert.

Jmenovaný spis je pro theorie světla undulační spisem základním

v němž podáno vysvětlení obrazu, kdy – a což je hlavní – též dvojlomu světla, úkazu, který vzbudil Huygensův Erasmus Bartolinus (1625–1698), profesor na univerzitě v Kodani, krátce před tím 1669 právě byl na vápenci Islandském objevil. Pozorování svá popsal v díle, jež vyšlo r. 1669 v Kodani pod názvem: Experimenta Crystalli Islandici Disdiaclastici, quibus mira et insolita refractio delegitur. . Hafniae 1669.-

Erasmus Bartolinus poznal, že se světlo bílé dělí dvojlomem na dva paprsky a že jeden z nich se láme dle pravidel známých, míje exponent lomu asi $\frac{5}{3}$; pro lom druhého paprsku nepodařilo se mu však nějaké pravidlo nalézti. Úkol tento rozřešil však Huygens způsobem důmyslným na základě své theorie undulační jak počtem tak konstrukcí, při čemž správnost výkladu svého zajistil měřením, srovnávaje výsledky pozorované s vypočtenými. Proto dal svému dílu titul: „Traité de la lumière, où sont expliquées les causes de ce, qui lui arrive dans la réflexion et dans la réfraction et particulièrement dans la Réfraction du Cristal d'Islande avec un discours de la cause de la pesanteur. (Leyden 1690). – Huygens poznal také, klada vápencové rhomboedry na sebe, že paprsky dvojlomem vzniklající na různé strany se různě chovají, – tedy jak nyní říkáme – že jsou polarisovány –; avšak než, nepředpokládaje undulace longitudinální, nemohl na základě tohoto úkazu vysvětliti.

Avšak spis Huygensův neučinil se světě vědeckém dojmu téměř žádného – přes to, že jsou úkazy dosud neznámé, úkazy dvojlomu, byly zcela plodně se skutečností vyloženy. Neboť proti nové theorii undulační stál jakožto autorita pro theorii emanační Isaak Newton (1642–1727), jehož Optika vyšla 14 let po vydání spisu Huygensova. Nová theorie měla také některé slabé stránky. Jak nejmenší nepravidelnosti, nepatrné změny v povrchu, jež se světla, vznik stínů – tedy právě úkazy základní světla, které theorie emanační vysvětlovala způsobem panovějícím. Ovšem podal Huygens také pro tyto úkazy vysvětlení dle své theorie, avšak tolo nevyhovovalo, což lze pochopiti, poněvadž princip interference byl tehda zcela neznámý. Analogie s akustikou byla nové theorii spíše na závadu, neboť v akustice není-li přímočaré šíření se zvuku, – tím se šíří tíž „světlý paprsek" – a není tam

úkazu stínu – alespoň ne tak, jako v optice. A tak vyplynulo celé století 18. a theorie undulační nečinila pokroků žádných.

Teprve počátkem století našeho vjal se theorie undulační krajan Newtonův Thomas Young (1773–1829), dle studií svých vlastně lékař, ale vynikající hlubokým vzdělením mathematickým a fysikálním; r. 1801–1804 byl professorem na Royal Institution v Londýně, pak od r. 1811 lékařem při nemocnici sv. Jiří v Londýně a zároveň sekretářem ústavu „Board of Longitude", kteréž vydával Nautical Almanac. Původně byv původcem theorie emanačním, ubral se později pracemi svými druhým přímo zakladatelem theorie undulační. On je objevitelem principu interference vln (od něho pochází též název „interference"), jehož užil nejprve pro úkazy akustické, který však později přenesl též na úkazy optické, vykládaje barvy tenkých vrstev a úkazy ohybové. Avšak názory Youngovy nebyly od vrstevníků jeho nikterak vřelým; zdá se, že Young sám ztrácel v posledních letech svého života důvěru v theorii, kterouž hájil.


První desetiletí našeho*) století bylo doba nových a překvapujících objevů optických, jichž vysvětlení jak theorií emanačních tak i undulačních činilo nemalé obtíže. Tak učinil Etienne Louis Malus náhodou objev polarisace světla; jejž publikoval roku 1809. Ze doby známost úkazů dvojlomu a jeho theorie nepokročila dále, než kam ji byl přivedl Huygens. Počátkem r. 1808 vypsala akademie pařížská cenou úlohu k tomuto předmětu se vztahující. To bylo mějům popudem, že Malus se pozorováním dvojlomu na vápenci islandském zaměstnával. Jednoho večera pozoroval obraz zapadajícího slunce na papírcích, jež se odrážely od okna paláce lucemburského; tu pak pozoroval, že místo obvyklých obrazů dvou dává vápenec obraz jen jediný. Jednoho zatím nastala zatím noc, učinil podobné pokusy se světlem svíčky, jež se odrážela na skle neb na vodě. Tím byl pak přiveden k nového pozorování povahy světla odraženého, od něhož pochází představa, že částečky světelné mají póly, on také zavedl výraz světla „polarisovaného". On a Biot objevili též polarisaci lomem. Souvislost s dvojlomem byla tu již patrna. Krátce na to následovaly nové objevy velice zajímavých úkazů polarisace chromatické (Arago, Brewster) a r. 1812 (Arago, Biot). Téže jednou postal theorii emanační zastánce velmi účinný, sám Jean Baptiste Biot (1774–1862),

*) t.j. 19. stol.

avšak k vysvětlení rozmanitých zjevů polarisace bylo třeba připojiti k theorii tak tolik dodatků a tolik podmínek, že se celá theorie čím dále tím těžkopádnější stávala. Tím již bylo vítězství theorie undulační naznačeno, rozhodl je konečně Jean Baptiste Fresnel (1788–1827). Práce jeho hnaly se podobným směrem jako práce Youngovy také on začal ohybem světla, pokročil však dále než Young a důležitým prvním překvapením zrcadlovým opět nový základní názory o interferenci světla. Při vysvětlení oněch polarisace nalezl šťastnou – zajisté i smělou – myšlenku, který mnohým vynikajícím fysikům jeho doby, jako p. Aragovi a zvláště Laplace-ovi a Poissonovi se zdála býti téměř absurdní, totiž myšlenku transversálního chvění éthem. Až dosud předpokládala totiž theorie undulační dle akustické analogie chvění podélné. Fresnel sám nedůvěřil se úplného uznání své theorie; ještě až do let třicátých trval na některých stranách odpor proti nové theorii, od těchto let však nabývala theorie ta vždy rychleji a rozhodnější půdy. Zakončeno celého zápasu stalo se památným pokusem Foucaltovým 1850, kterým se přímo dokázalo, že se světlo v ústředí opticky hustším šíří volněji, jak to theorie undulační předpokládala, kdežto theorie emanační tvrdila toho opak.

K porozumění toho, že i po objevu úkazů ohybových provázen svou interferenčních, mohla theorie emanační pole hájiti, budiž ještě připojena poznámka následující.

Proti theorii emanačí uváděn byl pokus Youngův naznačený obr. 124.



obr. 124.

S je úzká štěrbina, kterou dopadá světlo na stínítko I, kde jsou dva malé otvory jehlou utvořené blízko u sebe. Za stínítkem I. pozorují se na C stínidle světlé a temné proužky.

V některém bodě temného proužku je zdánlivě účinek světelný z A vycházející zničen účinkem světla přicházejícího od B čili tam, kde světelné zdroje A a B původně jednotné účinky, povstávají proužky temné, tam kde tyto účinky jsou souhlasné povstávají proužky jasné. Důkaz, že světlo a světlo se ruší, uváděn byl za důvod proti theorii emanační, která již nemohla

přijati, že hmota a hmota se ruší. U pokusu uvedeném však světlo a světlo se neruší, ač jsou totiž místa, obsahující proužky temné, tmavšími, o to jsou zase proužky jasné světlejšími, tak že celková úhrnná intensita osvětlení plochy C jest oběma zdroji najednou právě taková jako jedním a druhým zdrojem dohromady.

Nastává tedy při pokusu Youngově zničení, annullování světla, ale jen jiné rozdělení právě tak jako deska jemným pískem stejnoměrně posypaná, je-li rozvrčena, způsobí, že se písek na některých místech shromáždí, ostatní místa nejvíce rozechvěná, při čemž se některá nezničí jeho množství.

Pokus Youngův nenutí tedy přímo k zavržení theorie emanačí, vyžaduje však zvláštních složitých názorů o povaze a vzájemné akci tělísek, ze zdroje světelného vycházejících, tak že theorie tato stává se umělou a nejednoduchou.

Přehlédneme-li ještě jednou krátce rozvoj theorie undulační, můžeme v rozvoji tom vytknouti čtyři hlavní etappy, jež jsou naznačeny jmény:

Huygens, Young, Fresnel, Foucalt.

První položil základy theorie, druhý doplnil ji principem interference, třetí dovršil názorem o transversalitě chvění éthem, poslední pak podal pro správnost důležitého jejího předpokladu přímý důkaz experimentem.

Theorie undulační připouští při téže myšlence základní mnohé modifikace dle toho, jaké předpoklady učiníme o vlastnostech éthem v různých krystalických, jakož o tom na svém místě blíže pojednáme. V éthem samém, tomto nezbytném postulátu theorie, mohou základní názory rovněž se rozličovati. Vzhledem k tomu, že se vyžadují oscillace transversální, tedy podobné jako u hmot pevných, pokládá se (Green) ether za látku mezi pevnou, pružnou („Elastic Solid") všechen prostor pronikající, která vzdoruje změnám tvaru, jest úplně nestlačitelna, tak že longitudinální rozruch dálí se s rychlostí nekonečně velikou.

G. G. Stokes poznamenává, že éther, jenž pro svou nestlačitelnost může býti považován za dokonalou kapalinu, pro jakékoliv (ale krátké) doby se jeví jako pevná pružná hmota, poněvadž pomalé, o které jde, při ztížení se

velmi světelné je velmi malé a nesmírně náhlé.

V novější době vznikla nová theorie světla t. zv. elektromagenetická, jež považuje ether za kapalinu v nevstálém pohybu se nalezající a světlo za zjev elektromagenetický, povstávající z velmi rychle střídajících se polarisací etheru čili posunutí (displacement) dle názoru Maxwellova.

Udělíme-li nějakému tělesu elektrický náboj, konaumuje se energie působící elektrifikaci okolního etheru. Můžeme říci, že se ether polarisuje, mající na mysli změny ve vlastnostech nebo stavu jeho částiček způsobené konsumpcí energie. Zjevy elektrické spočívají pak v transformaci této energie, a vybíjeno-li těleso elektrické, zbavíme ether jeho energie a tím i jeho polarisace. Podobná úvaha platí i pro elektrický proud. Představme si nyní těleso, které rychle po sobě nabíjíme a vybíjíme, neb kterým posíláme okamžité proudy v střídavých směrech, tím vznikne v okolním étheru střídavě různá polarisace, a stane-li se to střídání periodickým a o frekvenci velmi značnou, můžeme uhniti o vibraci étherem právě tak jako v obyčejné theorii undulační. Je-li rychlost oněch vibrací v určitých mezích, pak vzbuzují pocity vidění, před jednou mezí jeví se účinkem thermickým, za druhou účinkem chemickým.

[*§ 183 Základní vzorce pohybu vibračního a undulačního. *]

[*1.) V úvodu k úvaze bylo vyloženo, že lze pohyb vibrační pokládati za projekci rovnoměrného pohybu, který se děje v kruhu s poloměrem r rovném amplitudě vibrace s úhlovou rychlostí $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi N$, je-li T perioda vibrace a $N = \frac{1}{T}$ její frekvence. Znamená-li t proměnlivý čas, je

$$y = r \sin(\omega t + \alpha)$$


kdež jest ωt úhel fásový a α jeho hodnota pro $t = 0$ (obr. 125).

Pro rychlost lineární $v \left(= \frac{dy}{dt}\right)$ pohybu vibračního máme

$$v = \omega r \cdot \cos(\omega t + \alpha),$$

při čemž znamená $\omega r = c = \frac{2\pi r}{T}$ lineární rychlost pohybu v na obvodě kruhu.

obr. 125.



Konečně pro zrychlení $a = \frac{d^2y}{dt^2}$ obdržíme

$$a = -\omega^2 r \sin(\omega t + \alpha).$$

čili $a = -\omega^2 y$.

Vzáží tedy $\omega^2 = a$, zrychlení pro $y = 1$.

Poněvadž je pak $\omega = \frac{2\pi}{T}$, vychází

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{1}{a}},$$

2.) Kinetická energie vibračního pohybu je v každém okamžiku dána výrazem $\frac{1}{2} m v^2$.

Její maximum je tedy $\frac{1}{2} m c^2$,

" minimum " " 0

Střední její hodnotu pro celou periodu T dává výraz:

$$\frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} m v^2 \, dt.$$

Integrál tento nabude po dosazení příslušných hodnot výrazu:

$$= \frac{m r^2 \omega^2}{4T} \int_0^T \left[1 + \cos 2(\omega t + \alpha)\right] dt = \frac{m r^2 \omega^2}{4T} \Big/ \left[t + \frac{1}{2\omega} \sin 2(\omega t + \alpha)\right] =$$

$$= \frac{m r^2 \omega^2}{4} = \frac{1}{4} m c^2 = \frac{m \pi^2 r^2}{T^2}.$$

Je tedy střední kinetická energie vibrující hmoty rovna aritmetickému středu (průměru) její hodnoty maximální ($\frac{1}{2} m c^2$) a minimální (0).

3.) Intensita osvětlení může se měřiti energií kinetickou obsaženou v jednotce objemové media. Je-li tedy m hmotou v jednotce objemové je intensita osvětlení dána výrazem

$$J = \frac{m r^2 \omega^2}{4} = \frac{m \pi^2 r^2}{T^2}.$$

Jinak lze zavésti intensitu osvětlení jako energii procházející normálně jednotkou plochy za jednotku času. V tom případě bude intensita osvětlení závislá na rychlosti $v = \frac{\lambda}{T}$, a jakou se měřilo šíření a výraz pro rovinnou vlnu světelnou nabude tvaru:

$$J' = \frac{m r^2 \omega^2}{4} \cdot v = \frac{m \pi^2 r^2}{T^3} \cdot \lambda.$$

V praxi obvyklém přichází do počtu pouze intensita osvětlení relativní a ta plyne z obou

správně měření, že pro vibrace přejmenované jsou intensity v poměru čtverců amplitud.

$$\frac{J_1}{J_2} = \frac{r_1^2}{r_2^2}$$

Z výsledků předešlých však následuje, že je nesnadno srovnávati intensity osvětlení způsobené různými barvami (jako v akustice intensity dvou tónů o nestejné výšce) a to je fakt pro fotometrii, kdy velmi často srovnáváme zdroje jsou nestejně zabarvený velmi důležitý.

4.) Vibrace stálého typu. Světlo polarisované.

Jevy interferenční učí nás považovati světlo za periodickou změnu některých podmínek media, kterou v theorii undulační pokládáme za pohyb vibrační vyjadřujíce jej jednoduchým vztahem:

$$y = r \sin(\omega t + \alpha).$$

Rovnice tato však může znamenati nekonečný řad podobných avšak změn. Když typ těchto změn bude neustále jeden a týž, nazvěme světlo takovou vibrací dané polarisovaným. V tomto případě éthrové částice opisují podobné a podobně položené dráhy; když opisují stále týmiž. Když tedy všechny částice éthrové opisují podobné a podobně položené ellipsy, nazvěme světlo takové elliptický polarisovaným, opisují-li kruhy, jest to světlo cirkulárně polarisované, a opisují-li konečně přímky nazýváme rovněž – světlo lineárně polarisované. Podstata polarisovaného světla záleží tedy v tom, že všechny částice éthrem opisují týž druh dráhy a to nejen v jednom okamžiku, ale časově čili všeobecněji řečeno, že pohyby změn v podmínkách media se neruší. *)

§ 184. Skládání vibrací.

Mimo každým omezením všeobecnosti, položíme-li v rovnici pro vibraci bodu úhel $\alpha = 0$, t. j. počítáme-li proměnlivý čas t okamžikem, kdy vibrační pohyb začíná. Pak jest

$$y = r \sin \omega t$$

aneb klademe-li $\omega t = \vartheta$ (úhel časový),

$$y = r \sin \vartheta.$$

Stává se však, že k vibraci bodu dané touto rovnicí přicházejí dalším isochronní vibrace (téže periody T) lišící se amplitudou r a mající proti vibraci dané jisté rozdíly fásové ε.

Takovéto rozdíly fásové vznikají v optice z rozdílu dráhových δ, když na př. světlo přichází ze dvou bodů světelných různě vzdálených.

Uvažme – jedním pro vždy – jak se rozdíl dráhový přepočítává na fásový. Zpoždění časové τ je patrně $\frac{\delta}{v}$, kdež je v rychlost šíření se světla, z zpoždění časového τ vypočítáme rozdíl fásový koefficientem $\frac{2\pi}{T}$ jakožto $\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{\delta}{v} = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \delta$ vzhledem k tomu, že je $vT = \lambda$.

Z rozdílu dráhového δ počítáme tudíž rozdíl fásový ε

koefficientem $= \frac{2\pi}{\lambda}$.

Budiž nyní dána úloha následující: K vibraci dané, původní, čili, jak též říkati budeme, nulové, (protože od ní vycházíme), o amplitudě r_0 přicházejí isochronní vibrace $(r_1, \varepsilon_1), (r_2, \varepsilon_2), (r_3, \varepsilon_3), \ldots$ atd. (r_n, ε_n), jichž amplitudy jsou $r_1, r_2, r_3, \ldots, r_n$, a kteréž proti původní, nulové, vibraci mají rozdíly fásové $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3 \ldots \varepsilon_n$. Má se stanoviti vibrace resultující.

Je samozřejmo, že vibrace tato je téže periody jako ony dané, budíž s nimi isochronní.

Jde tedy o to, stanoviti pro resultující vibraci její amplitudu r^* a její rozdíl fásový ε^* proti vibraci nulové. }

{ § 185. Řešení grafické.

{ * Úkol daný bez předešlým velmi jednoduše řešiti graphicky (Akustika, 53).

K amplitudě r_0 připojme geometricky amplitudy $r_1, r_2 r_3, \ldots$ vzhledem k úhlům fásovým $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3 \ldots$ (obr. 126).


Obdržíme děravý mnohoúhelník amplitud.

Strana tento mnohoúhelník uzavírající je amplitudou r^* resultující, a úhel, který svírá s amplitudou nulovou, je fásovým rozdílem ε^* resultující vibrace proti

31. ach

vibrace jsou tvořeny


obr. 126



Zajímavý případ nastane, když amplitudy r jsou *zcela stejné*, a když rozdíly fásové ε jsou – jak zkrátka říkáme – *aequi-crescentní*, t.j. když každý následující je o totéž větší než předcházející, takže tvoří řadu arithmetickou ($0, \varepsilon, 2\varepsilon, 3\varepsilon, \ldots$ atd.) – Pak postup stran vnitřního mnohoúhelníka nabude jisté pravidelnosti (obr. 127.) vzpomínající na mnohoúhelník pravidelný, kterým se též může státi, je-li ε aliquotním dílem $360°$ nebo $2\times 360°$, nebo všeobecně k $360°$ (mnohoúhelníky vyšších řádů.)

Jest samozřejmo, poněvadž fáse jsou aequicrescentní, že výsledný fásový rozdíl ε^* je identický s průměrným rozdílem fásovým, totiž 0 a ε_n, tak že je $\varepsilon^* = \frac{0+\varepsilon_n}{2}$, čili $\varepsilon^* = \frac{1}{2}\varepsilon_n$.


Z případu stejných amplitud a aequicrescentních rozdílů fásových se pak konečně snadno odvodí jistý případ limitní: ten totiž, kdy amplitudy jsou stále menší a menší, – až nekonečně malé — v počtu též do nekonečna vzrůstajícím (tak že jich summa arithmetická je veličinou konečnou) a kdy v souhlase s tím rozdíly fásové jsou aequicrescentním rostem spojitě vzhledem k nekonečně málo při dvou kmitech sousedních. Patrně, že onen mnohoúhelník pravidelný přejde pak v oblouk kruhový amplitud (obr. 128) Amplituda r^* je pak tětivou tohoto oblouku, a rozdíl fásový ε^* je opět průměrnou hodnotou všech, jež rostou od 0 do ε_n, tak že je $\varepsilon^* = \frac{1}{2}\varepsilon_n$; i jest ε_n úhel, jejž poslední oblouček svírá s prvním – t.j. středový úhel onoho oblouku – jehož je pak ε^* úhlem obvodovým (obr. 128)



obr. 127.

Také jinak můžeme výsledek formulovati:
Resultující rozdíl fásový ε^* je tíž jako rozdíl fásový té vibrace, která jest ze všech daných uprostřed, čili jejížto amplituda na mezi všemi polohami středními (obr. 128)

obr. 128.



Případ oblouků kruhových je ovšem *speciální*.

Všeobecnějším případem by bylo, kdyby amplitudy nejsoucí právě stejnými družiny se k sobě dle fásových rozdílů, jež by sice pojaté se měnily, ale nikoliv aequicrescentně; pak by místo oblouku kruhového vznikl všeobecný oblouk *křivky jakékoliv*

Avšak pro účely naše vystačíme s onímž případem jednodušším. Budeme jeho užívati k vyvětlování zjevů ohybových, jež zoveme Fraunhoferovými. *)

§ 186. Řešení analytické

*) Pravidlo o mnohoúhelníku amplitud nabývá (projekcí na osu r_0 a úhlem k ní kolmou) formulace analytické rovnicemi:

$$r^* \cos\varepsilon^* = \sum_0^n r\cos\varepsilon = A$$
$$r^* \sin\varepsilon^* = \sum_0^n r\sin\varepsilon = B.$$

Z toho plyne pak:

$$r^* = \sqrt{A^2 + B^2}$$
$$\operatorname{tg}\varepsilon^* = \frac{B}{A}$$

V onom případě limitním přejde r v diferenciály dr a zároveň summace v integraci, tak že jest

$$A = \int dr\cos\varepsilon$$
$$B = \int dr \sin\varepsilon.$$

Všeobecně je pak ε jistou funkcí r. – Pro případ kruhový je dr konstantní a ε úměrno součtu $\int dr = r$ amplitud. *)

§ 187. Princip Huygensův

Podstata principu tohoto vyložena byla již v úvodu k akustice (v. str. § 17). Ukázáno,


jak lze principem tímto vykládati základní zjevy optické: přímočaré šíření se světla, odraz a lom.

Theorii emanační vykládala přímočaré šíření se světla a stín povstání vznik optického stínu velice jednoduše. Spatří jednoduchosti této měla theorie undulační postavení obtížné nesnadné zvláště tím, že u zjevů akustických, jichž základem nepochybným je undulace, stínu žádného není. Analogie s akustikou byla tedy jak již v úvodu řečeno, theorii undulační světla nikoliv oporou, nýbrž závadou než v pravdě ukazuje, že veliké překážky vrhají dosti určitý akustický stín, a že se zvukové vlny velmi širokým otevřeným nástrojem ani tak přímočaře.

Ještě tíže na pravdě útrže, nemá-li skutek světla jen proto tak velice malý rozsah za obvyklejších poměrů, poněvadž je délka vlny velice malá. K následujícímu poznání, že je tomu skutečně tak, „přímočaré" šíření světla jest jen proto prakticky přímočarým, poněvadž délka vlny světelné je velice malá.


(* § 188 Výklad přímočarého šíření se světla. *)

(* Uvažujme působení rovinné vlny světelné na bod mimo ni ležící za směru, v němž vlna postupuje.



obr. 129.

Volme vlny vzhledem k danému bodu O (obr. 129 a 130) nadýraný bod P, který je ze všech bodů vlny danému bodu (O) nejblíže, neboli přesněji řečeno, ten bod vlny, z něhož světlo k danému bodu O postupuje nejdříve. Při vlně rovinné jest tímto bodem P – pól vlny – dán patou kolmice z bodu O na čelo vlny (wave front) spuštěné.



obr. 130.

Budiž tedy P (obr. 129 a 130) pólem vlny vzhledem k bodu O vzdálenému od délky $OP = p$. Opíšeme ze středu O poloměry $p + \frac{\lambda}{2}$, $p + 2\cdot\frac{\lambda}{2}$,


$p + 3\cdot\frac{\lambda}{2}$, ... atd. kruhy po povrchu vlny jdoucí, tedy body $M, M_2, M_3 \ldots$ Část plochy na čele vlny uzavřená mezi dvěma takovými kruhy sousedními nazývá se polopériodovým pásmem (zonou) nebo polopériodovým elementem. Souvislejšími nyní působení dvou takových sousedních pásem polopériodových na bod O.

Rozdělme každé z obou pásem na řadu koncentrických kruhových pruhů o ploše nekonečně malé a to podobným způsobem, jakým jsme utvořili ony pásma celková, totiž opisujíce z bodu O kružnice o poloměrech $r, r+\delta, r+2\delta, \ldots$, kde δ je veličina nekonečně malá. První takový proužek pásma M, M_2 bude o půl vlny blíže bodu O než první proužek pásma $M_2 M_3$, poněvadž tu rozdíl ve dráze jest $\frac{\lambda}{2}$, bude se působení jich sčítati, bude-li též amplituda obou vibrací táž. Zruší tedy působení jednoho proužku působení proužku jemu v sousedním pásmu korrespondujícího a při stejných amplitudách zrušilo by se tedy působení jednoho pásma působením druhého.

Kdyby nyní vyšetřiti, zda-li je skutečně taková rovnost amplitud a jaký je vliv nestejně šikmého postavení jednotlivých proužků ke směrům vedoucím k bodu O.

Proužky postavené poloměry $r, r+\delta, r+2\delta, \ldots$ nevzbuzují stejně velikým plochou a tím také mohly by amplitudy pohybů vůbec vycházejících býti různými.

Jsou-li $M M'$ (obr. 131) šířkou kteréhokoliv proužku, je $OM' - OM = \delta$;



obr. 131.

znamenáme-li pro okamžik x ($= PM$) střední poloměr proužku, jest jeho plocha $= 2\pi x \cdot M M'$.

Že však $\frac{x}{r} = \frac{\delta}{M M'}$,

tudíž plocha proužku $= 2\pi r\delta$.

Plocha proužků tedy se světlinou se vzdáleností od pólu; tím by amplitudy přibývala; poněvadž však na druhé straně amplitudy ubývají se vzdáleností od bodu O, vzíti se tyto dva vlivy a amplituda každému proužku příslušející je proporcionální výrazu $2\pi\delta$,

jest tudíž pro všechny prstence táž.

Při tom však nepovšimli jsme si nestejného sklonění různých elementů ke směru spojovacímu se středem O. Budiž tento proměnný sklon ϑ. Je pak

$$\cos\vartheta = \frac{r_0}{r},$$

i může tudíž býti jakákoliv funkce úhlu ϑ vyjádřena funkcí r, t. j. vzdáleností elementu od bodu O.

Známe-li dále zákon, dle něhož se mění amplituda s sklonem, jak může býti amplituda kteréhokoliv prstence vyjádřena jako funkce veličiny r, tudíž snadno psáti:

$$\text{Amplituda } A = a \cdot f(r).$$

Amplituda korespondujícího prstence v sousedním poloperiodovém elementu bude

$$A' = a \cdot f(r + \tfrac{1}{2}\lambda) = a f(r) + \tfrac{1}{2} a \lambda f'(r) + \ldots$$

Společný jich efekt bude tedy odpovídati amplitudě

$$A - A' = \frac{1}{2} a \lambda f'(r) + \ldots$$

Poněvadž jmk. λ je malé, bude společné působení dáno prvým členem

$$= \frac{1}{2} a \lambda f'(r),$$

bude tedy pro vzdálenější dílce vlny světelné.

Přijmeme-li jednoduchý zákon, že amplitudy ubývá úměrně s cosinusem sklonu čili, že $f(r) = \frac{r_0}{r}$, pak $f'(r) = -\frac{r_0}{r^2}$ a

$$A - A' = \frac{1}{2} \frac{a r_0 \lambda}{r^2};$$

jinými slovy, působení vzdálenějších zón je menší a menší s čím dále tím více vzájemně rovné.

Označíme-li dále $m_1, m_2, m_3, \ldots m_n$ působení jednotlivých poloperiodových pásem, bude působení veškeré dáno výrazem

$$S = m_1 - m_2 + m_3 - m_4 + \ldots$$

Poněvadž členy této řady stávají se menšími a menšími a postupně dle pořádku — sobě téměř rovnými, je součet této řady dán jednoduše:

$$\frac{1}{2} m.$$

Je-li délka vlny poměrně malá, pak malá plocha kolem pólu P bude obsahovati mnoho poloperiodových pásem a výsledné působení této části vlny bude téměř takové jako


celé vlny dohromady. Jest tedy efektivní částí vlny pro bod O poměrná plocha kolem pólu P. Zastíníme-li tuto plochu kolem pólu neprůhledným stínítkem, nemá ostatní část vlny na bod O téměř žádného vlivu — bod O leží ve stínu a pravíme, že paprsky světelné šíří se přímočaře. Že tedy „přímočaré" šíření se světla pouze přibližným approximativně, a je nutným následkem nepatrné délky vlny světelné.

Výsledek $\frac{1}{2} m$ jako součtu řady $S = m_1 - m_2 + m_3 - m_4 + \ldots$ lze velmi pěkně odvoditi z grafického znázornění.

Jak v úvodu — o geometrickém skládání vibrací isochronních — vyličeno, nahradíme amplitudu resultující jakožto tětivu napínající oblouk amplitud. Při poloperiodových pásmech je rozdíl fázový posledním vibrace proti mluvové vždy $= \pi$, tudíž oblouk položením průměrně a tětiva průměrem jeho. Známe průměrně, poněvadž rozdíly fázové přímě vzato nejsou reciprocas centrními, ale rozdíl fázový krajních paprsků je přesně $= \pi$. Budeme tedy pro jednotlivá pásma poloperiodová jakožto křivku amplitud míti soustavu křivek, jež jsou přibližně půlkruhy, které dávají resultující amplitudy $+oa, -ab, +bc, -cd, +\ldots$ atd (obr. 132). Výsledná křivka odpovídající působení celé vlny je správně s rostoucím počtem závitů složených téměř z půlkruhových oblouků, která se blíží patrně bodu J, ležícímu téměř v polovici amplitudy oa. Poněvadž oJ representuje amplitudu vibrace, způsobené celou vlnou, následuje, že

$$S = \frac{1}{2} m. \quad *)$$


obr. 132.



§ 189. (* Pokračování. Vlny sférické

(* Výklad v předešlém § podaný se podstatně neměnil, když předpokládáme vzdálenou vlnu nikoliv rovinnou, nýbrž kulovou, sférickou.

obr. 133.



Budiž C (obr. 133) střed takové vlny o poloměru a, jdoucí se směrem — jakož dříve —

od levé k pravé; bod P je pak pólem této vlny vzhledem k bodu O, vzdálenému od pólu o délku $PO = b$.

Opíšeme jako dříve z bodu O poloměry r a $r+\delta$ kružnice, jež vytnou z dané vlny elementární pásmo kruhové plošky $M M'$. Plošný obsah tohoto pásma jest

$$2\pi . a \sin \theta . M M';$$

neboť $a \sin \theta$ je (téměř) střední poloměr tohoto pásma.

Jest však $$\frac{\delta}{M M'} = \cos M M' O = \sin \theta M' O,$$

a dle věty sinusové $$\frac{\sin \theta M' O}{\sin \theta} = \frac{a+b}{r},$$

tudíž $$\frac{\delta}{M M'} = \frac{a+b}{r} \sin \theta.$$

Pro obdržíme za plochu onoho pásma výraz

$$2\pi r \frac{a}{a+b} . \delta.$$

Při $a = \infty$, je $\frac{a}{a+r} = 1$ a vzejde výraz z předešlého S zvlášť odvozený $2\pi r \delta$.

Pro pásma poloperiodová jest $\delta = \frac{\lambda}{2}$, tudíž plocha $\pi r \frac{a}{a+b} . \lambda$.

Všechno další odvození předešlého S zůstává i zde v platnosti.


Výsledek je v podstatě týž. Účinný effekt vlny sférické v bodě O je takový, jako poloviční effekt prvního poloperiodového pásma, jehož plocha ($r = b$) jest

$$\pi r \frac{a}{a+b} . \lambda = \pi \frac{ab}{a+b} \lambda.$$

Výsledek lze pak rozšířiti na vlnoplochu formy jakékoliv. *)

[*190. Výklad odrazu a lomu světla. *)

Obr. 134.



[* Budiž $M N$ (obr. 134) rovinou dělící dvě optický různá ústředí I a II; na rovinu tuto nechť dopadají paprsky rovnoběžné směrem SA. Vlnoplocha je zde rovina na směr paprsků

kolmá; může býti považována za část koule, jejíž střed jest v nekonečné dálce.

Sledujíce průběh úkazu v rovině nákresné, kreslíme dva rovnoběžné papr. a mezi nimi vedeme kolmou přímku; tato kolmá přímka představuje tedy onu rovinu, která je částí vlnoplochy.

Během času postupuje tato přímka s určitou rychlostí, až v jistém okamžiku dojde bod A na rozhraní MN obou ústředí. Dle principu Huygensova mysleme si, že bod A stane se v okamžiku tomto střediskem nového vlnového pohybu, po němž pak jiné následující atd., každý ovšem poněkud později, až totiž pohyb přímky AB k němu dospěje; naposled stane se bod C střediskem takového nového pohybu vlnového. Uvažujme, jak se právě do tohoto okamžiku věc utvářil, tedy za tu dobu, kdy vlnění původní proběhne dráhu BC.

Od jednotlivých bodů přímky AC šíří se vlnění jak do ústředí prvého (zdroj), tak i do ústředí druhého (lom), ale s tím rozdílem, že se do ústředí druhého šíří s jinou rychlostí — na př. s rychlostí menší.

K snazšímu přehledu vzdělme úvahu:


Hledíme nejprve k ústředí prvému, původnímu. Za ten čas, kdy vlnění původní proběhne dráhu BC, rozšíří se vlnění od centra A na (nekonečný) kruh téžeň poloměru $AD = BC$; od jiných středisek mezi A a C budou tyto poloměry přirozeně menší; pro bod úplně střední mezi A a C bude na př. činiti též poloměr, pro bod jiný bude poloměr dle polohy bodu mezi A a C úměrně menší; nakreslíme-li všechny tyto kruhy, seznáme, že do jistých bodů dospěje vlnění současně ze všech středisek v téže fázi — jsou to body ležící na přímce DC, která je všech těch kruhů společnou tečnou, — zde se tedy vibrační pohyby zesilují — jinam dospěje s různými fázemi a může se tu vzájemnou interferencí. Výsledek bude tedy ten, že přímka AB, jak bylo před odrazem, se ukáže v nové poloze DC. Jinak řečeno: vlnoplocha representovaná touto přímkou AB objeví se v nové poloze representované přímkou DC, ku kteréž jest kolmý papírek AS a to jest papírek odražený.

Poněvadž jest $BC = AD$, plyne ihned

$$\alpha - \alpha'.$$

Dále jest α úhlem dopadu, α' úhlem odrazu.

Hledíme nyní k ústředí druhému (obr. 135).



Obr. 135.

Za ten čas, za který vlnění původní proběhne dráhou BC, rozšíří se vlnění z střediska A vycházející do prostředí druhého na (ucházející) kruh několik takovýž poloměrů = BC, nikoliž poloměru na př. menšího AD; i jest pak patrně:

$$\frac{BC}{AD} = \frac{v_1}{v_2},$$

kdež značí písmena v rychlosti, s jakou se vlnění šíří v jednom neb druhém prostředí; neboť dráhy BC a AD jsou dráhy stejnodobé.

Od ostatních bodů mezi A a C rozšíří se vlnění na kruhy, jichž poloměry budou přiměřeně menší než AD, tak že na př. středním bodu mezi A a C odpovídá poloměr $\frac{1}{2} AD$ anebo bodu P poloměr $\frac{1}{m} AD$, je-li totiž $\frac{AP}{AC} = m$, atd. V okamžiku, kdy právě bod C má se státi střediskem elementární vlny, dospěje vlnění od jednotlivých středisk mezi A a C současně ve stejné fási do bodů, které leží na přímce DC, jež je tečnou všech těchto kruhů; do jiných míst dospějí elementární vlny současně v různých fásích, musí se tudíž vespolně interferencí.

Hledíme-li ke konečnému výsledku, shledáváme původní rovinnou vlnoplochu representovanou přímkou AB v poloze representované přímkou DC, přímka AS' k ní kolmá je paprsek lomený.

Jest však

$$BC = AC \sin\alpha$$
$$AD = AC \sin\beta,$$

tudíž:

$$\frac{BC}{AD} = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta};$$

a poněvadž jest:

$$\frac{BC}{AD} = \frac{v_1}{v_2} = \text{Const.},$$

tedy jest též:

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{v_1}{v_2} = \text{Const.} = n.$$

Nyní však přicházíme k zákonu o lomu světla. Ale nejen to. Úvahou touto přicházíme ještě k významu exponentu lomu n; tento exponent značí poměr obou rychlostí, s jakými se šíří vlnění v prostředí I a II. Patrně jest

$$n > 1, \text{ je-li } v_2 < v_1$$

a naopak,

lom světla ke kolmici nastává tudíž, přichází-li světlo z jistého prostředí do jiného, ve kterém světlo volněji postupuje.

Obyčejně jest prostředí I vzduch. Pak udává „relativní" exponent lomu n prostředí II, v jakém poměru je rychlost světla v tomto druhém prostředí menší než ve vzduchu.

Je-li prostředí I prostor vzduchoprázdný, pak jest exponent n exponentem absolutním; i udává pak, v jakém poměru je rychlost světla v jiném prostředí II menší než v prostoru vzduchoprázdném.

Za rychlost světla pro vacuum udává se obyčejně obvyklé číslo

300 000 kilometrů,

kteréž platí velmi přibližně též pro vzduch.

Relativní exponent vody je obvykle asi $= \frac{4}{3}$, proto je rychlost světla ve vodě $= \frac{3}{4} \cdot 300000 =$ jen 225000 km.

Tento význam exponentu lomu stal se velmi důležitým, neboť vedl k rozhodnutí otázky, zda-li theorii undulační světla, dlužno dáti přednost před theorií emanační. Také tato theorie dovede vysvětliti lom světla, ale vede k významu exponentu lomu právě opáčnému. Dle této theorie musilo by světlo v prostředích, kde lom ke kolmici nastává, rychleji postupovati. Jinak řečeno: Dle theorie undulační je rychlost ve vacuum větší než na př. ve vodě, dle theorie emanační naopak menší.

Jak na svém místě bylo již uvedeno, rozhodl Foucault svou methodou stanovení rychlosti světla otázku definitivně ve prospěch theorie undulační.*)

§ 191. Konstrukce Huygensova.


S dosud vyloženého můžeme pro sestrojení paprsku lomeného nalézti

následující konstrukce.

Budiž v rovině nákresné MN rozhraní ústředí I a II, na př. vzduch a voda. Sestrojme soustředné kruhy 1, a 2, kolem středu O, o poloměry úměrnými rychlostem v_1 a v_2; tyto kruhy naznačují tedy vlnoplochy.

Je-li dán (obr. 136) paprsek dopadající SO v ústředí I, prodloužme ho do A až ke kruhu 1, položme k bodu A tečnou AL až do průsečíku L s rozhraním MN a z tohoto průsečíku L zase tečnou LB ke kruhu 2. Jest pak OB paprskem lomeným.


obr. 136.



Prostorově značí kruhy 1 a 2 kulové vlnoplochy, AL je rovina tečná ke kouli 1, L značí průsečku (na tečných rovinách), v níž tato tečná rovina protíná rovinu hraničnou MN, a LB zase tečnou ke kouli 2.

Jak se konstrukce tato modifikuje, když se jde zpět z ústředí II do I, objasňuje obr. 137.; zároveň je vidět, kdy konstrukce naznačuje totální reflexi, jaká by na př. nastala pro paprsek SO.

obr. 137.



Že patrno, že konstrukce tato podrží platnost svou ve svém základě i tehdy, kdyby vlnoplocha nebyla koulí, nýbrž na př. elipsoidem.

Tento případ nastává při dvojlomu, jak o tom na svém místě pojednáme.

Že způsobu zde vyličeném Huygens nepodal konstrukci, ale tato je zcela v duchu jeho principu a značí jen vhodnou modifikaci té konstrukce, kterou podal pro dvojlom.

Interference světla.

§ 192. Rozdělení úkolů.

Zde v nauce interference světla a užívá se dvojím smyslu, širším a užším.

V širším smyslu považujeme každý zjev optický za interferenční, při němž spolupůsobením dvou neb více paprsků vznikají pravidelné změny v intensitě osvětlení, ať již vnější paprsky mírnou pouze světlo postupující normálně k vlnoploše, nebo i ony paprsky elementární známé z principu Huygensova.

Interference paprsků druhého způsobu nazývá se obyčejně ohybem. V užším smyslu mluvíme o interferenci tenkrát, když povstává tato spolupůsobením paprsků různých se bere zřetel ohybu. V díle, který zde začínáme, budeme jednati jen o interferenci v užším slova smyslu, rozeznáváme zde oddíly:

A.) Oddíl jednající o interferenčních proužcích

B.) " " o interferenci, původné intropickými deskami


Do oddílu A.) náleží základní pokus Youngův, zrcadla a čtvercem Frenelova, pokus Lloydův, Billetovy dvojčočky a interferenční pásky Talbotovy a Lowelovy.

Do oddílu B) počítáme barvy tenkých vrstev, (kruhy Newtonovy), a barvy tlustých vrstev.

§ 193. Pokus Youngův.

Budtež A a B dvě velmi úzké a spolu rovnoběžné štěrbiny v rovině XX', kteráž je z pravidla vertikální. Ze štěrbin těchto nechť vycházejí dvojí stejné světelné zcela obvodné, tak jakoby jedno z druhého mělo původ svůj v témže zdroji světelném. Podmínka tato realisuje se tím způsobem, že se dvě štěrbiny, světlé jednou z jich rovině symmetrie YY' — kteráž tedy je z pravidla též vertikální — položenou, velmi vzdálenou, úzkou štěrbinou. Tím se docílí toho, že zdroje světelné z obou štěrbin jsou, jak říkáme, cohaerentními (co-haereo, spolu souvisící), takže kmity světelné jsou vždy rovnolehlé v téměř okamžiku časovém také v téže fázi.

obr. 138.



Uvažujme, jaké úkazy vznikají v rovině nákresné kolmé k rovině symmetrie YY'.

Je-li tato, jak jsme řekli, vertikální, je rovina nákresná horizontální. Štěrbiny promítají se jako body A a B (obr. 138).

Do bodu P libovolně v rovině nákresné běžícího přichází obě vlnění s rozdílem dráhovým

$$BP - AP = \delta,$$

kterýžto způsobuje určitý rozdíl fásový.

$AC \perp BP$. Vzhledem k tomu, že v praksi jest AB vzhledem ku OM nesmírně malé, můžeme psáti $AP = BP$ a pak lze pozorovati, že $OP \perp AC$ a tedy $\triangle OMP \sim \triangle ACB$, odkudž plyne úměra $\frac{\delta}{e} = \frac{x}{y}$

Tento rozdíl dráhový δ vyjádříme ze souřadnice x, y bodu P a z odlehlosti $AB = e$ štěrbin, jednoduše z úměry

$$\frac{\delta}{e} = \frac{x}{y}.$$

Geometrické místo bodů P, pro něž δ zůstává konstantní, je patrně hyperbola, jejíž ohniska jsou A a B, a jejíž rozměry jsou následující:

velká poloosa $a = \frac{\delta}{2}$ lineární excentricita $= \frac{e}{2}$,

malá poloosa $b = \frac{1}{2}\sqrt{e^2 - \delta^2}$.

Její rovnice:

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$$

(Geometrické místo konstantní retardace.)

Pro určitou vzdálenost y — když úkaz interferenční pozorujeme na vertikální bílé stěně rovnoběžné s rovinou obou štěrbin — probíhá δ rozmanité hodnoty, mění-li se postupně x. Pro úkaz zvláště charakteristickými jsou rozdíly

$$\delta = 2k \cdot \frac{\lambda}{2} \quad \text{a} \quad \delta = (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{2}.$$

V prvém případě vzrůstá se vibrace na dvojnásobnou amplitudu, tudíž intensita osvětlení na čtyřnásobnou hodnotu než by byla od každé štěrbiny jednotlivě.

V druhém případě mizí se vibrace, intensita osvětlení klesne na nulla.

Pro $x = 0$ t. j. pro rovinu symmetrie jest $\delta = 0$, tudíž se vlnění posílí. Roste-li však x, klesá intensita osvětlení až na nullu, pak opět stoupá až k maximu, zase klesá na nullu atd. střídavě, čímž vznikají — při osvětlení homogenním, t. j. pro určité λ — proužky tmavé a světlé.

Pro tmavý proužek v pořadě k-tý jest:

$$\delta = (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{2}, \quad \frac{\delta}{e} = \frac{x}{y}, \text{ tudíž } x = \frac{y}{e}(2k+1)\frac{\lambda}{2}.$$

V tomto a následujících případech mluvíme o úkazech s jasným středem, proto také jejich úkazy, kde střed se stává interferenčně tmavý a pak mluvíme o úkazech s tmavým středem.

Odlehlost proužků sousedních jest patrně $\Delta x = \frac{y}{e}\lambda$. $= \frac{y}{e}(2k+1)\frac{\lambda}{2} - \frac{y}{e}(2k-1)\frac{\lambda}{2}$

Odlehlost tato jest úměrna délce vlny λ. Při světle homogenním fialovém je tedy asi poloviční než při světle homogenním červeném. Z odlehlosti Δx — je-li též y a e stanoveno — lze naopak λ snadno počítati.

Tak se úkaz ntváří prostorově, lze snadno rozšířením úvah těchto pochopiti.

Geom. místo bodů P, pro něž δ zůstává konst. jest rotační hyperboloid, jehož ohniska jsou A, B

Proužky Youngovy lze velmi pěkně pozorovati subjektivně pomocí apparátu zcela jednoduchého. Jím má štěrbinu, kterou kollimující čočkou je přímo do dálky nekonečné. Když se osvětlí světlem natriovým, a když se před dalekohled proti štěrbině postavený dojdík se dalekohledu kolmo a se štěrbinou kollimátoru rovnoběžně dvě úzké štěrbinky, objeví se v okuláru dalekohledu interferenční úkaz Youngův. Obě štěrbiny zjednají se velmi jednoduše tak, že se destička skleněná polepí staniolem a do tohoto že se vyjí dvě úzké linie v odlehlosti asi 1–2 millimetrů vůčeni ne příliš jemným, aby štěrbinky nevyzněly příliš úzké, v kterémžto případě by se úkaz jevil v nedostatečné jasnosti světelné. *)

[* § 194 Zrcadla Fresnelova.


[* Úkazy v předešlém § popsané jsou v základě svém úkazy chybovými. Předeslali jsme je zde proto, poněvadž byly historicky prvními a poněvadž jsou schematicky jednoduchými.

Fresnel snažil se zjednati úkazy interferenční ve vlastním užším slova smyslu bez užívání úzkých štěrbin, hran, stínítek, atd. K tomu cíli upravil svůj pamětný pokus zrcadlový.

Na obr. 139. jsou I a II dvě rovinná zrcátka stýkající se těsně v hraně C a svírající úhel $180° - \varepsilon$, při čemž jest ε úhel velice malý, ve výkresu ze zřetelu k větší zřetelnosti. Rovina nákresná je položena ke hraně C kolmo. Z pravidla bývá hrana C postavena vertikálně; pak je rovina nákresná horizontální.

Před zrcátky ve vzdálenosti $CS = a$ stojí úzká štěrbina rovnoběžná s hranou C a promítající se do roviny nákresné jako bod světlý S. Co platí o tomto bodu, lze rozšířiti snadno na všechny ostatní světlé body štěrbiny.

Obr. 139.



Clonu zrcadly vznikne virtuální obraz bodu S — zrcadlem I v bodu A, zrcadlem II v bodu B. Body tyto budou patrně tím blíže, čím méně se bude lišiti úhel obou zrcadel od 180°.

Od obou zrcadel odrážejí se tedy paprsky světelné z S vycházející tak, jakoby vycházely ze dvou kohaerentních zdrojů A, B. Tím je však převeden celý nákres na případ předešlý.

Postavíme-li kolmo k rovině nákresné a kolmo k rovině symmetrie OM stěnu do vzdálenosti $\overline{OM} = b$ od hrany zrcádek, jest

$$OM = a + b = y.$$

Na stěně vzniknou při homogenním světle délky vlny λ proužky tmavé. Pro k-tý proužek (od roviny symmetrie OM počítajíc — máme při M počátek x


relaci $$x = \frac{y}{c}(2k+1)\frac{\lambda}{2},$$

při čemž jest $$c = 2a \sin \varepsilon.$$

Úhel ε je velmi malinký; místo sin ε lze psáti oblouk ε. Aby úhel ten se dal zmenšiti, zřizují se zrcadla Fresnelova tak, že jedno z nich je pevné, druhé pak může býti otáčeno kolem osy C. Při tom je druhé toto zrcadlo tak upraveno, že může jemnými šroubky postavena býti jeho hrana skutečně do osy C a při pevném zrcátkem mikrometrickém šroubku dá odečísti, o mnoho-li se zrcadlo z polohy původní otočilo. Původní poloha — kdy totiž obě zrcadla představují jednu rovinu — kontroluje se velmi jemným zrcadlením rovného nějakého předmětu, jehož obraz musí se v obou plochách zrcadliti v kontinuitě — hranou C nikterak nepřerušen. Vzdálenost může se také mikrometrickým posunováním mikroskopu s křížem,


kterým celý zjev pozorujeme. Na úpravu zrcadel, která se obyčejně bodní z černého na předu plože broušeného a hlazeného skla, musí ovšem věnována býti největší píle a bedlivost.

Obr. 140. ukazuje úpravu zrcádek Fresnelových v provedení co možná dokonalém.



Obr. 140

Obr. 141. ukazuje, jak lze jednoduchými prostředky dvě zrcádka upraviti pro pokus Fresnelův.



Obr. 141.

Třemi stejnými malými korky voskovými přilepí se jedno i druhé na špalík dřevěný těsně k sobě, a položí se pak na rovnou zrcadlovou silnou desku skleněnou dráceně a zatíží se asi nejvýše závažím 5 až 10 kg. Tímto stejnoměrným dosti silným působícím tlakem promají se zrcátka velmi dobře do jediné roviny. Na to se druhého dne špalík obrátí a tam, kde je společná hrana obou zrcádek, položí se válec na př. novozákonní a málo se přitlačí, aby se zrcátka poněkud k sobě naklonila. Tím se docílí úpravy velice dokonalé, mnohdy lepší než lze ji docíliti obalným přístrojem v obr. 140 znázorněným.

Pokus se děje z pravidla se světlem slunečním. Zrcátka postaví se k štěrbině u heliostatu asi 20 až 30 cm daleko. Poněvadž pak světlo sluneční má paprsky rovnoběžné, vnikáť štěrbinou na zrcátka jen úzký jich svazeček. Proto je výhodno postaviti k nim zrcátka velmi šikmo, tedy ne tak, jak v obr. 139. kresleno, nýbrž s dopadem paprsků téměř po plochách zrcádek.

Má-li se pokus zdařiti, musí býti splněny především dvě podmínky, týkající se zrcádek samých. Geometrická přímka, v níž se jich roviny protínají, musí býti s hranou již má býti společnou, rovnoběžná a musí nad to ještě s ní co možná splývati.

Není-li poslední podmínka splněna, vzniká sice ještě interferenční úkaz, ale vybočuje z roviny symmetrie. Dále pak musí štěrbina býti přesně rovnoběžna s onou hranou společnou. Jinak by dával každý bod štěrbiny úkaz interferenční, ale jeden by se nepřipojoval k druhému v jediný celek, pole je pak prostoupeno šikmo nesmírnými proužky interferenčními. Štěrbina musí býti velmi úzkou, aby čáry vznikly ještě

Úkaz interferenční není vázán na určitou vzdálenost stěny, na níž jej pozorujeme, nýbrž vzniká v celém fysikálním pásmu interferenčním, ve kterém paprsky od zdrojů A a B se prostupují. Úkaz dá se zvětšiti čočkou spojnou (lupou), ale také rozptylnou, touto ještě pohodlněji. Zvětšení není ostatně určité, jde-li se do vzdálenosti z značnějších (8 až 10 metrů).

Poněvadž sluneční světlo je bílé, vznikají proužky barevné. Červeným a modrým sklem je možno zjednati si proužky jednobarevné, střídavě tmavé a světlé.
Proužky u světla fialového jsou těsněji u sebe.
Jest totiž

$$\Delta x = \frac{y}{e}\,\lambda.$$

Velmi zajímavý a poučný jest rozbor spektrální.


Úkaz interferenční zachytíme na diafragmatu s lineární štěrbinou, která se postaví svislo-rovně. Čočkou spojnou se vytvoří reálný její obraz na bílé stěně. Vložíme-li se pak hranol průhledný — s lámavou hranou horizontální — za čočku, vznikne spektrum, šířící se ve směru vertikálním, které je prostoupeno interferenčními tmavými pruhy, jež konvergují k části spektra fialové. Takovýmto způsobem přehledněme jedním pohledem, jak rozestavení tmavých pruhů interferenčních souvisí s délkou vlny světelné. *)

(* § 195. Přesnelovo bipriama.

(* V pokusu předešlém použil Fresnel dvou blízkých zdrojů kohaerentních odrazem ode dvou mírně k sobě skloněných zrcádek, pročež tolež na základě lomu pohodlněji a jistěji je základní myšlénkou bipriamatu.

Budiž C lámavá hrana (na př. vertikální) malého skleněného hranolku, jehož úhel lámavý při C je velmi blízký 180° (obr. 142), světlo nechť dopadá ze

obr. 142



štěrbiny S ležící v rovině symmetrie hranolku. Úhly lámavé u I a II jsou velmi malé a poněvadž ty zde oba při lomu paprsků shodují, nazývá se hranol dvojhranolem bipriamem.

Paprsky a S vycházející lámou se tak, jakoby vycházely ze dvou blízkých kohaerentních zdrojů A a B, tím k sobě bližších, čím lámavé úhly I a II jsou menší. Jsou virtuálné zdroje A a B budou téměř v téže vzdálenosti od hranolu jako S. Na stínítku objeví se interferenční proužky tvaru jasného kroužku M symmetricky rozvádnuté, vedle toho na krajích objeví se ještě jiný systém proužků pocházející však od interference paprsků difrakčních.

Vzdálenost k-tého proužku od středního určí se jednoduše takto:
Je-li φ lámavý úhel hranolu jakéhokoliv, δ minimální úchylka hranolem způsobená, jest, jak známo:

$$\frac{\sin\frac{1}{2}(\varphi+\delta)}{\sin\frac{1}{2}\varphi} = n$$

relativní exponent lomu hranolu.

Jsou-li úhly φ a tudíž i δ velmi malé, platí rovnice:

$$\frac{\frac{1}{2}(\varphi+\delta)}{\frac{1}{2}\varphi} = n \text{ čili } \frac{\delta}{\varphi} = \frac{n-1}{1} \text{ čili } \delta = (n-1)\varphi.$$

Pro k-tý proužek tmavý jest jako dříve:

$$d = \frac{y}{e}(2k+1)\frac{\lambda}{2},$$
$$y = a + b$$
$$e = 2a\sin\delta = 2a(n-1)\varphi.$$

Bipriama působí tedy jako zrcátka Fresnelova s úhlem, který jest od 180° rozdílný o úhel $\varepsilon = (n-1)\varphi$.

Proužky interferenční, povstalé bipriamatem, liší se od předešlých tím, že hranoly skleněné způsobují zde — při pokusu s bílým světlem — rozklad světla. Budou tedy virtuálné zdroje paprsků fialových A_f a B_f poněkud více od sebe vzdáleny než virtuálné zdroje paprsků červených $A_č$ a $B_č$, a tudíž, pozměníme-li původní výraz pro vzdálenost k-tého tmavého proužku v barvě červené a fialové v:

$$x_{č} = \frac{a+b}{s_{č}B_{č}}(2k+1)\frac{\lambda_{č}}{2}$$
$$x_{f} = \frac{a+b}{s_{f}B_{f}}(2k+1)\frac{\lambda_{f}}{2}$$


Tmavé proužky v barvě fialové jsou tedy ještě více zmenšené než u zrcátek.

Proužky interferenční způsobené hranolem jsou jasné, poněvadž může mnoho světla na hranol dopadati — postavení aparátu nečiní žádných obtíží, tak že pozorování interference hranolem je velmi jednoduché. Tudíž jsou jen proužky plynové povšechně vystupující, jež se hlavně ve spektrálním rozboru jako sekundární soustava jeví. *)

(*§ 196. Fokus Lloydův.

(*Obr. 143. ukazuje uspořádání pokusu Lloydova. MN je černé skleněné zrcadlo (neb kovové zrcadlo), nad A bodem svítícím (štěrbina). Obraz tohoto bodu, B, tvoří druhý blízký zdroj kohaerentní.

Obr. 143.




Na stínítku C jeví se interference paprsků z A přímo vycházejících a od zrcadla odražených, tedy jakési z B vycházejících. Poněvadž světlo odražené dopadá na stínítko nad bodem C, zdá se, že může býti pozorováno vždy méně než polovice celého pásu interferenčního tak, jak je známo z pokusů předcházejících, bez však vložením čočky, kterým proužky prozářené, proužky sečinovati tak, že celý úkaz činí dojem dvěžjích proužků Fresnelových. Lloyd tvrdí, že centrum tohoto systému interferenčního neodpovídá přímce, v níž se rovina zrcadla protíná s rovinou stínítka, ale že jsou proužky posunuty o polovičního šířku jednoho proužku od hrany zrcadla. To prý se vysvětluje tím, že světlo odražené je proti přímému mycelikrát o polovičního délku vlny anebo že jeho fáze zvětšila se o π při odrazu. *)

(*§ 197. Billetovy dvojčočky.


(*Billet vzpilil čočku spojnou (obr. 144.) a upravil obě polovice tak, že mohly býti přibližovány neb od sebe vzdalovány mikrometrickým pohybem.

Obr. 145. ukazuje takovou dvojčočku I II v průčelí. Každá polovice dává pro sebe reálný obraz, tak že vznikají blízké kohaerentní zdroje A B, a to reálné, čímž se případ tento podstatně od předešlých liší. Na stínítku M povstávají proužky interferenční.

Obr. 144.




Obr. 145.



G. Meslin (1893) modifikoval pokus tento tím způsobem, že vhodně volil body A a B v přímce rovnoběžné se směrem šíření se světla, tak že povstaly proužky interferenční ve formě kruhové. Obr. 146 objasňuje toto uspořádání. Čočky jsou nestejně vzdáleny od svítícího zdroje S, tak že reálné obrazy vznikají vzniklé na jeho společné ose vedle sebe v A a B.

Obr. 146.




Plochy konstantní retardace nejsou v tomto případě rotační hyperboloidy, ale rotační ellipsoidy, jichž ohniska jsou A a B. Příčný řez takových ellipsoidů stínítkem C je vlastně soustava kruhů; sestává tedy úkaz interferenční z jasných a tmavých kruhových pásů. Tyto nejsou však úplny, neboť interferují patrně pouze paprsky na jedné straně společné osy, tak že nanejvýše polokruhy mohou vzniknouti. *)

(*§ 198. Proužky Talbotovy.

(*Interferenční proužky Talbotovy objeví se nejlépe při spektroskopu, když část paprsků ať na hranol dopadajících neb z něho již vycházejících anebo právě před

okem pozorovatele vždy projíti musí velmi úzkou destičkou skleněnou tak, jak znázorňuje obr. 147.

obr. 147.



Její poloha destičky označena jest čísliceni. Talbot (1837) popisuje vlastně pouze 3.


Pozorovatel v P ve všech třech případech vidí spektrum postoupeno tmavými pruhy, tak že spektrum se podobá absorpčnímu spektru plynu.

Talbot vysvětlil úkaz tento — svým nedokonale — pouhou interferencí paprsků, z nichž jedny jdou deskou a zpozdí se tudíž o δ proti paprskům, které jdou mimo destičku. Je-li $\frac{\delta}{\lambda}$ celé číslo, pak obě řady paprsků budou souhlasiti ve fási, naopak je-li $\delta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$, pak bude rozdíl ve fási takový, že paprsky příslušné dají na tom místě intensitu nulovou. Poměr $\frac{\delta}{\lambda}$ však se mění ve spektru od barvy k barvě, tak že souhlasná fási a půlperiodový rozdíl jich budou se střídati od jednoho konce spektra k druhému — ve spektru objeví se tedy temné pruhy. *)

(* §199. Proužky Fowellovy.

(* Do dutého hranolu ABC, který je naplněn kapalinou o velkém indexu lomu (jako je na př. olej kassiový), ponoří se destička skleněná D tak, aby mířila ke hraně lámavé B. Utvoříme-li tímto hranolem spektrum, objeví se v něm proužky interferenční rovnoběžné s hranou lámavou. Tloušťka destičky podmiňuje počet a šířku interferenčních proužků, které jsou při některých kapalinách nerovnoměrně. Čím je destička tlustší, tím je proužků více a jsou jemnější.

obr. 148.



Stokes ukázal, že proužky Fowellovy za přítomnosti nepřítomnosti nevzniknou, jedná-li se o destičku skleněnou a vodu nebo o tekutinu, že však se objeví, ponoří-li se deska blíže k hraně lámavé tak, jak to ukazuje obr. 149. *)

obr. 149.



§200. Barvy tenkých vrstev.

Ve všech předešlých případech bylo nutnou podmínkou interference míti stroje světelné omezené na bod nebo soustavu bodů, t. j. úzkou štěrbinu.

Je známo mnoho zjevů o interferenčních zjevech velmi častých, v přírodě i domě skvělostí mnoho se vyskytujících, při nichž tato podmínka nutnou není. Dopadá-li bílé světlo denní na mýdlovou bublinu nebo na tenkou vrstvu oleje po hladině splývajícího, objeví se povrch bubliny a v druhém případě oleje krásně duhově zbarvený. Boyle a Hooke proto studovali tento zjev, Hooke-ovi podařilo se vypouknouti ze skla tak tenké balonky, že na nich mohl zmíněné duhové barvy pozorovati.

Barvy tenkých vrstev mění se s tloušťkou vrstvy; když tato se zvětšuje nenáhle mění; když naopak se zmenšuje, mají náhle, jakmile tloušťka klesla pod jistou mez. Lehce lze pozorovati tento úkaz na blance mýdlové kapaliny, roztřené v kruhovém prstenci ve svislé obručce. Držíme-li blánu svisle, ukazují se barvy duhové nejdříve v nejvrchnějším místě blány, uspořádány jsouce v barevné pásy rovnoběžné vodorovné; dole kde stékáním kapaliny tvoří se blána nejsilnější, je zabarvení nepatrné. Čím se blána více tenčí, (stékáním a vypařováním se kapaliny), tím barvy stávají se živějšími, až konečně nejhořejší část blány objeví se úplně černou a blána stane se tak tenkou, že nevydrží vlastní vahu a praskne. (Velmi krásně v projekci světlem slunečním.)

Podobné barvy tenkých vrstev pozorujeme na povrchu kalené a pak na pouštěné oceli; vznikají tenkými vrstvami oxydu na povrchu rozžhaveného a slouží k posouzení, jak daleko se tvrdost oceli napouštěním zmenšila.

Sem náleží také barevné proužky, které se utvoří, stiskneme-li k sobě dvě rovné destičky tak, že mezi nimi zůstane tenoučká vrstva vzduchu.


Podáme výklad tohoto zjevu, rozeznávajíce případ, kdy vrstva tenoučká je ústředním hustším než vzduch, a pak kdy vrstva takovou jest vzduch

sám uzavřený — z pravidla — mezi sklem. Oba případy nejsou ovšem principielně od sebe rozdílny, avšak oba rozeznávati má důvody názoru didaktického.

§ 201. Tenké destičky.

Budiž dána tenká destička MN (obr. 150) opticky hustší než vzduch, na př. skleněná, slídová anebo blanu mydlinovou, vrstva olejová a pod. Relativní exponent lomu vzhledem ke vzduchu budiž n, tedy $n > 1$; tloušťka její budiž e.

obr. 150.



Paprsek SA na destičku dopadající částečně se odráží, částečně vniká směrem AB do destičky; v bodě B se zase zčásti odrazí, zčásti vyjde; část světla se vrátí do směru BC, zde pak opět část se láme a přechází do vzduchu směrem CZ. Do téhož směru vyjde však ještě paprsek $S'C$ a téhož zdroje světelného vychází-jící. Paprsek $SABCZ$ má patrně retardaci dráhovou proti paprsku $S'CZ$, která způsobuje rozdíl fázový; tudíž interferují buď se vzájemně posilující nebo oslabující.

Rozdíl dráhový paprsku jednoho proti druhému vypočítáme, vedeme „rovinné plochy" AC a CD a pamatujíce (dle principu Huygensova), že délky AD a BC jsou izochronní. Zbývá pak retardace — přičtená v dráhách v destičce vykonaných —

$$\delta = BD + BC$$

čili


$$\delta = 2e\cos\beta,$$

jak z obr. 151., α) nebo 151., β) ihned vyvítá, při čemž jest e tloušťka destičky, β úhel lomu paprsků.

V dřívějších úvahách o interferenci jsme pravili, že vzniká maximum intensity světelné, je-li δ rovno sudému, minimum pak, jest-li δ rovno lichému počtu polovln, předpokládajíce tam vždy retardaci dráhovou ve vzduchu. Zde bychom tedy též usouditi, že vzniká maximum neb minimum dle toho, je-li $\delta = 2e\cos\beta$ rovno sudému neb lichému počtu polovln, jaké jsou

v úsředí destičky.

obr. 151.



Představme si však, že tloušťka destičky neustále zmenšuje až k vrstvě nekonečně tenké, pak by byla difference $2e\cos\beta = 0$ a oba paprsky, mající stejnou fázi, měly by se zesilovati. Z toho tedy vyvozujeme, že v tom případě se paprsky neodrážejí, nýbrž procházejí skrze. Musí býti tedy hranice sousedních prostředí fázový, bude patrně záležeti ještěmu na jiném než na pouhém rozdílu dráhovém δ obou paprsků.

V případě pokusu Youngova, dříve provedeného, srovnávali jsme dráhy paprsků, jak se nerušeným postupem světla ve vzduchu jevily. Dle toho nejde světlo postupem přímým, nýbrž odrazem. Paprsek SA odráží se v části AB na ploše destičky dolejší, tedy na rozhraní směrem k úsředí hustšímu. Tím vzniká důležitý rozdíl, který vystihneme, mající na mysli názorný a odvozený (Akustika § 10). Vlna odrážející se na úsředí řídším vrací se stejnou fází, v jaké právě dopadla, naproti tomu vlna odrážející se na úsředí hustším, vrací se s fází opačnou — takže jakoby postupově bylo o $\frac{\lambda}{2}$ pošinuta.

Totéž podobného platí v případě našem. Paprsek $SABCZ$ se odráží na úsředí řídším, avšak paprsek $S'CZ$ na úsředí hustším než vzduch, proto dozírává tento proudění o $\frac{\lambda}{2}$ měřené ve vzduchu. Této proudění přistoupí tudíž k onomu δ, jež jsme však měřili v destičce. Ve vzduchu je přepočítáme, násobíce relativním exponentem lomu n. Bude tedy retardace dráh celkem $= 2en\cos\beta + \frac{\lambda}{2}$ přepočítaná na vzduch, při čemž je $n = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$.

Je-li tedy tato úhrnná retardace rovna sudému počtu polovln pro vzduch počítaných, vzniká maximum, je-li rovna lichému, vzniká minimum intensity; tedy totéž minimum bude při

$$2en\cos\beta + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

čili při

$$2en\cos\beta = 2k\frac{\lambda}{2} = k.\lambda.$$

Jiný tvar výrazu $2en\cos\beta$ .. jest ... $2e\sqrt{n^2 - \sin^2\alpha}$.


ze vzorce $n = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$

Tím je vržen veškerá nesrovnalost důvěrně odstraněna úplně. Úvahy předešlé platily pro homogenní světlo, tedy světlo určitého druhu barvy – dopadá-li však na destičku světlo bílé, pak je vržen podmínka maxima a minima osvětlení pruměněna, neboť pro různé délky vlny jsou různými také exponenty n. Každé místo destičky bude (ovšem při tloušťce destičky v jistých mezích) se jeviti barevným, poněvadž z místa tvho nebudou vycházeti paprsky, pro které platí

$$k\lambda = 2e\,n\cos\beta = 2e\sqrt{n^2 - \sin^2\alpha},$$

kde značí číslo celé. Bude tedy barva příslušného místa záležeti na tloušťce destičky a na úhlu dopadu. Mění-li se úhel dopadu od místa k místu nebo tloušťka destičky, ukáží se na destičce ve světle bílém barevné pruhy, odpovídající ovšem změnám. Spektrum dané světlem odrazeným a vycházejícím tudíž od takové destičky bude prostoupeno tmavými čarami na důkaz, že skutečně některé paprsky na pozorovaném místě chybí. Počet těchto tmavých proužků jakož i vzdálenost jich postavení bude záviseti o rozdílu tloušťkou destičky, tak že při určité tloušťce sousedních a velmi blízkých těch proužků nerozeznáš. V tom případě jeví se blána neb destička prostému oku tímže bílou. Čím je destička tenčí, tím méně se překrývají jednotlivé paprsky přes sebe, tím spíše lze zjev ten interferenční pozorovati. Čím více je světlo homogenní, tím spíše se paprsky interferencí od sebe oddělí, nekryjíce se a tím silnější může býti vrstva neb destička interferenci působící.

Důvěrnější úvahy vedou k tomu, že zjev popsaný je složitějším než jak dosud vyloženo. Uvnitř destičky nedeje se totiž pouze odraz jediný na druhé ploše, nýbrž přistupuje k tomuto následující odraz na ploše hořejší, opětný odraz na ploše dolejší atd., tak že může na př. interferovati odražený paprsek SAZ (obr. 152) s paprskem $SA'B'AZ$ nebo $SA''B''A'B'AZ$ nebo $SA'''B'''A''B''A'B'AZ$ atd.



obr. 152.

Jest tedy předešlý případ prvním approximací ke skutečnosti, neboť ve směru AZ vychází ve skutečnosti paprsků celá řada, která interferuje s retardacemi δ, 2δ, 3δ, . . . , ovšem že paprsky

vzdálenější od místa A mají následkem četnějších vnitřních odrazů menší a menší intensitu světelnou.

Pro poměr podrobnější je nutno znáti poměry mezi intensitou světla dopadajícího, lomeného a odraženého, a relace mezi koefficienty reflexe a refrakce. Ukazuje se však i pro poměr podrobnější, že *hlavní výsledek* se odvodí *stejným* předpokladem nejjednodušším.

§ 202. Pokračování. Vrstvy vzduchové. Proužky Newtonovy.


Jako u tenkých destiček neb vrstev, jež jsou ve vzduchu, právě tak lze i u tenkých *vrstev vzduchových*, jež jsou navrženy mezi jinými tělesy průhlednými jako sklem, vápencem islandským (puklinou), slídou a pod., pozorovati jevy interferenční. Odvození s předešlým podané zůstává v platnosti. Rozdíl δ jest jako tenkráte

$$\delta = 2e\cos\beta,$$

tento rozdíl dle vržen *nesmí* přepočítati na vzduch – poněvadž již pro vzduch platí – odpadne tedy množství exponentem n. Poněvadž se pak paprsky interferující odrážejí jeden na vzduchu – kde není změny fáze – a druhý na skle neb vápenci a pod. *ve* vzduchu, – při čemž fáze přejde v opačnou – působí i zde k retardaci hořejší $\frac{\lambda}{2}$ a vše platí tedy pro vzduch (obr. 153).

Je tedy celkově

$$\delta = 2e\cos\beta + \frac{\lambda}{2}.$$



obr. 153.

Minimum světelné intensity nastává, je-li

$$\delta = (2k+1)\frac{\lambda}{2},$$

tedy když jest


$$2e\cos\beta = k\lambda.$$

Tenké vrstvy vzduchové vzniknou zejména, když položíme skleněné plochy na sebe. Kdyby tyto plochy byly roviny v nejpřesnějším slova smyslu, a kdyby jich přiložením na sebe vznikla tenoučká vrstva vzduchová konstantní tloušťky e, jevila by se při osvětlení homogenním světlem – (na př. natriovým) – v určitém směru dopadajícím


celá plocha v tíži intensitě světelné, po případě celá tmavá, kdyby bylo $2e\cos\beta = k\lambda$.

Takový případ však nenastane nikdy. I když jsou desky velmi dobře rovinné a když je položíme na sebe, vznikne na příklad vrstva klínovitá, při níž se tudíž e lineárně mění, anebo vrstvy prvého složitější. To se jeví pak periodickým střídáním se jasnějších a tmavších míst — ukážou se interferenční čáry, dle jichž průběhu lze velice citlivě souditi, zda-li ony roviny tvoří vrstvu geometrický klínovitou anebo tvaru jiného. Nepatrné přitisknutí obou desek k sobě jeví se zřejmým posunutím interferenčních čar. Jest zde dán neobyčejně citlivý optický prostředek, jak lze takové temné vrstvy na jich tloušťku zkoumati.

Tak zvané kroužky Newtonovy vzniknou, když na desku skleněnou, která je rovinná, položíme dutinou, která je konvexní (obr. 154. a.), ovšem velice málo konvexní. Vy výkresu je zakřivení skleněné ohromně přehnáno k vůli zřetelnosti. Ve skutečnosti míval ona konvexní plocha poloměr asi 20 metrů, (jak sferometrem lze zjistiti.)



ob. 154. a)



ob. 154. b)

Následkem toho nelze ani křivost skla hrubšího okem neb hmatem poznati a ukáže se teprve zjevem interferenčním samým.

Podmínka maxima $2e\cos\beta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$

a minima $2e\cos\beta = 2k \cdot \frac{\lambda}{2}$,

kdež jest k číslo řadové 1, 2, 3, 4 atd., platí i zde. Poněvadž se pak e od hodnoty nulové při bodě dotykovém o vzdálenosti ρ (obr. 154. b) mění nyní rychleji, vznikne při osvětlení homogenním koncentrické vždy kruhy k sobě se druhé interferenční tmavé kruhy, při osvětlení bílém vzniknou kruhy barevné.

Na základě relace $\rho^2 = e(2R - e)$

čili s velkou approximací $\rho^2 = R \cdot 2e$,

poněvadž e proti $2R$ lze zanedbávati dá se měření tloušťky $2e$ převésti na pohodlnější měření poloměrů ρ kruhů. Platí tedy:

pro kruhy světlé $\frac{\rho^2}{R}\cos\beta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$.

„ „ tmavé $\frac{\rho^2}{R}\cos\beta = 2k \cdot \frac{\lambda}{2}$

Je-li tudíž R známo a měří-li se poloměry ρ, jest možno při známém úhlu β (nejjednodušeji $\beta = 0$) počítati délku vlny λ homogenního zdroje světelného.

Měření takové provedl I. Newton užívaje velkého objektivu dalekohledního dálkou ohniskové 40' (anglických stop), což jest při čočce bikonvexní téměř také hodnotě poloměru zakřivení R. Z úkazu zmíněného soudil Newton správně na periodicitu světla, vykládaje ji ovšem na základě své theorie zvláštním, jakýsi tajný částečky světelné, postupující ústředím, nabývaly „náklonnosti" buď snáze se odrážeti nebo snáze prostupovati. (fits of easy Reflexion or of easy Transmission. Slovo fit znamená náladu, schopnost, — odjedním fit značí zchvatný, křečovitý), při čemž postup těchto náklonností časový je závislý na barvě. Je však zajímavo, že touto časovou periodicitou, která se měla jeviti v onech náklonnostech částeček světelných, vystihl již podstatu světla a že provádějc svá měření první vlastně měřil délky vln.

Čísla jeho přepočítaná na mm a celé λ dávají

pro světlo červené 0,00064 mm,

„ „ fialové 0,00041 „ .

Výsledky tyto, poněvadž se vztahují k barvě, jsou ovšem dosti nemučité, a tím pamětihodné, že takto poprvé ukázán způsob, jímž možno měřiti délku vlny světelné.

Dle rovnice hořejší záleží výsledek měření na úhlu dopadu, tu byl 4° při měření Newtonových. Newton ukázal, že poloměr kruhů stane se menší, nalézá-li se mezi okem a sklo voda místo vzduchu, čímž dokázáno, že světlo se šíří volněji ve vodě než ve vzduchu.

Ve světle bílém jsou kruhy zbarveny, ubývá pro červené světlo jsou kruhy širší než ve světle fialovém, postup barev u jednotlivých kruhů zaznamenal Newton takto:

(1.) černá, modrá, bílá, žlutá, červená ; (5.) zelenomodrá, červená ;
(2.) fialová, modrá, zelená, žlutá, červená ; (6.) zelenomodrá, světle červená ;
(3.) purpurová, modrá, zelená, žlutá, červená ; (7.) „ „ červenobílá.
(4.) zelená, červená ;

(Newtons Scale of Colours.)

Newtonovy kruhy vznikají však nejen ve světle odraženém, nýbrž i ve


světle propuštěném, jsou však k sytému předešlému komplementární; ukazují se totiž na těch místech kruhy světlé, kde ve světle odraženém vznikají kruhy tmavé a obráceně, uprostřed je tedy bílé místo kruhové. Kruhy tyto jsou mnohem méně jasny než předešlé, ponevadž paprsky interferující mají velmi rozdílnou intensitu. Kruhy tmavé nejsou tudíž úplně tmavy a proto svazem mezi nimi prošly jasné tak brilantně nevynikají.

Pozorujeme-li kruhy ve světle odraženém a propuštěném současně, pak dle předešlého musí se objeviti jednotné osvětlení celého pole. Takovýmto pokusem ukázal Arago komplementární effekt obou systémů kruhů Newtonových.

Pozorovatel v O (obr. 155 a) vidí totiž zároveň obraz způsobený odrazem světla B (od bílého horizontálního papíru AB) vycházejícího, ale i obraz způsobený světlem z A vycházejícím a procházejícím sklem Newtonovým.

Oba obrazy jsouce komplementární kombinují se tak, že pozorovatel spatřuje stejnorodou bílou plochu. Přikryje-li však jeden nebo druhou stranu oné bílé horizontální plochy černým plechem, objeví se ihned kruh, vznikající druhou nepřikrytou bílou polovičkou, buď odrazem neb lomem (obr. 155. b).

obr. 155.





§203. Projekce kroužků Newtonových.

Obraz interferenčních proužků Newtonových při odrazu světla vznikajících lze projekcí na velké bílé stínítko učiniti zřetelnějším a pro objektivní pozorování přístupnějším. Nejlépe svazem světlem slunečním.

Osvětlí-li se přístroj Newtonův (obr. 156) světlem slunečním úzkou dopadajícím a promítá-li se čočkou spojnou paprsky dostatečně silnou, obrazí se na bílé stěně soustava barevných proužků oncem z počtu jen skromného. Jsou barvy ony jakživy také čisté jak bychom očekávali. Příčinou toho jest odraz světla na první skleněné ploše, kterýmž na stínítku vzniká světlá půda,

obr. 156.



pak vlastní interferenční jevy padá. Barevné proužky nepromítají se tudíž na plochu tmavou, nýbrž již světlou; proto jsou barvy bledé.


Vkládáním barevných skel (červeného, zeleného, modrého) lze zjednati osvětlení světlem přibližně homogenním, načež počet proužků značně stoupne.

Nejlépe je však k osvětlení užívati barev spektrálních. K tomu cíli volíme se na přístroj Newtonův spektrum, nejlépe hranolem jinublikovým vytvářené; téže šířky jakou jest průměr skel Newtonových, nikoli snad větší, ponevadž by tím barvy spektrální zbytečně ztrácely na své jasnosti. Počet proužků vznikajících je pak velmi veliký — dojíti se až na pamě okují skel Newtonových pledovati.

Otáčí-li se vhodně hranolem, přicházejí přes přístroj Newtonův postupně jednotlivé barvy spektrální — i je pak velmi zřetelně viděti, jak se proužky při přechodu k osvětlení fialovému smršťují.


Než při všech těchto pokusech je obraz světla neinterferujícího na první rovině M N skleněné Newtonových závaděn (obr. 157).

obr. 157.



Odpomoci tomu lze způsobem, jejž znázorňuje obr. 158.

obr. 158.



§204. Spektrální rozbor proužků Newtonových.

Zajímavo je pozorovati Newtonovy kruhy, povstalé odrazem světla bílého, spektrálně. Pokryjeme-li kruhy Newtonovy centrálně stínítkem s horizontální štěrbinou, a pozorujeme-li tuto štěrbinu hranolem s horizontální hranou lámavou, obdržíme spektrum, které je prostoupeno tmavými pruhy z červeného světla do fialového se sbíhajícími vpravo, širokými, ku kraji vždy užšími.

Objektivně lze úkaz ten velmi dobře předvésti způsobem tímto. Na Newtonův aparát (obr. 156) promítne se spojnou čočkou (na př. mohutnosti $\frac{1}{2}$ dioptrie) do zátky

stáží reálný obraz lineární štěrbiny v heliostatu.

Paprsek se zachytí na př. pod úhlem 45°. Vzniká odraz a ten pozdržím na první ploše sklíčka (neinterferenční); tento se zachytí černým papírovým stínítkem, aby jeho rozbor spektrálním nepřekážel. Pak se odráží dále ve směru povšechné odchýleném světlo interferující – toto se vede na spojnou čočku projekční, za níž stojí hranol na př. sirouhlíkový, a spektrum jeho se zachytí na stínítku bílém.

Spektrum je velice zajímavé, hmoty jsou zvýšené, interferenční čáry zřetelné; tím, že do spektra světla na první ploše odražené nepřijde, docílí se i při obyčejném nástroji Newtonovou velmi dobrého výsledku. Obyčejně se pozoruje ještě třetí – ba i čtvrtý odraz; tyto další odrazy nutno též dovnitř stínítkem zachytiti – jinak by se ve spektru úkazy komplikovaly.

Interferenční pruhy ve spektru jsou uprostřed široké – rozumí se na tom místě, kde obraz štěrbiny jde přes centrum sklíčka – ku kraji spektra stávají se užšími a obyčejnými – a ovšem přibírají se směrem ku konci spektra fialovému.

§ 205. Znázornění konstrukcí.

Jak dříve uvedeno, nastávají maxima a minima při

$$e\cos\beta = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$$

$$e\cos\beta = 2k\cdot\frac{\lambda}{4}.$$

Aby se při světle bílém dalo snáze si představiti, které barvy mají při určité tloušťce e své maximum a které své minimum, udal E. Mach konstrukci následující:

Spektrum světla bílého jde asi od $\lambda = 0{,}760\,\mu$ až do $\lambda = 0{,}400\,\mu$.


Čára Fraunhoferova A má $\lambda = 759{,}4\,\mu\mu$

„ „ H „ $\lambda = 396{,}9$ „.

Vedeme tedy (obr. 159) horizontální přímku a naneseme na ni od bodu O vycházející tyto délky vln, jak odpovídají jednotlivým čárám Fraunhoferovým, užívajíce pořízeného vhodného měřítka. V obrazci našem je A naneseno jako 100 mm, tedy OA = 76 mm, OH = 39,7 mm; čáry ostatní jsou pak dle své délky vlnové rozestaveny. Toto rozestavení

jsou linie dále vlnové, bylo by tedy takové jako je ve spektru normálním.

Obr. 159.



Vůbec budiž poměr délek vln fialových a červených $\frac{\lambda_H}{\lambda_A} = \frac{1}{2}$, pak budiž $e\cos\beta$ pro fialové světlo $= 1\,\mu = 0{,}001$ mm, pro červené $2\,\mu = 0{,}002$ mm.


dostaneš na mnoho millimetrů je zjev interferenční patrný.

§ 206. Modifikace pokusu Newtonova.

Velmi pěkně modifikovali pokus Newtonův W. Herschel a F. Talbot. Uspořádání Herschelovo dostatečně vysvítá z obr. 160.


Retardace 2 e cos β jest v tomto případě dostatečně malá i při patrné vzdálenosti hranolu a rovné desky, neboť β jest tu úhel veliký a tudíž jeho cos β malý.

obr. 160



F. Talbot přiložil dva pravoúhlé hranoly jich hypotenusami k sobě tak, jak to předvádí obr. 161. (srovnej optika geometrická obr. 51.)

obr. 161.



Proužky vystupují i ve světle odraženém i propuštěném v okolí nedaleko přímky totální reflexe; hranol se přiměřeně stíní. Užívá se světla denního nebo slunečního. Úkaz lze velmi pěkně promítati (bez čočky).

(* § 207. Barvy silných vrstev.

(* Interferenční proužky způsobené silnými destičkami skleněnými pozoroval 1815 D. Brewster. Jednoduché schéma jeho přístroje ukazuje obr. 162. M N je trubice na jednom konci opatřená malým otvorem C, kudy vniká světlo.


A a B jsou dvě úplně stejné desky skleněné, z nichž jedna (A) je kolmo na směr paprsků z C přicházejících, druhou (B) lze pak velice málo k předešlé přesným mikrometrickým skloniti. Pozorovatel dívající se do trubice konce M N, spatřuje interferenční proužky.

M B A C N

obr. 162.

Úkaz tento povstává interferencí paprsků z C přicházejících, z nichž některé dozrávají na své cestě reflexí jak mezi destičkami tak i uvnitř destiček, jak to ukazuje obr. 163.


obr. 163.



(* § 208. Jaminův refraktometr.

(* Na základě Brewsterově založil Jamin velmi přesný stroj k měření indexu lomu. Podstatnou částí apparátu jsou dvě planparallelní silné desky (asi 1 cm) z čistého co možná stejného skla, které lze na pevném stativu v libovolné vzdálenosti od sebe upevniti. Zadní stěny desek jsou postříbřeny, obě desky lze pomocí stáčecí kolečky kol svých horizontální, z nichž jedna z nich též kolem svý vertikální. Postavení obou ukazuje obr. 164.

obr. 164.



Šipsek z S vycházející odráží se na první ploše desky I v bodě A, jde směrem A B, vniká do druhé desky, odráží se zde od zrcadlící plochy druhé v bodě C a vychází pak po opětném lomu v bodu D směrem D E. Vedle toho se však paprsek S A také do desky I a odráží se tu v bodě F, opětně se láme, jde v G vychází ve směru G D a odrazí se od desky II jde zpět dále takléž směrem D E.

Jsou-li obě desky stejně silny, stejného indexu lomu, jsou-li jich stěny přesně rovinny a rovnoběžny, a je-li i vzájemná poloha jich rovnoběžná, pak patrně oba paprsky probíhají totéž dráhu a vycházejí ve směru společném D E bez rozdílu fásového, tak že pozorovatel v E, dívá-li se směrem E D, vidí stejnoměrně osvětlenou plochu.


Představme si však, že desku II otočíme kolem osy horizontální o malý úhel, tak že se roviny obou desek budou protínati v přímkách (ovšem velice vzdálených) horizontálních, pak nebude cesta obou paprsků totožná, dráhy B E a G D se prodlouží proti drahám A F a F G, a následkem toho objeví se horizontální proužky interferenční. Proužky tyto budou obsahovati centrální proužek bílý, odpovídající nulové retardaci obou paprsků. Proužky tyto budou patrně ty, které dopadají na obě desky pod stejným úhlem (symmetricky) čili které jsou

s rovinou půlicí úhel svíraný rovinami skleněných desek. Mikrometrickým sklá-
něním desky II lze docíliti tedy přinutí centrálního proužku, a tím i celého
systému interferenčního.

Paprsky A B a G D jsou od sebe dosti odehlé – i může v jich dráhu býti položena
trubice obsahující nějaký plyn neb kapalinu neb destičku z nějaké látky průhledné
i může pak z přinutí systému interferenčního souditi se na relativní rychlost
světla v oné látce proti vzduchu.

Ve skutečnosti měříme se retardace paprsku jednoho proti druhému tak zvaným
kompensatorem Faminovým, jehož schéma podává obr. 165.

obr. 165.



Jsou to dvě desky skleněné M, N na společné ose O O'
upevněné, tak že svírají konstantní úhel. Jeden paprsek
(A B) jde jedním destičkou, druhý (G D) druhou.
Každá destička způsobí retardaci, ale nestejnou dle
úhlu dopadu; čím je úhel dopadu menší, tím je také
retardace, příslušnou půlkou kompensátoru způsobená,
menší.


Stočením kompensátoru lze docíliti buď tedy retardace
stejné, když oba paprsky jdou symmetricky k rovině půlicí úhel obou destiček kom-
pensátoru, aneb nestejné retardace a to takové, aby se retardace paprsků kompensovala.
Úhel stočení kompensátoru se měří, kompensátor se před měřením nejlépe graduje
ze známých indecí lomu. Citlivost tohoto přístroje lze měniti osvětlením neb oddá-
lením obou desek.

Faminův interferenční refraktometr vyniká tím, že lze užíti i zdroje světelného
větších rozměrů tak totiž, že v cestu paprsků z II destičky vycházejících, klademe
spojnou čočku, která paprsky rovnoběžné v ohniskové rovině spojuje. Tyto zářivé
obrazy interference pozorujeme se lupou, tím nabýváme stroje velmi dokonalého a
a všestranného.

Faminův refraktometr může býti pozměněn ve svém uspořádání tím, že na místě druhé
destičky užijeme 2 zrcadel v pravém úhlu k sobě skloněných. Uspořádání patrno z obr. 166.

Paprsek S dopadá do bodu A, odráží se a postupuje dále drahou
A B C D E A a zpět, vedle toho však bude se, tak že jeho cesta je A E D C B A.

obr. 166.



Skloníme-li však zrcadla II a III poně-
kud, pak dráha v destičce není pro oba
paprsky stejná, jednou A B D, podruhé
poněkud větší, tak že směrem A S vycháze-
jící dva paprsky s rozdílem ve fási.
Aby tento směr A S, který spadá se smě-
rem přicházejícího světla, byl odchýlen,
dává se v chod paprsků S A destička
F, jež je polo-průhledná a polo zrcadlící.
Interferenční zjev lze pak pozorovati ve směru S F.

(* §209. Newtonovy kruhy koukávním zrcadlem.


(* Malým kruhovým otvorem vniká světlo do zatemněné světnice a dopadá na
dutě veliké zrcadlo, jehož druhá plocha zrcadlí. Postavíme-li do středu křivosti
zrcadla list bílého papíru, opatřeného kruhovým otvorem, aby jím světlo mohlo na
zrcadlo divergentně dopadati, odráží se všechny paprsky zpět, tak že je-li snem
otvor právě v ose zrcadla, na jeho místě vzniká jeho reálný obraz. Je-li první plocha
zrcadla poněkud méně uhlazena (pokrytá na př. roztokem mléka ve vodě, který byl
ostaven k vypuštění, anebo poprášena pilinami, moučkou pýřovou, nebo má-li nádech
vodních par), pak na listu papíru kolem reálného obrazu vznikají barevné kruhy.

Podmínky tyto již poukazují k tomu, že vysvětlení úkazu hledati dlužno v
interferenci světla jednak pravidelně, jednak diffusně se šířícího, poněvadž úkaz ne-
zcela hladkých plochách, kde diffuse světla odpadá se neobjeví.

Budiž (obr. 167) dáno zrcadlo skleněné duté na vnější ploše zrcadlící, (jak
obyčejně zrcadla taková o folii stříbrem bývají); tloušťka budiž e, poloměr R,
střed geometrický O. Světlo nechť vychází z bodu A v vzdálenosti O A = a
od středu na stínítku kolmo na osu zrcadla postaveném.

Paprsek A B lomí se do B C, odráží se do D a v bodě D rozptyluje se
na př. též do směru D M. Do bodu M, který neleží v rovině nákresné, přijde však
též paprsek F M, jenž pravidelným lomem a odrazem prošel drahu D E F M,

ob. 167.



avšak do směru $D\mathfrak{C}$ přijde rozptylem z paprsku AD.

Tyto dva paprsky $ABCDM$ a $ADEFM$ jsou interferenca schopné.

Rozdíl dráhový se vypočítá následovně:

$$ABCDM = AB + n(BC + CD) - DM.$$

Část $BC + CD$ dráhy nutno přepočítati na vzduch tím, že se násobí exponentem lomu n.

$$AB = \sqrt{R^2 + a^2} \qquad DM = \sqrt{R^2 + r^2}$$

$$n(BC + CD) = 2n\frac{e}{\cos\beta} = 2n\frac{e}{\sqrt{1-\sin^2\beta}} = 2ne\left(1 - \frac{\sin^2\alpha}{n^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \doteq$$

$$\doteq 2ne\left(1 + \frac{\sin^2\alpha}{2n^2}\right) = 2ne\left(1 + \frac{a^2}{2n^2R^2}\right).$$

Jest tudíž: $$ABCDM = \sqrt{R^2+a^2} + \sqrt{R^2+a^2} + 2ne\left(1 + \frac{a^2}{2n^2R^2}\right),$$

analogicky pak:

$$ADEFM = \sqrt{R^2+r^2} + \sqrt{R^2+a^2} + 2ne\left(1 + \frac{r^2}{2n^2R^2}\right);$$

tudíž rozdíl dráhový δ jednoduše:

$$\delta = \frac{e}{n}\cdot\frac{r^2-a^2}{R^2}$$

Onu analogie obcházeti dráhu $ADEFM$ z dráhy $ABCDM$ – při čemž se jednoduše zamění poloha bodů A a M, t.j. veličiny a a r –, má základ proto, že dráha $ABCDM$ odpovídá úplně zpětné dráze $MFEDA$, jako onde $ABCD$ je část pravidelně lámaná a zdvojená, tak i zde část $MFED$; takéž směr DM odpovídá světlu difrakčnímu – jako také analogicky směr DA, když se vztahuje na směr $D\mathfrak{C}$; jakkoliv je sice $D\mathfrak{C}$ světlo difrakční – oproti AD dopadajícímu –, ale relativně, mathematicky, když se dráha pravidelná

$MFED$ líže se okrem, jest pak DA jakoby paprsek difrakční.

Z hořejšího výpočtu pro δ soudíme:

Je-li $\delta = k\cdot\frac{\lambda}{2}$, t.j. $\frac{e}{n}\cdot\frac{r^2-a^2}{R^2} = k\cdot\frac{\lambda}{2}$ čili $r^2 = a^2 + n\frac{R^2}{e}\cdot k\cdot\frac{\lambda}{2}$

vznikají kruhy jasné resp. tmavé dle toho, je-li k číslo sudé nebo liché. Jsou-li r' a r'' poloměry dvou po sobě následujících kruhů – buď jasných neb tmavých – jest patrně $r''^2 - r'^2 = n\frac{R^2}{e}\cdot\lambda$

tudíž také $$\pi(r''^2 - r'^2) = \pi R^2\frac{n\lambda}{e}.$$

Plocha mezikruží omezeného dvěma sousedními kruhy buď tmavými nebo světlými jest tedy konstantní.

Z toho následuje, že kruhy od středu vzdálenější jsou blíž a blíže u sebe, tak že v nevelké vzdálenosti jsou již tak úzký, že jich oko z těží rozeznává. Úkaz je tedy omezen obyčejně na malou plochu.

Je-li $a = r$, pak je retardace δ rovna nulle čili kruh, který prochází prostředním otvorem je bílý – na jednom konci jeho průměru je světlý otvor, na druhém jeho obraz. Tento kruh jest, užívá-li se světla bílého, obklopen barevnými kruhy s červeným okrajem vnějším a fialovým vnitřním.

Učiníme-li plochu zrcadla vnitřní drsnou tím, že zrcadlo pozvolna plavmí, kontinuje se úkaz popsaný náhlým ohybu světla. Kruhy popsané lze pozorovati objektivem prostým okem, postavíme-li do středu křivosti zrcadla dutého, (jehož plocha byla roztokem mléka potřena a usušena), plamen svíčky, dá-li mně, nahlížíme jej obklopený barevnými kruhy. *)

Ohyb. (Difrakce).

§210. Úvod.

Ukázali jsme v úvodu, kterak jevy optické mohou býti vykládány vlnivým pohybem, aetherem, a kterak tím vzniká analogie se jevy akustickými, jež rovněž vykládáme vlnivým pohybem z pravidla vzduchem. Zdá se však, že analogie tato nepadá,

když světlo a zvuk prochází nějakým otvorem. Slyšíme na př. okrem hlas mluvícího venku a nevidíme ho; světlo jíží se přímočaře, zvuk nikoliv.

Poznali jsme však, že přímočaré šíření se světla souvisí s velmi nepatrnými rozměry vlny světelné; předměty světelné vrhají stíny, poněvadž rozměr předmětů těch je obyčejně proti délce vlny světelné velmi veliký. Světlo jíží se otvorem přímočaře, dokud rozměry onoho otvoru jsou proti délce vlny veliky. Z toho následuje analogicky, že by se vlna zvuková šířila také přímočaře, kdyby proti její délce byl otvor, kterým má postupovati, dostatečně velikým. Před několika lety vyvrhla na jeze Mersey loď vezoucí náklad prachu. Stalo se to napotmě, a loď ve vysokém břehu veliký otvor tvoří. Tímto otvorem šířila se vlna zvuková dovnitř přímočaře, takže místa ležící mimo směr, jímž postupovala, nebyla vlnivým pohybem a jeho účinky stižena; obyvatelé tam vůbec neslyšeli výbuchu, který ve směru přímém na mnoho mil byl slyšán, způsobiv vedle toho svou prudkostí mnoho škod.

Často vzniká velmi učitý stín akustický horským hřbetem. Řeč-li na příklad údolím na jedné straně hřbetu horského bystřina, tu slyšíme její hukot tak dlouho, pokud ji vidíme; jakmile však postoupíme na druhé straně hřbetu horského jen tolik, že nám bystřina zmizí s očí — utichne i její hluk.

Všechny takové úkazy světelné, které nastanou, když světlo prochází úzkou štěrbinou nebo blízko hrany stínítka, a jež pocházejí od paprsků nehnutých se od přímé dráhy původní, nazývají se úkazy ohybovými.

První pokusy o difrakci světla provedl a popsal jesuita P. Francesco Maria Grimaldi (* 1618 v Bologni, † 1663) jako učitel mathematiky na jesuitské koleji v Bologni. Dílo jeho o tom, vyšlo dvě léta po jeho smrti pod titulem: „Physicomathesis de lumine coloribus et iride, aliisque annexis libri II," Bononiae 1665. Od něho pochází též název úkazu „difrakce" světla. Pokusy své prováděl v tom způsobu, že do zatemněné síně nechal malým otvorem kulatým vcházeti sluneční světlo, tak že na stěně objevilo se kruhové světlené místo.

Když do kužele světelného postavil malé těleso stínící, objevil se na stěně jeho stín, jenž byl však větší než geometrická projekce tělesa. Stín sám nebyl uvnitř ohraničen, kolem jeho hranic bylo viděti několik barevných proužků.

Také uvnitř stínu samého ukazovaly se jemné proužky.

Pokusy další konali Hooke, Newton, zejména pak Young, jenž první hledal úkazy ohybové vysvětliti na základě theorie undulační principem interference. Vnější proužky ohybové vykládal interferencí světla přímého a světla na hranách stínícího tělesa odraženého (reflektovaného). Vnitřní pak proužky podobně interferencí světla přímého a světla na hranách při dotykovém dopadu ohnutého (inflektovaného), při čemž však podstatu takovéto „inflexe" nemohl blíže označiti. Následky jeho přijal též Fresnel, a právě tím byl veden ke studiu vlivu, jakýž na ono odražení a ohýbání světla má úprava hran. Ukázalo se však, že vliv takového vybroušení; ostré hrany dávaly týž effekt jako tupé; břitva na straně broušené týž jako na straně tupé. Fresnel sestrojil pak štěrbinu ze dvou desek ocelových, které do polovice byly vybroušeny v ostrou hranu, v druhé pak polovici byla hrana zaoblena. Proužky difrakční objevily se jako nerozšířené pruhy. Fresnel vysvětlil pak úkaz ohybu vzájemnou interferencí sekundárních vln šířících se od míst, kde vlna primární na malé těleso neb úzkou štěrbinu naráží. Řešil tedy Fresnel problem difrakční spojením principu Huygensova s interferencí světla.

Při úkazech Fresnelových je dána sférická vlna světelná, jejíž střed je identický se zdrojem světelným (svítící bod resp. series bodů = štěrbina). Počítá se účinek jisté části této vlny (na př. té, která prochází kolem ostré hrany, kolem drátu, otvorem libovolné formy atd.) na bod ležící v blízkosti. O úkazech těchto projednáme v následujícím jen povšechně, do podrobností se nepouštějíce; neboť studium podrobné vyžaduje velmi velikých a obtížných počtů, jež lze provésti jen prostředky mathematiky vyšší (Integrály Fresnelovy). Za to obšírněji a podrobněji budeme jednati o jevech Fraunhoferových, zejména o spektrech mřížkových, k nimž jsou přípravou ohybové jevy, vznikající štěrbinou jednou neb dvěma štěrbinami v počtu větším danými. Rozdíl úkazů Fraunhoferových oproti Fresnelovým vyplývá z podmínek pozorování samého. Spočívá hlavně v tom, že u Fraunhoferových jednak zdroj světelný předpokládá se dále nekonečně, tak že vlna na překážky ohybové — štěrbiny, mřížky — dopadající je rovinnou, jednak že se počítá

účinek části této plochy na bod, který rovněž leží v dálce nekonečné. Obou podmínek dosáhne se jednoduše optickou kollimací (čočkou, dalekohledem).


Únik postačí, — zejména pro experimenty objektivní —, když tyto vzdálenosti jsou třebas ne nekonečné, ale aspoň relativně vzhledem k rozměrům štěrbin velmi značné.

Ohybové zjevy Fresnelovy.

[* § 211. Přímá hrana.

[* Světlo nechť jíží z bodu O divergentně tak, že částečně zachycuje se stínítkem AB, částečně pak může přímo dopadati na stínítko PQ; obě stínítka jsou kolmá k rovině nákresné. M je hranicí geometrického stínu. Pak touto hranicí (k bodu P) očekávali bychom, kdyby se světlo skutečně šířilo přísně přímočaře, stejnoměrné osvětlení, pod touto hranicí (k bodu Q) úplnou temnotu. Ve skutečnosti ukazuje se, že intensity osvětlení pod M ubývají spojitě, ale ovšem prudce k mulle, na kterou klesne již v malé vzdálenosti od M. Podobně nad bodem M není pole stejnoměrné, ale jsou to pásy s největším a nejmenším osvětlením, tak že na hranici M objeví se jasné a temné proužky jako obruba. V malé vzdálenosti od M k bodu P stejné nastává pole stejné intensity osvětlení.

obr. 168.



1.) Uvažujme nyní osvětlení v místě P, které je v osvětlené části stínítka (obr. 168). V úvodu sledali jsme, že osvětlení v P záleží hlavně na několika málo půlperiodových elementárních pásmech, rozložených kolem pólu R. Je-li tedy bod P od bodu M daleko a tudíž jeho pól R od stínítka AB tak vzdálen, že stínítko do žádného z oněch působivých elementů půlperiodových nezasahuje, pak je v P osvětlení stejnoměrné, nezmenšené nijak stínítkem AB. Pak-li zasahuje stínítko do působivých elementů, můžeme působení v P počítati ze dvou složek, z nichž jedna je dána působením vycházejícím z SR, druhá pak z RA.

Vzniká pak v P maximum neb minimum dle toho, je-li

$$AP - RP = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad \ldots \text{maxim. intensita}$$
$$AP - RP = 2k\frac{\lambda}{2} \quad \ldots \text{minim. intensity.}$$

Vzdálenost MP = x proužku difrakčního od hranice geometrického stínu lze počítati z odlehlostí OA = a, AM = b způsobem následujícím:

$$AP = \sqrt{b^2+x^2} = b + \frac{1}{2}\frac{x^2}{b}$$
$$RP = OP - a = \sqrt{(a+b)^2+x^2} - a = b + \frac{1}{2}\frac{x^2}{a+b},$$

tudíž:

$$AP - RP = \frac{1}{2}x^2\left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a+b}\right).$$

Dle toho, je-li tato difference dráhová $= (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ nebo $2k\cdot\frac{\lambda}{2}$, obdržíme proužek jasný nebo tmavý, tudíž:


$$x = \sqrt{\frac{(a+b)b}{a}(2k+1)\lambda} \quad \text{pro maximum,}$$

$$x = \sqrt{\frac{(a+b)b}{a}2k\cdot\lambda} \quad \text{pro minimum.}$$

Postavíme-li stínítko blíže nebo dále od stínítka AB nebo k němu, pak a zůstává constantou, b však se mění, x značí pak abscisy hyperboly, jejíž ohniska jsou R a A.

2.) Uvažujeme-li působení světelné vlny SR na bod P ležící uvnitř stínu geometrického (obr. 169), vidíme, že působení je tu omezeno pouze na polovici vlny SR.

obr. 169.



Bod R — pól — je nyní před stínítkem AB, tak že několik oněch působivých půlperiodových elementů je stínítkem AB eliminováno.

Výsledné osvětlení v P bude tedy podmíněno hlavně několika takovými elementy od A počínaje, jichž účinnost se udržuje hlavně na účinnost prvního z nich


jsou ostatní vzdálenější účinkují méně a téměř stejně jeden jako druhý, tak že se vzájemně ruší. Vedle toho klon přímky A B k jednotlivým elementům vlny bude větší a větší, vzdalujeme-li se od bodu M domnělého geometrického stínu, tak že účinky jednotlivých elementů musí rychle se zmenšovati. Výsledek toho je patrný. Od M a P bude intensity osvětlení spojitě, ale prudce ubývati.

Zjistiti podmínku celého úkazu jest, aby zdroj O byl nepatrných rozměrů; nebot jinak každým bodem toho zdroje vznikají proužky, které se kladou přes sebe tak, že oko pozoruje plochu stejnoměrně osvětlenou. *]

[* § 212. Úzký drát.

[* Velmi jednoduchý pokus obyčejný provedeme, postavíce tenký drát A B proti štěrbině O (obr. 170). Případ tento má něco společného s předešlým. Mimo geometrický stín M N vznikají dle předešlého patrně dva systémy difrakčních proužků. Když však průřez drátu bude nepatrný, pak vznikají ve stínu geometrickém také proužky interferenční, velmi jasné a všude stejně široké.

obr. 170.




V předešlém poznali jsme, že na úkaze ve stínu geometrickém síčastní se vlna A S a to tak, jakoby působila jen malá plošička u A. Podobně je tomu pro druhou hranu B, takže zde působení vlny B S lze nahraditi působením malé plošky při R. Tím však dostáváme dva počátky zdroje A B, velmi blízko u sebe, které jsou koherentní (vznikající ze společného bodu O) a tudíž schopny interference. Vnitřní proužky jasné vznikají při $AP - BP = 2k \cdot \frac{\lambda}{2}$,
„ „ tmavé „ „ $AP - BP = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$
zcela analogicky jako při pokusu Youngově.

Zacloníme-li paprsky z A neb B vycházející, zmizí proužky vnitřní na důkaz, že vypočtením interferencí „zdrojů" A a B je správně (Young). Je-li drát silnější, zmizí taktéž proužky vnitřní, a objeví se zpožděné, ale rychlé ubývání intensity dovnitř geometrického stínu. *]

[* § 213. Úzká štěrbina.

[* Případ k předešlému komplementární je obyčejná úzká pravoúhlá štěrbinou (obr. 171).

obr. 171.



Uvažujme především osvětlení v bodu P, který leží mimo geometrický obraz M N štěrbiny A B.

Rozdělíme A B od A počínajíce v elementární části, původcích jich na bod P zaležé patrně na differenci B P – A P, rovná-li se totiž tato difference sudému neb lichému počtu $\frac{\lambda}{2}$.

Vznikají tedy v geometrickém stínu stínítka dva systémy proužků.

Proužky tyto jsou:
jasné, při $BP - AP = 2k \cdot \frac{\lambda}{2}$,
tmavé „ $BP - AP = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$.

Jich odlehlost x od roviny symmetrie stanoví výraz
pro proužky jasné $x = \frac{b}{c} \cdot 2k \cdot \frac{\lambda}{2}$,
„ „ tmavé $x = \frac{b}{c} \cdot (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{2}$,

kdež c je šířka štěrbiny.


Je-li stínítko tak vzdáleno od štěrbiny A B, že A M – B M je menší než $\frac{\lambda}{2}$, pak proužek leží mimo jasnou plochu M N, je-li však stínítko tak blízko, že A B – B M rovná se několika $\frac{\lambda}{2}$, pak se objeví proužky difrakční také mezi M N. Osvětlení bodu Q záleží pak na tom, na jaké díly rozdělíme O Q vlnu A B. Všeobecně jsou tyto díly nestejně veliky a nestejně skloněny ke směrům míjecím k Q. Případ tento vyžaduje složitějšího výpočtu. *]

[* § 214. Otvor kruhový.

[* Velmi krásný jev obyčejný poskytuje malý otvor kruhový, jejž obdržíme na př. propíchnutím stanicí jehlou. Dopadají-li na tento otvor z malé kruhové

šterbiny papírský bílého světla a díváme-li na stroj z druhé strany čočkou, vzniká bílý střed obklíčený řadou barevných kruhů, které se mění se vzdálenostmi oka od stroje. Centrální část při tom stahuje se, mění se až na bod, jenž zmizí, když se oko dostatečně k otvoru přiblíží, část excentrální pak jeví krásné barvy, podobné barvám při tenkých vrstvách.

Body maximální a minimální intensity na přímce centrální lze snadno stanoviti. O budiž světlý bod (obr. 172), AB průřez stínítka s kruhovým otvorem. Přímka OP nechť prochází středem tohoto otvoru M.



Rozdělme vlnu od AB se šířící v půlperiodové zony, z nichž, jak v úvodu bylo odvozeno, dvě sousední se ve svém účinku téměř ruší. Když tedy propouští otvor AB takových zon sudý počet, pak bude osvětlení v P velmi nepatrné; když však propouští otvor AB lichý počet takových zon, pak bude v bodu P intensivní osvětlení. Pohybuje-li se bod P podél osy OM, pak je patrno, že postupně přechází místy maximální a minimální intensity osvětlení. Označme $OM = a$, $MP = b$, pak plocha půlperiodové zony jest, jak na jiném místě odvozeno,

$$\frac{\pi a b \lambda}{a+b}.$$

Plocha otvoru, je-li poloměr r, bude: πr^2.

Je-li tedy $\pi r^2 = 2k \cdot \frac{\pi a b \lambda}{a+b}$, bude intensita v P minimum

" $\pi r^2 = (2k+1) \cdot \frac{\pi a b \lambda}{a+b}$, " " v P maximum.

Z toho lze b počítati: Jest pak přehledno:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 2k \frac{\lambda}{r^2} \quad \text{pro maximum,}$$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = (2k+1) \frac{\lambda}{r^2} \quad \text{" minimum,}$$

Záleží tedy vzdálenost kteréhokoliv jasného bodu na ose OM od bodu M na délce plný světelné; užívá-li se světla bílého, pak patrné maxima různých barev budou v různých od M vzdálenostech pro světlo červené blíže, pro fialové dále, nenalezneme

tudíž nikde úplné tmy, ale střídání bude jeviti vždy živé zabarvení duhové. *]


[* §215. Destičky s poloperiodovými pásmy.

[* Sousední pásma poloperiodová ruší se téměř vzájemně ve svém účinku. Kdybychom tedy střídavě vždy jedno pásmo nechali působiti, druhé však od působení vyloučili zakrývajíce je stínítkem, musila by se všechna na př. lichá pásma působící v bodě P spojiti v jeden mohutný účinek. Takovou destičku s pásmy poloperiodovými lze si zjednati fotograficky. Nakreslíme na papír kartonový kruhy soustředné o poloměrech $\sqrt{1}$, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{4}$, $\sqrt{5}$, ... a vyplníme všechna sudá pásma černě tak, jak to naznačeno v obr. 173.

1 1,414 1,732 2,000 2,236

Výkres takový pak fotografujeme na zmenšenou destičku, udělíme mu patřičné zmenšení.

ob. 173.



Destička tato účinkuje pak podobně jako čočka, sbírá také světlo do určitého bodu P na ose se nalézajícího, avšak s tím rozdílem, že paprsky zde koncentrované nepřicházejí současně jako u čočky spojné, ale od jednotlivých zon vždy o celou periodu opožděné. Vedle toho jest „ohnisko" destičky této pro paprsky červené blíže, pro fialové dále od destičky opačně než je tomu u čočky spojné. *]

[* §216. Kruhové stínítko.

[* Difrakci kruhovým otvorem jest analogický zjev okolo kol kruhového stínítka, ač pokus tento nelze tak snadno provésti. Dle Powella odporučuje se nejlépe kápnouti malou kapičku hnědého inkoustu na tenkou, vyčištěnou a suchou destičku skleněnou. Stíní osy ukazuje se – pokud se nepřibližuje příliš k stínící destičce – všude stejnoměrné osvětlení; neboť paprsky kolem okrajů kruhového stínítka se ohýbající ke kterémukoliv bodu na ose se stejnou fází dohážejí. Úkazy

ve světle isochromatickém záleží v temných a jasných kruzích interferenčních, obklopujících koncentricky osu, ve světle bílém jsou kruhy duhově zabarveny. Na ose je tedy stejnoměrné osvětlení právě tak, jakoby destička se stínící plíškou tam nebyla. Atago to pokusem dokázal. *)

(*§217. Korony.

(*Za velkého počasí, kdy obloha je zastřena mlhou, pozorujeme někdy kolem slunce nebo měsíce barevné kruhy, které dotýkají se desky slunečního neb měsíčního, nesmějí tedy býti zaměňovány s halo (halo) popsanými již dříve (viz optika geom. §123) a vznikajícími mnohem dále, tak že poloměr jich obnáší 22°-23°.

Faraday ukázal pokusem podobné zjevy. Děláme-li se na planeu skleněnou, kterouž pokryton malými kuličkami pražené vrchní plochy nebo popráškem plavuní, vidíme barevné kruhy podobné měsíčním korunám. Nutná podmínka tohoto zjevu spočívá v tom, aby tělíska kulatá byla co možná stejné velikosti. Fraunhofer dokázal to umístěním malých kruhových destiček kovových mezi dvě desky skleněné, kruhy difrakční jevily tyto vlastnosti. Průměry jich byly přímo úměrny délce vlny a nepřímo průměru malých destiček.

Verdet pokryl objektiv dalekohledu deskou měděnou, provrtanou četnými otvory téže velikosti pravidelnými po desce zcela nepravidelně. Díval se pak na vzdálené světlo, viděl v ohnisku dalekohledu systém kruhů podobných koruně. *)

Ohybové úkazy Fraunhoferovy.

§218. Přehled úkazů.

Zvláštností charakteristickou ohybových zjevů, kteréž zovemo Fraunhoferovými, jest rovnoběžnost jednak paprsků světelných na ohybové předměty dopadajících, jednak paprsků světelných ohybem odchýlených. Světelná vlna jest zde tedy rovinou, čím jest theoreticky věc velice zjednodušena.

Při pozorování subjektivním docílí se této rovnoběžnosti nejlépe optickými prostředky, totiž kollimujícími čočkami.

Světelným zdrojem je zde na př. štěrbina (lineární), také otvor kruhový a pod., jenž jest v ohniskové rovině kollimující spojné čočky, tuáž opticky jako by v dálce nekonečné. Předměty ohyb způsobující jako štěrbina lineární, nebo otvor kruhový nebo soustava štěrbin a pod. kladou se před objektiv dalekohledu astronomického, zaměřeného na dálku nekonečnou. Poněvadž kollimátor se štěrbinou a pozorovací dalekohled astronomický tvoří hlavní části spektrálního apparátu neb spektroskopu, hodí se oba tyto stroje velmi dobře k pozorování subjektivnímu ohybových zjevů Fraunhoferových.

Při demonstrování objektivním užívá se paprsků světelných, štěrbinou v hlavotatu do síně optické vstupujících, které jsou již samy sebou dostatečně rovnoběžné. Na to se čočkou spojnou (slabou) štěrbina promítne do dálky na bílou stěnu, a předměty ohyb způsobující kladou se buď přímo před tuto čočku nebo též za ni, na př. tam, kde paprsky světelné jsou lomem nejvíce zúženy, činěc se něco získá na intensitě světelné celého zjevu.


Co jednodušším z předmětů ohyb způsobujících jest zde opět úzká štěrbina podobná té, kterou světlo dopadá.

Průběh úkazu při světle homogenním je velice přehledný, dá se velmi pravidelně znázorniti graficky a dá se též quantitativně vystihnouti výrazem velice jednoduchým. Z příkladu toho lze pak zcela dobře se orientovati o povaze ohybového zjevu při světle bílém, a lze spektrálním rozborem porozumění velmi usnadniti.

Je-li štěrbin několik na př. dvě, tři atd. začíná se zjev pouhou komplikovati se vzrůstajícím počtem vždy víc a více; — jest však překvapující, že když počet štěrbin se stává velmi velikým, úkaz se opět zjednoduší a stává se zcela jednoduchým — a ve svých aplikacích velmi důležitým — když je počet těchto štěrbin (přibližně) nekonečně velikým. Soustava štěrbin v takovém velikém počtu stává optickou mřížkou a touto vznikají při světle bílém spektra docela podobné jako hranolem — ale na základě podstatně jiném. Objev těchto spekter je nejkrásnějším objevem optiky theoretické. Užívání pak dokonalých optických mřížek ke účelu analyse světla vedlo k nejdokonalejším výsledkům optického měření délky vlny světelné.

(* Způsob výkladu ohybových zjevů zakládá se na jisté základní myšlence, která se pak stále opakuje.

Nejmenší soustava rákozích štěrbin, na př. štěrbiny tři (obr. 174.)



Šířka štěrbin budiž stejná = a, šířka mezer mezi stejná budiž = b (V obr. 174. zvětšeně, na př. $a = 1$ cm, $b = 1\frac{1}{2}$ cm). — Rozdělme si každou štěrbinu v myšlenkách na samé elementární štěrbinky, nekonečně mnohé. Každá z těchto je jakoby zdrojem světelným. Jsou všechny — při kolmém dopadu světla na štěrbiny — současně opticky vzrušeny a od nich vyjdou tedy vlny světelné současně. Svatupují-li opět směrem kolmým, dojdou současně na určité místo, kdež je čočkou soustředěno, na př. na stínítko projekční, a sečtou se. Zde vznikne maximum světelné intensity.

Avšak při postupu šikmém vznikají rozdíly dráhové, které pak způsobují rozdíly fásové, a tím interferenci.

Tyto rozdíly dráhové počítáme podle paprsků nulloveným (na kraje první štěrbiny. Rozdíl úměrně s odlehlostí x a jsou pro každou elementární štěrbinu šířky dx dány výrazem

$$\delta = x \sin\alpha,$$

kdež jest α úhel ohybový určující direkci paprsků ohybových, kterouž se na stínítku projekčním stanoví zcela určité místo.

Z rozdílu dráhového počítáme pak fásový ε koefficientem $\frac{2\pi}{\lambda}$.


Jest tedy

$$\varepsilon = \frac{2\pi}{\lambda} x \sin\alpha.$$

Mimo toho píšeme krátce: $\varepsilon = \varrho x$,

abychom onu proporcionalitu s odlehlostí x zřetelně naznačili; neboť tato proporcionalita je pro celý výklad věcí podstatnou. Konstanta ϱ je konstantou vzhledem k rozmanitým odlehlostem x, ale jinak jest podmíněna úhlem ohybovým α, kterým se mění.

Zavedouce tuto konstantu ϱ dosáhneme velmi vhodného zjednodušení formálního. Toto zjednodušení vyniká tím více, uvažujeme-li také ten případ, kdy paprsky světelné dopadají na štěrbiny šikmo, nahýbajíce se od kolmé incidence o úhel incidenční = i (obr. 175).



Pak je patrno, že retardace dráhová proti nulloveným paprskem se tímto úhlem incidence zvýšuje o $x \sin i$, tak že jest celkem

$$\delta = x \sin i + x \sin\alpha,$$


tudíž $\varepsilon = \frac{2\pi}{\lambda}(\sin i + \sin\alpha) \cdot x.$

Avšak i zde je patrná úměrnost fásové differences ε s odlehlostí x, tak že i zde můžeme psáti $\varepsilon = \varrho x$,

čímž formálně tento případ se nijak nejeví komplikovanější než předcházející. Výraz pro konstantu úměrnosti ϱ je pak všeobecně

$$\varrho = \frac{2\pi}{\lambda}(\sin i + \sin\alpha).$$

Konstanta úměrnosti ϱ stává se $= 0$, když je $\alpha = -i$, t. j. při přímém postupu paprsků rovnoběžných štěrbinou jakkoliv šikmě protaženou. Je-li speciálně $i = 0$, t. j. dopad kolmý, jest $\varrho = 0$ také pro $\alpha = 0$, t. j. opět při postupu přímém (obr. 176).



Úloha stanoviti intensitu světla, jaká se jeví na místě stínítka, odpovídající direkci α při dopadu i jest patrně úlohou skládání vibrací stejnoběžných téže amplitudy ale s differencemi fásovými spojitě postupnými, a sice úměrně s odlehlostí x.

Úkol lze řešiti buď geometricky neb analyticky, anebo smíšeně použitím jak konstrukce tak počtu. *)


§ 219. Ohyb jedinou štěrbinou

(* Řešení geometrické.


(* Při daném dopadu i (obr. 177) (speciálně $= 0$, obr. 178) a při direkci libovolné α

obdržíme <u>amplitudu</u> resultující vibrace, <u>sčítajíce geometricky</u> amplitudy vibrací od jednotlivých elementárních štěrbinek šířky dx procházející.

Obr. 177.



Obr. 178.



Tyto amplitudy budou patrně úměrny této šířce dx.


Poněvadž se v úvahách těchto jedná jen o <u>relativní</u> vztahy (amplitud, intensit světelných), můžeme konstantu tělo úměrnosti položiti = 1, t. j. říci, že amplituda je <u>dána přímo</u> šířkou dx. Také ve všech následujících výrazích budeme, místo abychom poukazovali na proporcionalitu, říkati, že jest amplituda <u>dána</u> jistou délkou, jistým výrazem, a podobně že jest intensita J dána <u>čtvercem amplitudy</u>, čímž jen k vůli zkrácení mínime úměrnost.

Fázový rozdíl je všeobecně $= \varphi x$. Roste od 0 do φa rovnoměrně (aequicrescentně), poněvadž dx je konstantní. Střední hodnota fázového rozdílu je $\frac{0+\varphi a}{2} = \frac{1}{2}\varphi a$; pro tuto zavedeme označení φ. Odpovídá patrně <u>střednímu</u> paprsku štěrbiny a je zároveň fázový rozdíl <u>vibrace výsledné</u>.

Pro $\varphi = 0$ (čili $\alpha = -i$, eventuelně $i = 0$, $\alpha = 0$) bude výsledná amplituda <u>arithmetickým součtem</u> $\int_0^a dx = a$ elementárních amplitud dx, t. j. bude dána šířkou a štěrbiny (obr. 179).

V náčrtu příkladě bylo voleno $a = 1$ cm. Obrazec 179. vypadne dle toho malým. Proto je vedle toho kreslen obr. 180, který je 5krát zvětšený.

Obr. 179.



$\frac{\varphi a}{a}$

Poněvadž oblouk a odpovídá středovému úhlu φa, značí patrně φ <u>zakřivení</u> tohoto oblouku. Je-li tedy R poloměr oblouku, máme

$$R \cdot \varphi a = a, \quad \text{t. j.} \quad \varphi = \frac{1}{R}.$$

Tím nabývá φ významu velmi jednoduchého.

Pro tětivu r pomocí obdržíme patrně výraz $2R\sin\varphi$.

Poněvadž pak je $R \cdot 2\varphi = a$, vyjde pro tětivu r jakožto <u>resultující amplitudu</u> výraz

$$r = a\,\frac{\sin\varphi}{\varphi},$$

tudíž pro intensitu světla $J = a^2\left(\frac{\sin\varphi}{\varphi}\right)^2$,


kdež příčinu srovnost na místo úměrnosti ve smyslu poznámky dříve již učiněné.

Změny intensity J odpovídající změnám r délky tětivy. Jaké tyto změny jsou, lze na geometrickém základě z obr. 180 znázorněném snadno přehlédnouti.

Při stoupajícím φ stoupá zakřivení oblouku, jehož délka je stále $= a$. Tím více se tedy paprsky ohybové od přímého směru uchylují, tím více <u>ztáčí se</u> oblouk a délky konstantní, tím kratší vypadne tětiva r oblouk ten napínající. Stočí-li se v plný kruh (obr. 181) (při $\varphi a = 2\pi$), stane se tětiva $= 0$. Stoupá-li dále φ, stočí se délka a do plného kruhu a ještě do oblouku přes něj, tětiva opět stoupá až k jistému maximu a klesne pro druhé na nulu, když se oblouk a stočí <u>dvakrát</u> na kruh (při $\varphi a = 2 \cdot 2\pi$). Zřejmě, že intensita J je všeobecně $= 0$, když je $\varphi a = k \cdot 2\pi$ čili $\frac{2\pi}{\lambda}(\sin i + \sin\alpha)a = k \cdot 2\pi$, aneb když je

$$a(\sin i + \sin\alpha) = k \cdot \lambda.$$

Obr. 181.



Výraz na levo značí <u>dráhovou</u> differenci <u>krajních paprsků štěrbiny</u> při libovolném dopadu $= i$. Speciálně při $i = 0$ máme

$$a \sin\alpha = k\lambda$$

kdež je k číslo řadové 1, 2, 3, 4 . atd. *)

(* §220. Řešení analytické.

(* Projekce kruhového oblouku amplitud dx na směr amplitudy paprsku nulového a na směr k němu kolmý dává výrazy

$$\int_0^a dx\cos\varphi x \quad \text{a} \quad \int_0^a dx\sin\varphi x,$$

což dává výsledek $\frac{1}{\varphi}\sin\varphi a$ a $\frac{1}{\varphi}(1-\cos\varphi a)$.

Když províjíme tyto projekce na čtverec a sečteme, obdržíme čtverec r^2 amplitudy výsledné:

$$r^2 = \frac{1}{\varphi^2}\sin^2\varphi a + \frac{1}{\varphi^2}(1 - 2\cos\varphi a + \cos^2\varphi a)$$

$$= \frac{2}{\varphi^2}(1 - \cos\varphi a) = \frac{4}{\varphi^2}\sin^2\frac{1}{2}\varphi a = a^2\frac{\sin^2\frac{1}{2}\varphi a}{(\frac{1}{2}\varphi a)^2}.$$

Píšeme-li opět zkratku $\frac{1}{2}\varphi a = \varphi$, vyjde jako dříve

$$y = a^2\left(\frac{\sin\varphi}{\varphi}\right)^2.$$

[* § 221. Rozbor výrazu pro intensitu y.

[* Rozbor tento s nejvýhledněji provede graficky (obr. 182.)
Úhel φ naneseme jako úsečku a k ní za pořadnici jednak $\sin\varphi$, jednak též φ. První čára je sinusoida, druhá přímka pod úhlem 45°.

Na to provedeme dělení $\frac{\sin\varphi}{\varphi}$ a konečně čtverce; tím hodnoty negativní přejdou vesměs v pozitivní, a ordinaty — jsouce menšími než 1 — se zmenší, velmi značně. Obr. 182. je proveden <u>přesně</u> pro jednotku = 1 cm, při čemž je též $a = 1$, jak již dříve bylo přijato.

Důležito je zkoumati, jak jsou rozděleny <u>maxima</u> a <u>minima</u> intensity y. Pro tyto máme $\left(\frac{dy}{d\varphi} = 0\right)$:

$$y = a^2\left(\frac{\sin\varphi}{\varphi}\right)^2.$$

$$\frac{dy}{d\varphi} = 2a^2\frac{\sin\varphi}{\varphi}\cdot\frac{\varphi\cos\varphi - \sin\varphi}{\varphi^2} = 0.$$


Případ $\varphi = 0$ dává <u>hlavní maximum</u> $= a^2$, což lze zjistiti úvahou zvláštní. Vyloučme tento případ, tak máme: $\sin\varphi(\varphi\cos\varphi - \sin\varphi) = 0$.

Rovnici této se vyhoví při $\varphi = k\pi$;
tím jsou dána <u>minima</u> $y = 0$.
Sečteme-li $\sin\varphi = 0$, pak bez jiného dělíti a obdržíme podmínku

$$\operatorname{tg}\varphi = \varphi,$$

kterouto podmínkou jsou stanovena maxima. Pro maximální hodnoty intensity pak vychází pak: $\cot\varphi = \frac{1}{\varphi}$ / $\operatorname{cosec}^2\varphi = \frac{1+\varphi^2}{\varphi^2} = \frac{1}{\sin^2\varphi}$, tudíž: $\frac{\sin^2\varphi}{\varphi^2} = \frac{1}{1+\varphi^2}$,

obr. 182.



tudíž všeobecně $J_{max} = \frac{a^2}{1+\varphi^2}$,

kdež jest místo φ položiti $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \ldots$, jak vyjdou z rovnice podmiňující

$$\operatorname{tg}\varphi = \varphi.$$

Jak lze poslední rovnici řešiti <u>graficky</u>, znázorňuje obr. 182.
Řešení <u>numerické</u> podává následující tabulka. Vypočteti úhly $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2 \ldots$ z rovnice $\operatorname{tg}\varphi = \varphi$ vyjmat z čísel, jež vydal <u>Jahnke</u>.
Vypočet intensit příslušných $y_0, y_1, y_2, \ldots$ provedl zpracovatel.

$\varphi_0 = 0$	$J_0 = 1$	Tabulka ukazuje pěkně, jak
$\varphi_1 = 1{,}4303\ \pi$	$J_1 = 0{,}05869$	rychle klesají maxima.
$\varphi_2 = 2{,}4590\ \pi$	$J_2 = 0{,}01648$	Již druhé maximum má
$\varphi_3 = 3{,}4709\ \pi$	$J_3 = 0{,}00834$	potud 6% intensity prvého maxi-
$\varphi_4 = 4{,}4774\ \pi$	$J_4 = 0{,}00503$	ma hlavního, třetí maximum
$\varphi_5 = 5{,}4818\ \pi$	$J_5 = 0{,}00336$	asi jen půldruhého procenta
$\varphi_6 = 6{,}4844\ \pi$	$J_6 = 0{,}00240$	atd
$\varphi_7 = 7{,}4865\ \pi$	$J_7 = 0{,}00180$	

Úhly $\varphi_1, \varphi_2 \ldots$ jsou velmi blízkými hodnotám

$\frac{3}{2}\pi,\ \frac{5}{2}\pi,\ \frac{7}{2}\pi,\ \frac{9}{2}\pi \ldots$ atd.

jak také z grafického znázornění vychází.

Rozestavení maximálních i minimálních hodnot J je podmíněno délkou vlny světelné, — poněvadž úhel φ jest jí podmíněn. Neboť máme

$$\varphi = \tfrac{1}{2}\varrho a = \frac{\pi}{\lambda}(\sin i + \sin\alpha).a.$$

Poněvadž φ nastane tedy na př. pro papršky fialové — kde λ je menší — již při menším úhlu α, t.j. blíže centrálnímu maximu. Proto jsou proužky jasné i tmavé tím sražené, čím blíže jsme ve spektrálních barvách od konce červeného k fialovému.

Velmi pěkně lze spektrálním rozložením úkazu ohybového při světle bílém vliv délky vlny světelné přehlédnouti — podobně jako bylo při interferenčním pokusu Fresnelově popsáno. *)

{* §222. Dvě štěrbiny.

{* Jsou-li dány dvě úzké štěrbiny téže šířky a, mezi nimiž je neprůhledná mezera šířky b, rozte všeobecně fázový rozdíl

od 0 do ϱa a pak zase od $\varrho(a+b)$ do $\varrho(2a+b)$.

Jest tedy přibývání kontinuity od ϱa do $\varrho(a+b)$.

Pro $\varrho = 0$ naráčíme v jisté délce a, pak b a opět a. Amplituda výsledná je dána součtem $2a$. Pro libovolné ϱ dáčíme touto celou délku $a+b+a$ do oblouku kruhového, jehož zakřivení je opět ϱ. Úhel středový k němu patřící je $\varrho(a+b+a)$.


Poněvadž však amplitudy, odpovídající délce oblouku k jsou neúčinný, dlužno vzíti tětivu, — kterouž opětně r znamenáme — k oblouku a a poněvadž tětivu r k oblouku druhému a; geometrickým sečtením obou těchto tětiv r obdrží se pak amplituda výsledná.

V obrazci 183 je opětně — jako dříve již — zvětšeně voleno

$a = 1$ cm,

$b = \frac{3}{2}$ cm.

Obr. 183.



Při geometrickém sčítání tětiv přijde k platnosti úhel, který každá z nich svírá s osou OX.

Zavedeme analogicky jako dříve

$\frac{1}{2}\varrho a = \varphi$,

podobně $\frac{1}{2}\varrho b = \psi$,

a pro součet obou

$\frac{1}{2}\varrho(a+b) = \varphi + \psi = \omega$.

Pak je patrno:

$XOA = \varphi$,

úhel $(OA, AB) = \varphi + \psi$,

úhel $(AB, BC) = \psi + \varphi$,

tudíž

$$XBC = \varphi + (\varphi+\psi) + (\psi+\varphi) = \varphi + 2\omega.$$

Jsou tedy průměty tětiv r jedné i druhé na osu OX a druhou osu k ní kolmou sumovány

$$r\cos\varphi + r\cos(\varphi+2\omega)$$
$$r\sin\varphi + r\sin(\varphi+2\omega).$$

Když sečteme a sečteme, obdržíme čtverce amplitudy výsledné a tudíž intensitu J. Vzhledem k tomu, že se výsledkem zdržovati, přejdeme raději hned k případu zcela obecnému. *}

{* §223 Libovolný počet štěrbin téže šířky.

Že patrno, že rozbor výkladu zůstává týž pro libovolný počet štěrbin téže šířky a při neprůhledných mezerách poměrů téže šířky b.


Pro $\varrho = 0$ naráčíme všechny a a všechny b do téže přímky. Při postupném ϱ stáčíme tuto přímku do oblouku kruhového, jehož zakřivení je právě ϱ. Pak vedeme tětivy r

odpovídající obloučkům a a tyto pak všechny sečtáme geometricky.

V obrazci 184. je věc provedena pro čtyři štěrbiny. Při tom je opět zvětšeně voleno

$$a = 1\,\text{cm},\quad b = \tfrac{3}{2}\,\text{cm}.$$

Obr. 184.



Chtějíce pak odvoditi výraz pro resultující amplitudu r^*, sečteme projekce všech jednotlivých amplitud r na osu OX a rovněž na osu OY, a součty pak počtverčíme a sečteme, což dává čtverec amplitudy čili úměrné intensitu J.

Fázový rozdíl prvé amplitudy r je φ.

Fázový rozdíl každé následující amplitudy r roste o $2(\varphi+\psi)$ čili o 2ω, jest tedy:

$$\varphi+2\omega,\ \varphi+2.2\omega,\ \varphi+3.2\omega,\ \ldots\ \varphi+\overline{m-1}.2\omega,$$

je-li m počet štěrbin.

Fázový rozdíl ε *výsledné amplitudy r^* při uvažování aequicrescentním — je patrně střední hodnotou, t.j.

$$\varepsilon^* = \frac{\varphi+[\varphi+(m-1)2\omega]}{2},$$

což dává

$$\varepsilon^* = \varphi+(m-1)\omega.$$

Průměty výsledné amplitudy r^* jsou:

$$r^*\cos\varepsilon^* = r\cos\varphi + r\cos(\varphi+2\omega)+r\cos(\varphi+2.2\omega)+\ldots+r\cos(\varphi+\overline{m-1}.2\omega)$$
$$r^*\sin\varepsilon^* = r\sin\varphi + r\sin(\varphi+2\omega)+r\sin(\varphi+2.2\omega)+\ldots+r\sin(\varphi+\overline{m-1}.2\omega).$$

Že však:

$$\sum \cos(\varphi+\overline{m-1}.2\omega) = \cos(\varphi+\overline{m-1}.\omega).\frac{\sin m\omega}{\sin\omega},$$
$$\sum \sin(\varphi+\overline{m-1}.2\omega) = \sin(\varphi+\overline{m-1}.\omega).\frac{\sin m\omega}{\sin\omega},$$

tudíž součet čtverců $= r^2\frac{\sin^2 m\omega}{\sin^2\omega} = m^2r^2\frac{\sin^2\omega\, m}{m^2\sin^2\omega}$;

čili $$J = m^2a^2\left(\frac{\sin\varphi}{\varphi}\right)^2\left(\frac{\sin m\omega}{m\sin\omega}\right)^2.$$

Resultující úhel fázový počítáme — ke kontrole — dělením obou hořejších rovnic:

$$\operatorname{tg}\varepsilon^* = \operatorname{tg}(\varphi+\overline{m-1}\,\omega),$$

t.j. $$\varepsilon^* = \varphi+\overline{m-1}\,\omega,$$ jako dříve *)

*) § 294. Rozbor rovnice pro intensitu J.

*) Počítejme především, kdy je J maximum a kdy minimum:

$$J = m^2r^2\left(\frac{\sin m\omega}{m\sin\omega}\right)^2.$$

Poněvadž průběh veličiny r s úhlem φ již známe, počítejme, kdy funkce

$$y = \left(\frac{\sin m\omega}{m\sin\omega}\right)^2$$

má své maximum a minimum.

$$\frac{dy}{d\omega} = 2\frac{\sin m\omega}{m\sin\omega}\cdot\frac{m^2\sin\omega\cos m\omega - m\cos\omega\sin m\omega}{m^2\sin^2\omega}$$

Rovnici se vyhoví především pro

$$\sin m\omega = 0 \quad\text{t.j.}\quad m\omega = k\pi.$$

Pro tyto hodnoty úhlu ω je patrně $J=0$, t.j. minimum.

Je-li m velmi velikým číslem, vyhoví se této podmínce již při velmi malinkém úhlu ω.

Uvažme dále: Je-li $\omega=0$, je též $\varphi=0$ (poloměr je $\varphi=0$); zde obdržíme hlavní maximum intensity J, totiž

$$J_0 = m^2a^2,$$

neboť jest $\lim_{\varphi\to 0}\frac{\sin\varphi}{\varphi}=1$ jakož i $\lim_{\omega\to 0}\frac{\sin m\omega}{m\sin\omega}=1$.

Zvolíme-li φ od milly jen poměrně málo vzrostlé a tudíž poměrně také úhel ω, vzroste velmi krapně úhel $m\omega$, tak že velmi záhy vyplní se podmínka

$$m\omega = \pi \quad\text{a tudíž}\quad J=0.$$

To znamená: intensita maximální J_0 velmi náhle klesne na nulovou — čili jinými slovy: jasný proužek prostřední jest ostře ohraničen.

V geometrickém znázornění obr. 184 jeví se věc tím, že tětivy r velmi záhy vyplní celý kruh i při malém jeho zakřivení, poněvadž jich počet jest velmi veliký.

Podobně dále při $m\omega = 2\pi,\ 3\pi,\ \ldots\ k\pi$, kde vyplní onen kruh několikrát.

Pokračujme po této poznámce v diskusi výrazu $\frac{dy}{d\omega}=0$. Podmínce se dále vyhoví (při $\sin m\omega \geq 0$), když jest

$$m^2\sin\omega\cos m\omega = m\cos\omega\sin m\omega,$$

t.j. když

$$m\operatorname{tg}\omega = \operatorname{tg} m\omega.$$

Tato rovnice dává maxima intensity J. Maximální intensita J_m sama vypočítá se z této podmínky snadno. Je totiž:

$$\frac{1}{m}\cot\omega = \cot m\omega$$

$$1+\frac{1}{m^2}\cot^2\omega = 1+\cot^2 m\omega = \frac{1}{\sin^2 m\omega},$$

tudíž

$$\sin^2 m\omega = \frac{\sin^2\omega}{\sin^2\omega + \frac{1}{m^2}\cos^2\omega};$$

z čehož

$$\frac{\sin^2 m\omega}{m^2\sin^2\omega} = \frac{1}{1+(m^2-1)\sin^2\omega}.$$

Tudíž maximální intensita

$$J_m = m^2 r^2 \frac{1}{1+(m^2-1)\sin^2\omega}.$$

Je-li m číslo velmi veliké (na př. $m = 100$ neb 1000 a pod.), je m^2 číslo daleko větší — druhého řádu — a následkem toho zlomek

$$\frac{1}{1+(m^2-1)\sin^2\omega}$$

velmi malý — t. j. J_m z pravidla je velice nepatrné. Maxima této povahy zovem vedlejší (sekundární). Výjimkou může však hořejší zlomek býti značný, t. j. $=1$, když totiž jest

$$\sin\omega = 0, \text{ tudíž } \omega = k\pi.$$

Maxima této podmínce vyhovující zovem hlavními.

Jich intensita jest $= m^2 r^2$.

Čím větší jest m, tím více — a konečně prakticky úplně — mizí maxima vedlejší a zůstávají v intensitě velmi značné maxima hlavní. Podmínkou jich jest

$$\omega = \varphi + \psi = k\pi \quad \text{čili} \quad \frac{\pi}{\lambda}(\sin i + \sin\alpha)(a+b) = k\pi,$$

aneb — když vezmeme retardace drahové,

$$(a+b)(\sin i + \sin\alpha) = k.\lambda.$$

Změna pak v intensitě těchto maxim hlavních je dána změnou amplitudy T (resp. jejího čtverce), t. j. změnou výrazu $\left(\frac{\sin\varphi}{\varphi}\right)^2$, tedy téhož výrazu, kterým byl vyjádřen vliv jediné štěrbiny.

A tak vidíme, že při velmi velikém počtu ohybových štěrbin, t. j. při optické mřížce jsme vedeni opět tam, kde jsme začali, t. j. k ohybu jediné štěrbinou. Tam jsme vyjádřili změnu intensity J zvláštní křivkou. Z této křivky zůstávají při

mřížce jsou některé ordinaty — rozjpojitě rozestavené, — ostatní se interferencí jednotlivých vzdálených štěrbin ruší; avšak vlivem mnoho velikého počtu štěrbin jeví se v tom, že ony jednotlivé ordinaty jsou m^2-krát zvětšeny. Jde zde tedy o obrazy ohybové, ostře oddělené, značné intensity. Kde ovšem křivka původní pro jedinou štěrbinu by sama byla $=0$, tam také ta hlavní maxima — když by náhodou na to místo padla — stávají se $= 0$. *)

[* § 225. Řešení rovnice $m\,\mathrm{tg}\,\omega = \mathrm{tg}\,m\omega$ a výpočet intensity

$$J = m^2 a^2 \left(\frac{\sin\varphi}{\varphi}\right)^2 \left(\frac{\sin m\omega}{m\sin\omega}\right)^2.$$

[* Při řešení rovnice $m\,\mathrm{tg}\,\omega = \mathrm{tg}\,m\omega$ je výhodno užíti řešení grafického, kteréž dobře o věci orientuje. Aby však výkres v ordinátách — vzhledem k velikému koefficientu m — nestal se velmi rozsáhlým — a aby přitom volnou redukcí rozměrů ordinátových výkres nepozbyl charakteristické určitosti — jest výhodno redukovati rozměr ordinát právě m-krát, t. j. sestrojiti graficky rovnici nikoliv onu původní, nýbrž

$$\mathrm{tg}\,\omega = \frac{1}{m}\,\mathrm{tg}\,m\omega.$$


K tomu účelu sestrojíme dvojí křivky, totiž jednak $y = \mathrm{tg}\,x$, jednak $y = \frac{1}{m}\,\mathrm{tg}\,mx$. První křivka je čistě tangentová, ale také druhá křivka je čistě tangentová — jenom že proti prvější jak v abscisách, tak v ordinátách m-krát, — jenom že proti prvější jak v abscisách, tak v ordinátách m-krát zmenšená. Neboť co je při prvé křivce x a y, to je při druhé $\frac{x}{m}$ (resp. $\frac{m\,x}{m}$, resp. $\frac{m\,y}{m}$). Obdrželi bychom tedy druhou křivku, kdybychom se na prvou dívali očkem m-krát zmenšujícím.

Průsečky obou křivek odpovídají těm hodnotám ω, jimiž se dané rovnici vyhoví.

Vzhledem k tomu, že grafické ono znázornění a řešení hořejší rovnice v dosavadních spisech je provedeno jen schematicky, je v obr. 185. a 186. výkres správně proveden pro $m = 5$ a pro $m = 10$.

Při $m = 5$ obdržíme mezi dvěma hlavními maximy, totiž $\omega = 0$ a $\omega = \pi$, hodnoty tři, totiž ω_1, $90°$, $180 - \omega_1$, při čemž je ω_1 blízce $= 52°1$.

ob. 185.



Při $m = 10$ (obr. 186) obdržíme zase mezi prvními dvěma hlavními <u>maximy</u> čili mezi $\omega = 0$ a $\omega = 180°$ hodnotami, (všeobecně $m-2$), totiž: $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, 180-\omega_4, 180-\omega_3, 180-\omega_2, 180-\omega_1$.

Aby k výkladům předešlým dán byl číselný a tím srozumitelný <u>příklad</u>, jak značná asi ona primární a sekundární maxima jsou, provedl spisovatel výpočet pro $m = 10$ zcela přesně a úplně.

Výsledek je následující: Nejprve vypočteny ony hodnoty $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$ a sice přesně až na tisíciny stupně. Při koefficientu $m = 10$ je to velmi snadné.

Tak počítán výraz:

$$\left(\frac{\sin m\omega}{m \sin \omega}\right)^2 = \frac{1}{1+(m^2-1)\sin^2\omega} \qquad (\text{při } \operatorname{tg}\omega = \tfrac{1}{m}\operatorname{tg} m\omega)$$


pro tyto hodnoty čitatel; výsledek se pro další hodnoty supplementární oněch úhlů ω ovšem opakuje.

Pak počítán výraz:

$$m^2 a^2 \left(\frac{\sin\varphi}{\varphi}\right)^2.$$

To však není možno bez určité supposice o vzájemném poměru šířky štěrbiny a a šířky mezery b. Vzato tedy $b = a$.

ob. 186.



Tím se stává $\psi = \varphi$ a tudíž $\omega = \varphi + \psi = 2\varphi$ čili $\varphi = \frac{1}{2}\omega$.

Poněvadž pak jde jen o hodnoty <u>relativní</u>, položeno dále $a = 1$.

Konečně <u>násobením</u> počítána hodnota intensity

$$J = m^2 a^2 \left(\frac{\sin\varphi}{\varphi}\right)^2 \cdot \left(\frac{\sin m\omega}{m \sin\omega}\right)^2 = m^2 a^2 \left(\frac{\sin\frac{1}{2}\omega}{\frac{1}{2}\omega}\right)^2 \cdot \frac{1}{1+(m^2-1)\sin^2\omega}.$$

Výsledky jsou obsaženy v následující <u>tabulce</u>.

ω	$m^2\left(\frac{\sin\varphi}{\varphi}\right)^2$ $m=10, \varphi=\frac{1}{2}\omega$	$\frac{1}{1+(m^2-1)\sin^2\omega}$ $m=10$	$J = m^2a^2\left(\frac{\sin\varphi}{\varphi}\right)^2 \cdot \left(\frac{\sin m\omega}{m\sin\omega}\right)^2$ $= \text{„} \quad \text{„} \cdot \frac{1}{1+(m^2-1)\sin^2\omega}$ $a=1$
0	100	1/ 1	100
18			0
$\omega_1 = 25,833$	98,32	1/ 19,798	4.97

	36			0
$\omega_2 =$	44, 417	95,10	1/ 49,493	1, 92
	54			0
$\omega_3 =$	62, 705	90,41	1/ 79,180	1, 14
	72			0
$\omega_4 =$	80, 908	84,45	1/ 97,530	0, 99
	90		1/ 100	0
$180 - \omega_4 =$	99, 092	77,43	1/ 97,530	0, 79
	108			0
$180 - \omega_3 =$	117, 295	69,60	1/ 79,180	0, 88
	126			0
$180 - \omega_2 =$	135, 583	61,23	1/ 49,493	1, 24
	144			0
$180 - \omega_1 =$	154, 167	52,44	1/ 19,798	2, 65
	162			0
	180	40,53	1/ 1	40, 53
	198			0
$180 + \omega_1 =$	205, 833	29,44	1/ 19,798	1, 49
	216			0
$180 + \omega_2 =$	224 417	22,35	1/ 49,493	0, 45
	234			0
$180 + \omega_3 =$	242, 705	16,26	1/ 79,180	0,21
	252			0,
$180 + \omega_4 =$	260, 908	11,16	1/ 97,530	0,11
	270		100	0
$360 + \omega_4 =$	279, 092	7,10	1/ 97,530	0,07
	288			0
$360 - \omega_3 =$	297, 295	4,02	1/ 79,180	0, 05
	306			0
$360 - \omega_2 =$	315, 583	1,88	1/ 49,493	0, 04
	324			0
$360 - \omega_1 =$	334, 167	0,59	1/ 19,798	0, 03
	342			
	360	0,00	1/ 1	0, 00

Druhé hlavní maximum vyznačeno.

Z tabulky tedy vidíme číselně: První hlavní maximum $w = 0$ jest položeno $= 100$. Druhé hlavní maximum $w = \pi$ je $= 40,53$, tedy tolik procent prvního. Třetí hlavní maximum zde při $b = a$ vypadne, poněvadž je-li $w = 2\pi$, je zde $\varphi = \pi$, tudíž $\sin \varphi = 0$. Každá štěrbina dává pro sebe intensitu $= 0$ a tudíž všechny dohromady též.

Sekundárních maxim je mezi dvěma hlavními osm. Jich hodnoty jdou z počátku do celých několika procent, později jen do desetin procenta, ale nejsou snad stejné a neopakují se nějak periodicky, poněvadž sice funkce $\frac{1}{1+(m^2-1)\sin^2 w}$ je periodická, ale nikoli funkce $\left(\frac{\sin \varphi}{\varphi}\right)^2$.

Minima jsou ovšem $= 0$ pro $\sin w = k\pi$, kdež je k číslo $1, 2, 3, 4 \ldots$ atd.

§ 226. Výklad populární.


Jednoduchý výsledek, jehož jsme došli v § předešlém, dá se v této své jednoduchosti snadno pochopiti.

Podmínkou maxim hlavních jest

$$(a+b)(\sin i + \sin \alpha) = k\lambda.$$

Mějme tedy velký počet štěrbin. Rozdělme každou (obr. 187) na jistý počet, na př. 10 elementárních štěrbin, jež číslujeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elementární štěrbiny stejného číslování – homologické – jsou patrně od sebe vzdáleny o délku $a + b$. Rozdíl dráhový vázaný je tedy $(a+b)(\sin i + \sin \alpha)$ při dopadu libovolném i. Rovná-li se tento rozdíl dráhový jistému počtu celých délek vlnových λ, pak je patrno, že taková retardace dráhová nespůsobuje žádnou differenci fásovou. Tudíž všechny elementární štěrbiny stejně číslované se sečtou, jsouce ve fási téže a poněvadž jest jich veliký počet, dávají výsledkem amplitudu vibrační velmi značnou. Mezi sebou mají ovšem elementární štěrbiny 1, 2, 3, 4, . . . 10 fásové rozdíly, ale všeobecně se těmi vibrace nezničí – kdyby $a(\sin i + \sin \alpha)$ pro sebe bylo $= k\lambda$; pak by ovšem vibrace všech elementárních štěrbin téže dané štěrbiny se mezi sebou sčítaly a tudíž i ve svém celkovém spolupůsobení.

obr. 187.



Jinak lze výsledek, k němuž jsme pro veliký počet štěrbin došli, též cestou geometrického znázornění pochopiti (obr. 185).

Pro přímý postup naměříme délky a a b do téže přímky. Amplituda výsledná je dána součtem všech a. Když se papírky od přímého směru obrubem začnou nehybovati, znamená to, že ona přímka se stáčí do kruhu. Všeobecně se při tom tětivy obloukům a odpovídající rozloží v kruhu tak, že jejich výplní následkem velmi velikého počtu světlo-činný součet = 0. Stane-li se zakřivení tak, že oblouček délky $a+b$ vyplní sám celý kruh — anebo dvakrát celý kruh anebo třikrát atd., pak padnou všechny obloučky a na sebe, tudíž i tětivy jim odpovídající, čímž výsledná tětiva se stane velmi značnou.

[* § 227. Minimum deviace.

[* Pro hlavní maximum je deviace $\mathfrak{D}$

$$\mathfrak{D} = i + \alpha,$$

$$k\lambda = (a+b)(\sin i + \sin\alpha).$$

Při čemž je i měnivou, když jest $\mathfrak{D}$ minimum.

Pro toto máme:

$$d\mathfrak{D} = di + d\alpha$$

$$0 = \cos i\, di + \cos\alpha\, d\alpha.$$

Z toho plyne pro minimum:

$$i = \alpha = \tfrac{1}{2}\mathfrak{D}. \quad *]$$

[* § 228 Měření délky vlny.

[* Užívá-li se mřížek k stanovení délky vlny λ, staví se buď na incidenci kolmou, t. j. $i = 0$ anebo do pozice minimální $i = \alpha$. Poslední je lepší.

V prvém případě máme — je-li $a + b = l$ —

$$l \sin\alpha_k = k\lambda,$$

v druhém pak

$$2l \sin\alpha_k = k\lambda,$$

kdež je

$$\alpha_k = \frac{2}{2}.$$

Minimální postavení mřížky je patrně analogou minimálního postavení hranolu. Jako tam hranol, tak stojí zde mřížka symmetricky k papskému dopadajícím a vycházejícím.

Pro disperzi u mřížky máme všeobecně:

$$(a+b)(\sin i + \sin\alpha) = k\lambda.$$

Činěvadž jest i konstantní, vychází

$$\frac{d\alpha}{d\lambda} = \frac{k}{(a+b)\cos\alpha}.$$

Disperse je tedy tolikrát větší, kolikrát je menší interwall $(a+b) = l$. Zároveň je patrno, že spektra vyšších řádů mají disperse větší, činěvadž je při nich α větší. *]

[* § 229. Spektra normální.

[* Srovnávajíce spektra hranolová a spektra mřížková shledáváme, že mřížková vynikají jistými přednostmi nad hranolová. Především dlužno uvésti nezávislost spektra na materiálu mřížky; je jednostejno, jakého druhu je sklo, na něž jemným dělicím strojem je mřížka nanesena. Dále je rozložení barev ve spektru mřížkovém čili úhlová $\mathfrak{D}$ pro jednotlivé barvy v jednoduchém vztahu s délkou λ vlny světelné. Máme totiž všeobecně

$$\mathfrak{D} = i + \alpha$$

$$l(\sin i + \sin\alpha) = k\lambda,$$

když je $l = a+b$, a $k = 1$ pro první (hlavní) spektrum a $k = 2, 3$ pro další spektra.

Pro incidenci kolmou $i = 0$ vychází:

$$l \sin \mathfrak{D} = k \lambda.$$

Pro úchylku minimální $i = \alpha$ vychází:

$$2 l \sin \frac{\mathfrak{D}}{2} = k \lambda.$$

V obou těchto hlavních případech je tedy sinus úchylky buď celé nebo poloviční úměrný délce vlny, a poněvadž úchylky jsou skoro malé, možno approximativně říci, že sinusy její jsou téměř rovné tangentám, tak že pozoruje barevný rovněm směrem projekčním jest úměrna délce vlny čili že barvy pokračují ve spektru téměř jako délky vlny světelné. Tím se též stává, že spektra různých mřížek jsou sobě podobná, což dokonce neplatí pro spektra hranolová. Vzhledem k uvedeným předpokladům označujeme spektra mřížkova za normální. *]

[*§ 230. Mřížky na odraz


[* V novější době nabyly velké důležitosti mřížky na odraz nanášené jemným dělicím strojem na plochách kovových a pravidla cylindrických, a tu zase zejména na cylindrických plochách průřezu kruhového. Veškeré úvahy dřívější, odvozené pro světlo, které mřížkou projchází, platí též pro světlo, které se mřížkou odráží; rozdíl dráhový δ při incidenci i a úhlu ohybovém α je jako dříve dán výrazem

$$\delta = x (\sin i + \sin \alpha),$$

jenom že zde jest úhel α z pravidla negativní (obr. 188), tak že nutno míti

$$\delta = x (\sin i - \sin \alpha);$$

obr. 188.



nebot' paprsek odražený ve vzdálenosti x má proti odraženému paprsku mřížkovému dopadem sice retardaci dráhovou $x \sin i$, ale ohybem při úhlu α akceleraci dráhovou $x \sin \alpha$, poněvadž z pravidla paprsek ohybem zpět se šířící leží na opačné straně kolmice dopadu. Kdyby ležel na téže straně kolmice dopadu, byl by úhel α svým positivní.

Jsou-li na kovové cylindrické ploše naneseny „štěrbiny" (t. j. místa dokonalé reflexe), šířky a a mezery (t. j. vrypy, které zpátečně odrážejí) šířky b, platí pro vznik maxim při velmi velikém počtu vrypů jako dříve

$$(a + b)(\sin i - \sin \alpha) = k \lambda.$$


Budiž nyní S světlý nekonečně úzká štěrbina rovnoběžná s osou válce, jež se dopadu nekonečně vzdálené promítá jako bod (obr. 189); SP a SQ budtež dva sobě nekonečně blízké paprsky, jež na kovovou plochu cylindrickou dopadají pod úhly

$$i \text{ a } i + di$$

a odrážejí se při úhlu ohybovém

$$\alpha \text{ a } \alpha + d\alpha.$$

obr. 189.



Jsou-li dále σ a σ' nekonečně malé úhly paprsků dopadajících SP a ohybem se odrážejících SQ, a je-li γ úhel poněkud nekonečně malý normál PCQ, platí následující relace:

mezi supplementárními úhly při C a C jsou si rovny, t. j.

$$\sigma + i = \gamma + i + di, \quad \text{tudíž} \quad di = \sigma - \gamma$$

$$\gamma + \alpha = \sigma' + \alpha + d\alpha, \quad \text{tudíž} \quad d\alpha = \gamma - \sigma'.$$

Vedle toho jest:

$$\sin i - \sin \alpha = \text{Const} \quad \text{a} \quad \cos i \, di - \cos \alpha \, d\alpha = 0.$$

Značí-li $PS = r$, $PS' = r'$ $PC = R$, $PQ = e$, jest dále:

$$r\sigma = e \cos i, \quad R\gamma = e, \quad r'\sigma' = e \cos \alpha.$$

Z rovnic těchto odvozujeme následující závěrečné:

$$(\sigma - \gamma) \cos i = (\gamma - \sigma') \cos \alpha$$

$$\left(\frac{\cos i}{r} - \frac{1}{R}\right) \cos i = \left(\frac{1}{R} - \frac{\cos \alpha}{r'}\right) \cos \alpha$$

$$\frac{\cos^2 i}{r} + \frac{\cos^2 \alpha}{r'} = \frac{\cos i + \cos \alpha}{R}$$


Z rovnice této lze snadno počítati r', je-li dáno r. Plocha cylindrická může všeobecně býti jakákoliv; v bezprostředním sousedství nekonečně blízkých bodů může ovšem za kruhovou býti pokládána, při čemž R značí poloměr křivosti. Při tom můžeme r a i považovati za polární

souřadnice bodu S, r a α za polární souřadnice bodu S'. Opisuje-li S nějakou křivku, pak S' opisuje také křivku — křivku pokálení ustanovenou hořejší soumčnou rovnicí.

1.) Pro $i = \alpha$, t. j. prostřední bílý obraz bodu S ve zjevu ohybovém, přejde rovnice tato ve známou relaci, jakáž platí pro „vedlejší osu" zrcadla dutého při odrazu světla

$$\frac{1}{r} + \frac{1}{r'} = \frac{2}{\frac{R}{\cos\alpha}},$$

při čemž $\frac{1}{2}\frac{R}{\cos\alpha} = f'$ jest „dálka ohnisková" měřená na ose vedlejší od zrcadla až k průseku osy s rovinou ohniskovou. (obr. 190)



2.) Při $i = -\alpha$ obdržíme relaci identickou platící pro minimum deviace" $D = i + \alpha$, když jest α počítáno na tutéž stranu kolmice dopadu a úhel $i = \alpha = \frac{D}{2}$.

Je-li při tom $R = \frac{r}{\cos i}$, je též $R = \frac{r'}{\cos\alpha}$, t. j. v tomto případě padne ohybový obraz bodu S na tento bod samotný, při čemž i čili α ovšem souvisí s délkou vlny světelné dle relace

$$2(a+b)\sin\frac{D}{2} = k\lambda.$$

3.) Případ poslední je zase speciálním pro jiný všeobecnější. Je-li všeobecně — nechť α jest positivní nebo negativní, D pak jakékoliv — $R = \frac{r}{\cos i}$, je současně $R = \frac{r'}{\cos\alpha}$.


To znamená: Pohybuje-li S na obvodě kruhu průměru R (obr. 191), pohybují se též S' na obvodě téhož kruhu. Obrazy ohybové bodu S jsou tudíž vesměs rozestřeny po obvodu tohoto kruhu. Případu tohoto užil H. A. Rowland.

4.) Je-li mřížka rovinou, t. j. $R = \infty$, vychází

$$\frac{\cos^2 i}{r} + \frac{\cos^2\alpha}{r'} = 0,$$

t. j. r a r' mají znamení opačná — případ analogický se zrcadlem rovinným. *)

obr. 191.




[*§231. Konkavní mřížky Rowlandovy.

(* Rowland zhotovil velmi jemné mřížky na vlastní ploše sférické tak totiž, že vrypy byly průsečky rovnoběžných a equidistantních rovin s vlastní plochou sférickou, středu pak vrypy procházel zároveň středem plochy sférické.

Budiž (obr. 192) taková mřížka konkávní, M budiž její centrální vryp, C střed sférické plochy. Dle předešlého dává zdroj S umístěný na obvodu kruhu, opsaného nad MC jako průměrem obraz v bodu S', který je na témže kruhu, a platí tu rovnice

$$(a+b)(\sin i - \sin\alpha) = k\lambda.$$

obr. 192.



Mřížka montuje se pak na tři ramena stejně dlouhá, z nichž jedno OM je pevné, další dvě OS a OS' jsou posuvný. V místě C postavíme stěrbinu rovnoběžně s vrypy mřížky, na rameně OS montujeme pak dalekohled, kterým mohou býti spektra pozorována. V tomto způsobu upravil svá pozorování S. P. Langley.


Jinou modifikaci zavedl prof. Rowland.

Aby docílil většího ohybového pole, volil pozorovati při úhlu ohybovém $\alpha = 0$, tak že rozdíly fázové vznikaly jen různou incidencí i stanovenou rovnicí


$$(a+b)\sin i = k\lambda.$$

Stálost úhlu $\alpha = 0$ byla zaručena pevným spojením pozorovacího dalekohledu s mřížkou (srovnej obr. 193. a 194.) a to pomocí kovové duté trubice délky MS', která se rovná poloměru zakřivení R mřížky. Periferickou polohu bodu S a S' na obvodě kruhu průměru R zaručil mechanicky tím, že při konstantní vzdálenosti $MS = R$ měnily SM a $S'S$ vzestupky stále pravý úhel. K tomu cíli byly na dlouhých těžkých dřevěných latích SX a $S'C$ v pravém

obr. 193.



obr. 194.



úhlu k sobě postavených upravěných železné koleje, na těch se pohybovaly vozíčky trubicí $M S' = R$ spolu spojené, z nichž jeden nesl mřížku M, druhý pozorovací dalekohled- anebo fotografickou komoru.

Štěrbina se osvětlovala pomocí totálně odrážejícího hranolku a byla eventuálně spojena s kollimátorem.

Ku konci připojme některé poznámky praktické.

Pro obyčejné měření (absorpční atd.) postačí mřížka s 5000 čárkami na 1 cm, pro měření ve světle ultrafialovém jemnější aspoň s 10000 čárkami. Mřížka nemá být dost veliká, dělení má být provedeno po šířce 10 až 12 cm. Poloměr křivosti bývá asi 6 m, fotografické desky skleněné 38 cm dlouhé, 4 cm široké lze v tomto poloměru křivosti ohnouti bez obavy, že se zlomí.

Rowlandových mřížek, v uspořádání popsaném lze užíti k velmi přesnému měření délky vlny. Poznali jsme, že tu platí

$$k \lambda = (a + b) \sin i.$$

Poněvadž však délka pohyblivého ramene $M S'$ je stále $= R$, jest $\sin i$ úměrný vzdálenosti $S S'$ a tudíž také λ úměrno této vzdálenosti. Známe-li řád spektra k a veličinu $a + b = l$, šířku mřížky + šířku místa odrážejícího, lze na rameni $S S'$ nanésti přímo hodnoty λ. Takovou gradnicí délky $S S'$ pro spektra různých řádů lze spektrum mřížkové velmi jednoduše fotografovati. Kamenu u S' postavíme olej skály $S S'$ nanesené, pro délku vlny těch paprsků, které chceme fotografovati, pak exponujeme. Na to můžeme posuňouti S' pro jiné paprsky a exponovati pozvolna. Tak lze celé spektrum fotografovati na jediné desce v několika minutách od čáry F až k nejzazšímu konci fialového světla. Práce tato při jiném uspořádání trvá několik dní.

Na druhé straně nelze však zamlčeti, že zhotovení dobré mřížky vyžaduje veliké píle a trpělivosti jednak při hotovení dobrého šroubu, jinak při vyhledávání vhodného diamantu k rytí. A i když vše je v pořádku, pak rytí mřížky 12 cm dlouhé s 10000 čárkami na 1 cm vyžaduje nepřetržité práce po 5 dní a 5 nocí. Snadněji rytí se mřížky na kovu než na skle, neboť zde ostří démantu se během práce méně.

Při velmi jemných měřeních nutno pamatovati též, že s teplotou délka $a + b$ mění, že teplota a tlak vzduchu mají vliv na délku vlny pro vzduch, kterou pak nutno přepočítati na vacuum atd. Vůči všem vyličeným obtížím podařilo se práce nalezti pro délky vln světelných hodnoty velmi přesné tak, že nejistota jde nanejvýše do čtvrtého místa. Na př. pro čáru D_2 udávají se od různých pozorovatelů (Angström, Müller a Kempf, Kurlbaum, Peirce, Bell) hodnoty $D_1 \ldots \lambda = 589{,}58$ až $589{,}62$ $\mu\mu$, tudíž difference největší jen $0{,}04$ $\mu\mu$ čili setna $0{,}01\,\%$. *)

O polarisaci a dvojlomu světla.


§231. Základní pojmy a definice.

Vysvětlujíce úkazy až dosud v optice theoretické poznané, pokládali jsme světlo za zjev, jehož podstatou jest periodicita, což vyjadřili jsme nejjednodušší formulací, že jest světlo oscillačním pohybem ethem; zda-li podélným nebo příčným, nebylo stanoveno. Tak jsme již v úvodu pozorovali, předpokládal Huygens, zakladatel undulační theorie světla, opírajíc se o analogie akustické oscillace longitudinální. Seznáme však nyní úkazy nové, tak zvané polarisační, které vlastně Huygens první zná již byl pozoroval, jež pak Newton hledě v souvislost vésti se svým názorem o „náklonnostech" částeček světelných arch.

mých k odraze neb k průchodu, a jež konečně Fresnel vyvětlil tou zásadu modifikací theorie undulační Huygensovy, že předpokládal svítivá částečky etherových transversálně.

Objasněme si věc známou analogií. Vlnění pravá jsme viděli podélná a příčná. Vzmáh na př. chvějé se pouze podélně nebo příčně. Známe-li myšlenku, jaké vlnění etherem, které je podstatou světla, nečiníme všeobecnosti žádnou újmu předpokládajíce, že skládá se ono vlnění jednak ze složky longitudinálné a jednak ze složky transversálné. Zda li obě tyto složky jsou při vlnění světelném zastoupeny či jenom jedna z nich, o tom rozhodne pokus. Nicházející otázku tu prozatím bez odpovědi, uvažujme případ napjaté struny. Struna tato třeba po délce rozechvěje se longitudinálně a vydá ton určité výšky. Lač-li ji však uvésti v oscillacní pohyb transversálním na př. smyčcem, pak struna chvějíc se příčně, vydá jiný ton. V prvém případě chvěje se struna tak, že tento pohyb nemění trvánost její vzhledem k jakékoliv rovině, kterou si myslíme proloženou body, kde je struna upevněna. V případě druhém však chvěje struna v určité rovině položené zmíněnými dvěma body, má tedy jakoby dvě struny.

Myslíme si nyní, že by struna měla procházeti štěrbinou, jež stojí v rovině kolmé na směr struny (obr. 195), a jejíž šířka jest jen málo větší než tloušťka struny.




obr. 195.

Chvějo-li se struna podélně pak můžeme štěrbinu kolem struny jako osy otáčeti jakkoliv — pohybu struny stěny - štěrbinou omezující nikterak nepřekáží.

Chvějo-li se však struna příčně, pak jen určitá poloha štěrbiny připouští kmity úplně volné; stáčíme-li štěrbinu z té polohy o nějaký úhel, překážejí pohybu alespoň částečně stěny štěrbinu obklopující, a v případě že by štěrbina byla z původní polohy o 90° otočena, struna vůbec na tom místě se chvěti nemůže.

Methodou analogickou můžeme odkrýti povahu světelných vibrací, použíce k tomu dvou destiček turmalínových rovnoběžně s osou krystallickou seříznutých. Dopadá-li papírek světelný na jednu takovou destičku kolmo, prochází část světla destičkou, ale toto světlo jeví vlastnost analogickou transversálně rozechvěné struny. Dopadne-li toto světlo na druhou destičku turmalínovou, pak jí prochází bez změny jen při určitém postavení této druhé destičky. Otáčíme-li druhou destičkou a to tak, aby papírek dopadající byl zároveň osou rotace, tu jen při souhlasném postavení obou destiček prochází světlo i destičkou druhou, jinak prochází jen částečně, a v poloze od původní o 90° otočené neprochází vůbec, tak že pozorovatel díval se tento otočenou destičkou druhou má dojem tmy.


obr. 196.

Otáčíme-li destičkou dále, objeví se největší intensita světla procházejícího, dostoupí-li opět otáčením zpětné 90°, tedy celkem 180°, mění se při dalším postupu v otáčení, až je při 270° minimální, a vrací se plná intensita zase při 360°.

Otáčení myšlené je ovšem relativné - t. j. použije jednou destičkou; otáčení obou nevyvolává v intensitě papírku myšlého změny žádné.

V příkladu právě uvedeném jeví se analogie s příkladem akustickým. Jako tam struna má strany, tak pravíme zde, že světlo má poly, jeví polárnost, jest polarisováno - název, který - jak známo - byl ještě zaveden na základě emanační theorie světla.

Jediná destička nedává při otáčení popsaného účinku - nemá tedy obyčejné světlo polarity, teprve když turmalínovou destičkou projde, je polarisováno, a poněvadž se tato polarisace jeví vztahem k určité rovině papírkem světelným proložené, říkáme, že světlo je rovinně polarisováno. Poněvadž pak v jednom vzájemném postavení obou desek nepronikají žádné světla deskou druhou, soudíme, že světlo záleží pouze v příčné vibraci etheru.

Položíme-li papírkem světelným a směrem těchto vibrací příčných rovinu, oddělíme

rovinu kmitovou čili vibračú; všechny částečky ětherem kmitají v této rovině k paprsku kolmo.

Rovina položená paprskem světelným k této rovině vibračú kolmo, zove se dle Fresnela rovinou polarisačú.

Kmity částeček ětherových dějí se tudíž k rovině polarisačú souměrně. Tím nabývá rovina polarisačú významu názorného. Při experimentech o polarisaci jest s výhodou z důvodů didaktických k usnadnění přehledu tuto rovinu vždy určitým a týmž způsobem voliti. Používáme-li pravidla nazýváme světla slunečního, při němž paprsky slunečné heliostatem směrem vodorovným do síně optické šlehají, je výhodno, když se tyto paprsky (na př. turmalínem) polarisují, volíti rovinu polarisačú vždy vertikálně, tak že kmity jsou směrem horizontálním. Tak to v následujícím vždy budeme předpokládati.

Onomu původním pokusu zovem první destičku turmalínovou, kterou se světlo polarisuje, zkrátka polarisatorem, druhou pak, kterou se poznává, že světlo je polarisováno, analysatorem.

§233. Polarisace odrazem.


Polarisace světla turmalínem zakládá se, což později ještě seznáme, na dvojlomu. Tak v úvodu historickém bylo uvedeno, vzešla první známost o tom, že světlo po případě na různé strany různě se chová, z úkazu dvojlomu, nehot Huygens studuje světlo islandským vápencem procházející první tuto vlastnost a zjevy na ní založené pozoroval, tím že dva vápence kladl na sebe; jeden z nich byl pak jakoby polarisatorem, druhý analysatorem. On sám nemohl však tyto zjevy vysvětliti; praví o té příčině: Mais pour dire comment cela se fait, je n'ay rien trouvé jusqu'icy qui me satisfasse."

Pozorování Huygensova zůstalo na dále nepovšimnuto po více než jedno století. Teprve v prvém desetiletí našeho století vznikl nový popud a sice objevem, kterýž v roce 1808 učinil Malus, o kterémž v úvodu bylo obšírněji jednáno.

Dopadá-li světlo bílé na odrážející rovinu skla nebo rovinu vodní a pod., nabývá odrazem vlastností podobných těm, kterýž ukazuje světlo prošedší turmalínem, pravíme zkrátka, že se odrazem polarisuje. Avšak tato polarisace závisí na úhlu α

dopadu (obr. 197) i jeho při jistém úhlu dopadu jest polarisace nejúplnější; určitý tento úhel dopadu zove se úhlem polarisačním, je-li úhel dopadu jiný, je polarisace jen částečná.

obr. 197.



§234. Zákon Brewsterův.

Závislost polarisace na úhlu polarisačním seznal již Malus, sezmal též, že úhel ten jest pro každou látku jiný, avšak teprve David Brewster (1815) na základě svých měření úhlu polarisačního na 18 látkách uhodl – pro mínění číselného materiálu – jednoduchý vztah, pro který odůvodnění podal později Fresnel

$$\operatorname{tg}\alpha = n.$$

Z tohoto vztahu je pak jasno, že úhel polarisační – tak jako exponent lomu – je podmíněný kvalitou světla, že je tedy jiný pro různé barvy ve světle bílém zastoupené, a že tudíž světlo bílé odrazem nemůže býti dokonale polarisováno. To platí ovšem hlavně o látkách světlo silně rozptylujících, na př. o skle flintovém; sklo korunové, jehož pro účely polarisační nejvíce se užívá, nenáleží k látkám těm a proto různost úhlu α pro různé barvy zde tak mnoho nevadí.

Jak se věc číselně jeví, ukazuje příklad následující.

$$\operatorname{tg}\alpha = n.$$

	n_A	n_H	α_A	α_H	Diffr.
Sklo korunové lehké	1,5100	1,5312	56°29',1	56°51',1	22',0
Sklo flintové těžké	1,7350	1,8110	60° 2',5	61° 5',6	63',1

Pro extremní hodnoty délky vlny počtené t. j. pro čáry Fraunhoferovy A a H činí tedy rozdíl v úhlu polarisačním při lehkém skle korunovém asi $\frac{1}{3}°$, naproti tomu při těžkém skle flintovém přes 1°.

Geometrický význam zákona Brewsterova je velmi jednoduchý; při dokonalé polarisaci je paprsek odražený kolmým na paprsek lomený (obr. 198)

Je-li totiž

$$\operatorname{tg}\alpha = n$$

čili $\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$,


jest patrně $\cos\alpha = \sin\beta$.

tudíž $\alpha + \beta = 90°$.

Poznamenati dlužno, že se zákona Brewsterova, když se α empiricky stanoví, lze naopak počítati n. Této jednoduché methody lze s prospěchem užíti u látek nepůlikledných. Tak byl nalezen exponent lomu (střední) na př.

skla kamenného = 1,701,
rohoviny = 1,565.


obr. 198.



§235. Polarisace lomu.

Malus objevil r. 1808. polarisaci odrazem, obrátil později svou pozornost též k paprsku lomenému a zjistil, že také tento ukazuje stopy polarisace, že však polarisace tato je opačného smyslu než polarisace odrazem. Řekneme tedy, že polarisační roviny obou paprsků, odraženého a lomeného, jsou k sobě kolmé. Opakuje-li se odraz a lom na několika destičkách skleněných, stávají se paprsky takovou postavou skříčky procházející postupně vždy slabšími a slabšími, ale ja to dokonaleji polarisovány (obr. 199).

obr. 199.



Malus podal o svém objevu zprávu r. 1811. Káže na to též roku vystihl též rozdíl mezi zrcadly průhledními (na př. sklem) a neprůhledními (kovem). Při odraze nastává polarisace ve dvou na sobě kolmých rovinách. Paprsek v jedné rovině polarisovaný se odráží, ve druhé polarisovaný vniká do ústředí odrážejícího. U zrcadel kovových však vnikání tento paprsek do ústředí

odrážejícího, nýbrž také se odráží — proto se jeví světlo na zrcadlech kovových odražené téměř nepolarisovaným. Výsledek vzniká zde polarisace zvláštního druhu (eliptická).

Podle Fresnela předpokládáme, že rovina polarisační paprsku odraženého jest identická s rovinou dopadu. Dle toho je pak rovina polarisační paprsku lomeného k rovině lomu kolmou.

§236. Apparáty polarisační.

Ke studiu úkazů polarisačních sestrojeno zvláštní přístroje, tak zv. polarisační. Jich úprava buď se především dle toho, mají-li sloužiti pozorování subjektivnímu nebo objektivnímu (t. j. projekci úkazů polarisačních).

Každý apparát polarisační obsahuje jakožto hlavní části: polarisator a analysator. Oboje montovány buď nad sebou (se smyslem svislým) anebo za sebou (se smyslem horizontálním). Dvě roviny polarisační tvoří hlavní rovinu polarisačního apparátu. Při pozorování bývají tyto hlavní roviny buď skřížené (v úhlu 90°) nebo rovnoběžné (v úhlu 0°). Obyčejně může se analysator otáčeti kolem osy celého apparátu, při čemž lze často úhel, o který se otočí, na dělicím kruhu odečísti.


Nejjednodušší apparát polarisační jsou „turmalinové kleště" (obr. 200.) Polarisátorem i analysátorem jsou zde destičky turmalinové. K účelům jimž později porozumíme, bývá připojena čočka spojná (dávající světelné pole velké divergence) a dvě tak zvané destičky čtvrtvlnové. Vadou turmalinu jest, že jeho destičky nejsou čiré, nýbrž zbarvené, tak že tím pole světelné není bílé, nýbrž barevné. Nejlepší jsou ještě destičky turmalinové slabě zelené nebo žlutavé.

obr. 200.



K účelům demonstrování základních jevů polarisace odrazem slouží apparát (Stöhrer) montovaný na centrifugálním stroji (obr. 201).—

ob. 201.



Polarisatorem a analysatorem je zde zrcadlová deska skleněná na zadní ploše cenčená, aby se obraz dál jen na ploše přední.

Svazečky rovnoběžných papírků plnečních řídí se (pomocí totálně odrážejících hranolů) šikmo na polarisator, tak aby papírky dopadaly v úhlu polarisačním (asi 57°) a odrážely se vertikálně dolů.


Rovina polarisační jest tedy vertikální. Papírky se pak zachytí analysatorem též v úhlu polarisačním zařízeném; také jeho rovina polarisační je vertikální. Analysator se otáčí kolem vertikální osy centrifugálního stroje, která je tedy identická ve směru papírků na analysator dopadajících. Tím mohou hlavní roviny tohoto apparátu polarisačního k sobě přijíti do úhlů libovolných. Projekčním stem je zde skleněný dutě broušený válec. Aby projekce papírků byla ostrou, nává se projekční (slabé) čočky, která reálné obraz na válci otvor kulatý při heliostatu.

Zvláštností tohoto apparátu jest rotující analysator, kterým se obrazy na projekční stěně seřadí vedle sebe tak, že při otáčení dosti rychlém — následkem trvání dojmu zrakového — se objeví spojitý kruh světlý měnlivé intensity, která na místech, jež odpovídají skřížením hlavním rovinám, klesne téměř na nulla. Hodí se tedy tento apparát velmi dobře k současném přehledu zjevů, jež bychom jinak po sobě pozorovati

Obraz 202 ukazuje jiný polarisační apparát mnoho užívaný, který sestrojil mechanik Nörrenberg.


Polarisatorem jest zde skleněné (zrcadlová) průhledná deska

ob. 202.



Ze všech papírků v rozmanitých směrech v diffusním světle denním na desku dopadajících a se směrem dolů odrážejících přijde pro vlastní pozorování jen ty k platnosti, které se odrážejí přesně vertikálně (obr. 203), tak že na dalejším k ose apparátu kolmo položeném horizontálním zrcadle se rovněž vertikálně do směru svých odrážejí. Tím je dle zákona tj. $\alpha = \alpha'$ určena postavení desky k ose apparátu (α asi 57°, $90 - \alpha = 33°$), kteréž se ostatně nejlépe zkusmo určí; k orientaci jest však na desky malý goniometr připojen.

ob. 203.



Analysatorem je buď zrcadlová destička na zadní ploše cenčená a již se správném sklonu do pouzdra zasazená anebo soustava skleček. Této má tu výhodu, že současně lze pozorovati na odraz i na lom papírků v analysatoru. Další analysatory při apparátu se nalézající (nikol, achromatisovaný hranol vápencový) mají základ ve dvojlomu.

Analysator lze otáčeti a lze na alhidadě a děleném kruhu úhly odečísti.

Pro projekci zjevů polarisačních sestrojil J. Duboscq polarisační apparát zvláštní, kterým se také v přednáškách našich veškeré zjevy polarisační objektivně předvádějí. Uspořádání jeho je různé dle povahy experimentů, které se mají objektivně předvésti. Uvedeme tudíž toto uspořádání později při jednotlivých experimentech zvlášť.

§ 237. Základní zjevy dvojlomu světla.

Jak v úvodu historickém vyloženo, učinil Erasmus Bartholinus (1669) překvapující objev dvojlomu na vápenci islandském. Paprsek světelný dopadající na krystal vápence islandského rozložuje se ve dva, z nichž jeden činí se dle známého zákona Snelliova, druhý však nejen že se co do úhlu dopadu a lomu neřídí zákonem tímto, ale i vystupuje z roviny dopadu


Po několika letech Huygens vysvětlil úkaz dvojlomu na základě své theorie undulační a objevil – jak již zmíněno – „podivuhodný zjev" polarisace.

Ukazuje se pak všeobecně, že všechna tělesa krystallická, pokud není základní jich formou kostka, dále ústrojné látky, jichž částice jsou uspořádány pravidelně a všechna tělesa ve stavu nestejného napjetí jeví vlastnost dvojlomu.

Rozštěpení paprsku dopadajícího ve dva záleží na směru paprsku dopadajícího vzhledem k přirozeným plochám krystalu. Každý dvojlomný krystal obsahuje aspoň jeden směr, v němž žádného rozštěpení není. Tento směr nazývá se optickou osou. Dopadá-li paprsek kolmo k ose optické, pak rozštěpení jeho ve dva paprsky jest největší.

Pro pozorování úkazu dvojlomu nejlépe se hodí vápenec islandský, jehož krystaly mohou býti redukovány na jeden základní tvar, t.j. tvar klence čili rhomboedr. Tento klenec (obr. 204) omezen je šesti rovnoběžníky, jichž úhly jsou 101°55' a 78°5'. Dva rohy protilehlé klence tvoří jsou třemi úhly, ostatní 4 rohy tvoří vždy jeden tupý a dva ostré úhly. Směr vedený jedním z obou rohů protějších, tak aby svíral se všemi třemi stěnami tímž úhel, slove osou krystalu. Jsou-li strany rhomboedru stejny, pak je přímka spojující rohy A, B jakož i každá jiná s touto přímkou rovnoběžná osou krystalu.

obr. 204.



Všechny klence omezující skoumány jsou k sobě pod úhly 105°5' a 74°55'.

Mějme dvojlom islandským vápencem studovati, vezměme hojnovárku a položme na ni skleněnou desku (obr. 205), pod kterou dáme zrcátko, aby nejlépe denní světlo (na př. od třech oken) odráželo. Na desku položíme dále černý papír, v němž učiníme malé otvory buď kulaté neb formy čtverečné, křížovité a pod., na ty pak dáme krystal. Vidíme dva obrázky. Divajíce se pak kolmo na přirozenou plochu krystalu, otáčíme-li tímto nad otvorem, zůstává jeden obrázek v klidu, druhý pak kolem něho opisuje kruh. Jsme-li obrázek vidíme pouhou dále než druhý, přímka ona spojující má pak směr diagonály těch stěn, jíž pozorujeme.

obr. 205.



§238 Polarisace dvojlomem.

Ten paprsek, který v dvojlomném ústředí láme se dle zákona sinusového, nazývá se řádným (ordinárním), druhý pak mimořádným (extraordinárním). Deskou turmalinovou lze dokázati, že oba paprsky jsou rovinně polarisovány. Dvojlomem se tedy světlo polarisuje rovinně. Z toho však následuje, že i dvojlomné ústředí jsouc polarisatorem hodí se též za analysator a že tedy paprsek jedním krystalem vápencovým ve dva rozdělený (v O a E, řádný, mimořádný) a v obou rovinně polarisovaný může býti druhým krystalem vápence zkoumán.

Je-li druhý krystal souhlasně postaven, pak je celý případ ekvivalentní průchodu paprsku krystalem větších rozměrů v tom případě tedy prochází paprsek O jako O a paprsek E jako E krystalem druhým. Když však druhým krystalem otočíme, pak oba paprsky O a E rozštěpí se ve dva nové tak že 4 paprsky vycházejí z krystalu druhého. Řádný paprsek O z prvého krystalu vystupující rozdělí se ve dva O_o a O_e, řádný a mimořádný, v krystalu druhém a podobně se také mimořádný E z prvého krystalu rozdělí v jeden řádný E_o a druhý mimořádný E_e. Otáčíme-li druhým krystalem dále, pak paprskům O_e a E_o na jasnosti přibývá, za to však druhý pár paprsků O_o a E_e stává se méně a méně jasnějším, až konečně dva tyto paprsky zmizí, otáčí-li se druhý krystal o 90°. Zbývají pak jen dva paprsky O_e a E_o. Otáčí-li se druhým krystalem ještě dále, stávají se tyto paprsky méně jasnými za tím co druhý pár paprsků O_o a E_e se znova objeví a stoupá v intensitě, až se krystal otočí o 180°. V této poloze jsou kombinace obou krystalů povrze dva paprsky O_o a E_e jako z počátku. V jedné poloze druhého krystalu tedy procházejí oba paprsky úplně volně, tedy řádný paprsek jako řádný, mimořádný jako mimořádný, v poloze o 90° odchýlené láme druhý krystal paprsek řádný jako mimořádný a mimořádný jako řádný, v poloze intermediální láme krystal druhý oba paprsky dvojitě.

Pokusem lze tyto úkazy velmi pěkně studovati v této formě. Vaht dopadá světlo rovnoběžných papsků z kruhového otvoru na první krystal, pak na stínítku vznikají dva kruhové obrazy, jeden pro paprsek řádný, druhý pro paprsek mimořádný. Dopadá-li pak světlo ještě na krystal druhý, vzdělí se všechny oba papsky zase každý ve 2, tak že na stínítku vzniknou celkem čtyři obrázky, jichž intensita se dle vzájemného postavení obou vápenců mění. Úkaz se předvádí v projekci vhodnou čočkou. Krystaly dlužno umístiti blíž za otvorem. Velmi pěkně lze tento pokus modifikovati, když se místo vápencových krystalů užije dvou „achromatisovaných hranolů vápencových" (viz později), čímž se docílíme větší divergence papsků řádných a mimořádných, a tím na stínítku širší rozlohy obrazů, které jinak při krystalech vápencových obyčejných jsou velmi těsně u sebe. Effektnim stává se pak pokus, když druhý z obou achromatisovaných hranolů vápencových se dá rychle otáčeti kolem papsku dopadajícího jako osy. V této modifikaci pokusu lze položiti oba achromatisované hranoly vápencové přímo za sebe, nikoli blíž za otvor, nýbrž za čočku do její obrazové roviny, kde se svazek papsků zúžuje.

Co se týče jich roviny polarisační papsku řádného a mimořádného při dvojlomu, stanovíme následující: Že obyčejem každý řez krystalu, kterýž je veden osou jeho, zvati hlavním řezem. Při tom připomínáme, že osa není nad míčtá přímka, nýbrž určitý směr v krystalu.

Papsek řádný jest polarisován v hlavním řezu,
papsek mimořádný v rovině k němu kolmé.


U papsku řádného jest tedy kmitočeř vždy kolmý k ose, u papsku mimořádného může kmitočeř býti k ose jakkoliv šikmým.

Na dvojlomu zakládá se též polarisace turmalinem, o níž jsme jednali ve výkladech úvodních. Turmalin jest též ústředím dvojlomným, při tom však též ústředím absorpčním. Zajímavo je však, že možnost absorpční je pro řádný papsek značně větší. Máme-li tedy destičku turmalinovou, jejíž roviny jsou hlavním řezem (t. j. s osou rovnoběžné) a je-li tloušťka destičky dostatečná, absorbuje se papsek řádný úplně, tak že

vychází jen papsek mimořádný, u něhož kmity jsou rovnoběžné s osou.

§ 239 Zákon Malusův.

Mějme za to — dle theorie Fresnelovy — že směr vibrace je kolmý k rovině polarisační. Nechť světlo dopadající je polarisováno v rovině, která s rovinou dopadu tvoří úhel Θ (obr. 206).



obr. 206.

Amplituda a světla dopadajícího může býti položena ve dvě komponenty, $a\cos\Theta$ je složka kolmá k rovině dopadu, $a\sin\Theta$ je složka s rovinou dopadu rovnoběžná. První je polarisována v rovině dopadu a odráží se, druhé je polarisováno v rovině kolmé k rovině dopadu a prochází. Že tedy světlo odražené polarisováno v rovině odrazu a jeho intensita je úměrna $\cos^2\Theta$. Tím je zákon Malusův odvozen.

Světlo obyčejné rozdělíme se krystalem v papsky dvou druhů polarisované rovinně a to v rovinách k sobě kolmých. Zákon Malusův opravňuje nás pozorovati světlo obyčejné jako světlo složené ze dvou druhů světel polarisovaných v rovinách k sobě kolmých.

Svírá-li rovina polarisační světla prvého druhu s rovinou odrazu úhel α, pak rovina polarisační světla druhého druhu svírá úhel $90-\alpha$. Je-li J intensita světla každého z obou světel, pak intensity odražených papsků jsou $J\cos^2\alpha$ a $J\sin^2\alpha$ a jich součet

$$J\cos^2\alpha + J\sin^2\alpha = J,$$

jest výsledná intensita světla odraženého. Jest tedy intensita obyčejného světla odraženého stálou a nezávislou na poloze roviny odrazu ku papsku.

Dopadá-li papsek světla intensity J na krystal vápence, pak rozdělí se na papsek řádný intensity $\frac{J}{2}$ a papsek mimořádný intensity $\frac{J}{2}$,

dopadají-li tyto paprsky na druhý krystal, následuje dle zákona Malusova tato subdivise:

Světlo dopadající:	První krystal:	Druhý krystal:	Rovina polar.:	Součet:
J	$O = \frac{J}{2}$	$O_o = \frac{1}{2} J \cos^2\alpha$	0	$\frac{1}{2} J$
		$O_e = \frac{1}{2} J \sin^2\alpha$	90	
	$E = \frac{J}{2}$	$E_o = \frac{1}{2} J \sin^2\alpha$	0	$\frac{1}{2} J$
		$E_e = \frac{1}{2} J \cos^2\alpha$	90	

$\Big\}$ J

Dopadá-li světlo na plochu reflektující pod úhlem, který je menší nebo větší než úhel polarisační, jeví světlo odražené jenom částečně vlastnosti světla polarisovaného a proto je nazýváme světlem částečně polarisovaným. Světlo částečně polarisované můžeme pokládati za směs světla úplně polarisovaného a světla vůbec nepolarisovaného.

Dvojlom v krystalech jednoosých.

§240. Konstrukce Huygensova.


Skoro potom, kdy E. Bartholinus objevil (1669) dvojlom světla na islandském vápenci, Ch. Huygens podal (1678) a později uveřejnil (1690) ve spise svém „Traité de la lumière" řešení úkolu, stanoviti lom nejen paprsku řádného, nýbrž též mimořádného.

Řešení toto podal konstrukcí na základě své theorie undulační. Vyloživ předem, jak dle této theorie lze vysvětliti lom světla vůbec a jak lze lom tento stanoviti konstrukcí — ač již dříve vyloženou — na základě obecných kulové, v prostředí a tím, že se vlnění v obyčejných isotropních již vyčerpati stejnou ve všech směrech, zkoušel tuto konstrukci modifikovati předpokládaje, že by dvojlomka v vápenci byla dílem koulí dílem plochou koulí podobnou, „comme il y avoit deux refractions différentes, je conçus, qu'il y avoit aussi deux différentes emanations d'ondes de lumière ....

Pro lom „pravidelný" (la réfraction régulière) předpokládá, „onde de forme à opposer" — a praví: „Quant à l'autre emanation qui devoit produire la refraction irrégulière, je voulus essaier ce qui devoit arriver des ondes elliptiques ou plus mieux, des spheroides . . . " Míní tu rotační ellipsoid. Obě tyto plochy, koule a rotační ellipsoid dotýkají se v jistém směru — optické osy — v tom totiž, kde paprsek řádný i mimořádný se šíří touže rychlostí a kde tudíž dvojlom ve vápenci odpadává; a poněvadž paprsek mimořádný se ve vápenci povšechně šíme méně než řádný, musí rychlost šíření se plus mimořádných bříští povšechně větší — t. j. ellipsoid rotační musí býti koule opsán.

Obr. 207. α) ukazuje meridianový řez obou ploch t. j. řez rovinou, kterou vedeme společnou osou obou ploch, t. j. osou opticeou. Řež tento dává ellipsu o poloosách a a b (dle obvyklého označení) a kruh o poloměru b.

Obr. 207. α)




Rovnice ellipsy a kruhu je tudíž:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \qquad x^2 + y^2 = b^2$$

Poněvadž jde o útvary rotační, jest řez meridianový pro všechny polohy řezné roviny vždy týž.


Řež equatoreální jest soustava dvou kruhů poloměrů a a b (obr. 207. β).



Budiž MN (obr. 208) rozhraní vzduchu a vápence. Směr paprsku dopadajícího budiž JA. Jak známo AB ($\perp JA$) čelo vlny ve vzduchu v okamžiku, kdy paprsek dopadne do bodu A.

Dle principu Huygensova stane se A středem elementární vlny jednak do téhož prostředí — vzduchu — se nacházející, tedy odražené, jednak do druhého prostředí — vápence — mířící, tedy lomené. Poněvadž toto druhé je dvojlomné, skládá se tato vlna z koule a ellipsoidu opsaného.

Za ten čas, kdy vlnění ve vzduchu pokročí délkou Bb, stane se postupně každý bod mezi A a b střediskem mezi koulí a ellipsoidu opsaných



ob. 206.

jež se šíří s určitou rychlostí, tak že v okamžiku, kdy právě z bodu C by vlnění mělo vyjíti, mají vzniklé jistou velikost.

Předpokládejme, že rovina dopadu – nakreslená – jest zároveň hlavním řezem vápence. Pak lze konstrukci dokončiti v rovině. Na místo koule a ellipsoidu máme tu kruh a ellipsu. Všechny kruhy a všechny ellipsy mají pak přímku obalující. Tuto sbodněme, když nakreslíme jenom ten kruh a tu ellipsu, které náleží k centru A a když přímku od bodu C položíme tečnou jednak ke kruhu, jednak k ellipse. Body tečné jsou O a E.

Pak značí AO a AE loučené papírky, řádný a mimořádný. Při tom jest AO zároveň normálou vlny CE. Neboť AE je všeobecně šikmo k přímce CE čili normála $p = AH$ vlny CE. Neboť AE má jiný směr než přívodič $AE = r$.

Všeobecně – když nechceme předpokládati, že rovina dopadu jest hlavním řezem vápence – musíme provésti konstrukci prostorovou

§ 241. Modifikace Huygensovy konstrukce.

Konstrukce Huygensova v tom způsobu, jak on sám ji podal a jak zde byla reprodukována a také i jinde všeobecně se udává, má jistou vadu, kterou každý vzíti, kdo v skutku o jevech dvojlomu v významných případech dle této konstrukce se chce orientovati. Vada spočívá v tom, že rozměry vlnoplochy dlužno

provésti v měřítku přímky BC, jejížto délka je zcela nahodilou dle toho, jak daleko onen druhý papírek FC se vede od daného čití jak dlouhou se volí přímka AB značící „čelo vlny" – a mimo to ještě také, v jakém sklonu se obě tyto přímky vedou – poněvadž také tím se délka BC mění. Jest tedy třeba – má-li se konstrukce skutečně správně provésti a nejenom tak schematicky odbýti – pro každý jednotlivý případ vždy znova rozměry onoho vlnoplochy zvlášť přispůsobovati délce BC. Vedle toho každý cítí, že vlastně papírek druhý FC má úlohu zde docela skutečnou, že jde jen o to nalézti napřed C, z něhož by se tečné měly vésti, čímž pak dodatečně délka BC vypadne různě. Každému je jasno, že by věc měla býti naopak, že by délka BC – t. j. isochronní dráha vzduchem – se musila v souhlasu s rozměry vlnoplochy napřed vhodně voliti a dle toho pak teprve bod C stanoviti. Mimo to způsob vyličený oné konstrukce nehodí se dobře k všeobecné formulaci, zejména když vaz optická má polohu jakoukoliv a nepřijde právě do roviny dopadu, v kteréžto případě také papírek mimořádný z těla roviny vystoupí. Konečně pro případ kolmé incidence stává se uvedený způsob konstrukce nepřehledným a není dobře bez bližších úmluv patrno, jak lze potom konstrukci přispůsobiti.

Všechny obtíže odstraníme různě následující jednoduchou modifikací konstrukce: Nakreslíme jednou pro vždy ve vhodných rozměrech jak vlnoplochu pro vzduch – kouli, o poloměru, který jakoby za jednotku můžeme prohlásiti – a pak vlnoplochu pro vápence – (anebo pro krystal jakýkoliv). Rozměry této vlnoplochy jsou úměrný předepsaným hodnotám exponentu lomu jak papírku řádného tak mimořádného.


Při vápenci islandském je na př.

$$n \text{ (vzduch)} = 1 \qquad \frac{1}{n} = 1$$
$$n \text{ ordin} = 1{,}6585, \qquad \frac{1}{n} = 0{,}60295$$
$$n \text{ extraord} = 1{,}4864; \qquad \frac{1}{n} = 0{,}67277.$$

Vezmeme tedy za poloměr koule pro vzduch na př. 50 mm. Pak máme: poloměr koule pro vápence (papírek řádný) $50 \times 0{,}60295 = 30{,}15$ mm, a to jest zároveň malá poloosa rotačního ellipsoidu

Velká jeho poloosa je : 50 x 0,67277 = 33·64 mm.
V těchto rozměrech jsou v obr. 209. tyto vlnoplochy nakresleny.

obr. 209.



Je patrno, že teprve znázornění obou vlnoploch, jak pro vápence tak také pro vzduch podává úplný obraz o lomu vápence, kdežto vlnoplocha vápence samotného bez současné vlnoplochy pro vzduch postrádá svého základu, o který se vlastně opírá.

Dále je s výhodou kresliti tyto vlnoplochy správně, t. j. v rozměrech souhlasných se skutečností — a nikoliv kresliti vůbec nějaký ellipsoid a nějakou kouli — obyčejně v poměrech velmi přehnaných, — čímž vznikne pak ve čtenáři představa o dvojlomu co do stránky quantitativní zcela nesprávná — jakoby divergence paprsku řádného a mimořádného byla velikou. Právě u vápence, tohoto eminentního pro dvojlom materiálu, lze velmi dobře souhlas se skutečností zachovati.

Rudiš nyní dána jakákoliv hraniční plocha vápence a jakýkoliv paprsek dopadající S t. Připojme k bodu t střed vlnoploch a postavme tyto vlnoplochy tak, aby osa optická nastala poloha, jak odpovídá skutečnosti. Za to prodlužme Ct až k průseku D s kouli pro vzduch, v tomto průseku D položíme tečnou rovinu ke kouli, která protne rovinu hraničnou v přímce; touto přímkou položíme pak jiné dvě roviny tečné a sice k vlnoplochám pro vápenec; body dotyku O a E spojme s bodem


dopadu A dávají paprsek řádný a mimořádný ve vápenci.

Pravidlo zde formulované platí zcela všeobecně bez ohledu na zvláštní nějakou polohu osy optické k rovině nákresné.

Probereme nyní některé případy zvláštní.

Obr. 210. objasňuje konstrukci pro případ, když rovina dopadu jest zároveň hlavním řezem (meridianovým) vlnoplochy vápence. Zde padnou paprsky O a E tož do této roviny. Konstrukce celá je rovinná. Bod C značí průsečnici osy tečných rovin, které zde k rovině nákresné je kolmo. Je-li incidence na hraničnou plochu kolná, míhá osa tečných rovin do nekonečna, t. j. tečné roviny stávají se rovnoběžnými

obr. 210.




a sice s rovinou hraničnou, na niž je rovina dopadu (nákresná) kolmo.

Konstrukci objasňuje obr. 211. pro tutéž polohu optické osy jako obr. 210.


Jest pěkně viděti, jak paprsek mimořádný se od kolmého postupu odchýlí stranou.

Obr. 212. ukazuje, jak se konstrukce utváří, když optická osa padne do směru kolmice dopadu.

obr. 211.



Obr. 212.



Když paprsek dopadá též kolmo, není dvojlomu (obr. 212,... 1) - paprsek řádný a mimořádný splývají úplně.

Dopadá-li paprsek šikmo (obr. 212,... 2), jest dvojlom.

Dopadá-li paprsek po rovině (obr 212,... 3), padne C na obvod koule pro vzduch.

Patrně konstrukce dává též naopak ku každému paprsku ve vápenci paprsek příslušný ve vzduchu — modifikací zcela jednoduchou.

Všechny případy totální reflexe paprsku řádného nebo mimořádného lze onou konstrukcí velice jednoduše řešiti.

V obrazcích dosavadních provádíli jsme konstrukci v rovině za pomoci maximálního řezu vlnoploch. Zajímavý případ jest, když přichází k platnosti aequatoreální řez vlnoploch. Případ tento nastane tehda, když osa padne kolmo k rovině dopadu. Řez aequatoreální jest pak soustava tří kruhů, jeden pro vzduch a dva pro vápenec (obr. 213).

Případ tento jest význačný tím, že platí tu pro oba paprsky řádný i mimořádný zákon sinusový (Snellius): pro všechny směry paprsku v rovině dopadu dopadajícího jest sudo lomu nejen paprsku řádného, nýbrž i mimořádného konstantní.

§242. Rychlost paprsku a rychlost vlny.


V případě obyčejného lomu, jaký nastává v isotropickém, jest vlna vycházející z jediného bodu kouli a paprsek lomený jest k vlnoploše kolmý.

Souhlasí tedy směr paprsku se směrem šíření se vlny, a jest tedy rychlost paprsku rovna rychlosti postupující vlny.

Tento jednoduchý vztah neplatí však, jak bylo již upozorněno, pro dvojlom. Konstrukce Huygensova ukazuje, že paprsek mimořádný má jiný směr než jest směr, kterým vlna postupuje.


Jest tudíž nutno stanoviti vztahy mezi rychlostmi postupujících vln řádné a mimořádné a dále mezi rychlostmi paprsků řádného a mimořádného.

Obr. 213.



1.) Pozorujme nejprve rychlosti paprsků (obr. 214).

Obr. 214.



Rychlost paprsku řádného je dána poloměrem koule, rychlost paprsku mimořádného jest dána průvodičem r elipsy. Rovnice její jest

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

značí-li φ úhel průvodiče s opticskou osou,

jest $x = r \sin\varphi$, $y = r\cos\varphi$;

tudíž $$\frac{1}{r^2} = \frac{\sin^2\varphi}{a^2} + \frac{\cos^2\varphi}{b^2}$$

$$\frac{1}{r^2} - \frac{1}{b^2} = \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right)\sin^2\varphi.$$

2.) Pozorujme dále rychlosti vln (obr. 214).

Rychlost vlny řádné je dána opět poloměrem b koule, který je zdroveň normálou; rychlost vlny mimořádné jest dána normálou p.

Rovnice tečné jest:

$$\frac{x\,\xi}{a^2} + \frac{y\,\eta}{b^2} = 1.$$

Značky ξ_0 a η_0 na osách souřadnic jsou:

$$\xi_0 = \frac{a^2}{x}, \qquad \eta_0 = \frac{b^2}{y}.$$

Zavedeme-li úhel ϑ normály p opětně s osou optickou, jest

$$\xi_0 \sin\vartheta = p, \quad \eta_0\cos\vartheta = p.$$

Dosadíce výrazy ξ_0 a η_0 a vynutíce dle rovnice ellipsy souřadnice měnivé x a y, obdržíme

$$1 = \left(\frac{a\sin\vartheta}{p}\right)^2 + \left(\frac{b\cos\vartheta}{p}\right)^2$$

čili $$p^2 = a^2\sin^2\vartheta + b^2\cos^2\vartheta,$$

tudíž $$p^2 - b^2 = (a^2 - b^2)\sin^2\vartheta.$$

Zajímava jest analogická forma obou relací. Co zde je p, a, b, to je tam $\frac{1}{r}, \frac{1}{a}, \frac{1}{b}$.

Rovnice zde odvozené dokázal první Biot, avšak ještě v duchu theorie emanačních, a tudíž ve formě poněkud jiné.

K vyvedeným zde odvozením připojujeme ještě poznámku týkající se pojmu exponentu lomu a sice papršku mimořádného. Exponent lomu pro lom obyčejný zavádí se proto, poněvadž je při jakémkoliv úhlu dopadu veličinou stálou. V tomto smyslu je exponent lomu papršku mimořádného stálým, jen když rovina dopadu jest zároveň řezem aequatoreálním krystalu resp. vlnoplochy. Proto se také obyčejně jen v tomto smyslu mluví o exponentu lomu papršku mimořádného n_e. Znak ten není exponent lomu papršku mimořádného veličinou stálou — t. j. nezávislou

na úhlu dopadu. — Když však by se o něm již mluviti chtělo, nesmí se zaváděti jako poměr $\frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$, kdež by β byl úhel lomu, nýbrž jako poměr rychlostí, jimiž se vlny ve vzduchu = 1 a v krystalu = p, tedy jako poměr $n_e = \frac{1}{p}$, aby definice exponentu v tomto všeobecném významu se zachovala. V tomto smyslu nutno pak říci, že jest vždy $n_e < n_0$, poněvadž je $n_e = \frac{1}{p}$ a $n_0 = \frac{1}{b}$ a $p > b$ vždy.

Kdyby se však definoval

$$n_e = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta},$$


tedy dle úhlu lomu, neplatila by tato věta, poněvadž v skutku může i u vápence papršek mimořádný se lámati silněji než řádný, jakož dále upozorníme.

[* § 243. Důkazy správnosti theorie Huygensovy.

[* Huygens potvrdil svou konstrukci pokusy, ale přesnějších měření vyžadovaly důkazy, že vlnoplocha skládá se skutečně z koule a ellipsoidu rotačního. Takovátato měření theorii Huygensovu úplně ztvrzující provedli později a to Wollaston (1802) a v novějším čase Stokes, Mascart a Glazebrook.

Měření taková mohou hleděti jednak k papršku řádnému, jednak a to zvláště k papršku mimořádnému. Nejjednodušší a velmi přesná methoda ukazující, že jeden z paprsků v krystalu vápencovém sleduje zákony obyčejného lomu bez ohledu na to, jaký je směr papršku dopadajícího vzhledem k přírodním plochám krystalu, spočívá v tom, že sestavíme hranol trojboký z destiček vápence, které jsme v různých směrech (vzhledem k ose optické) z krystalu vyřízli, slepili kanadským balsámem a pak společně v hranol brousili tak, aby roviny hranol omezující byly přesně jednotné (obr. 215.)

obr. 215.



Utvoříme-li tímto hranolem spektrum a zkoumáme-li je spektroskopem, spatříme vedle sebe situovaných spektra mimořádných jediné nijak nezměněné spektrum řádných paprsků. Jest tedy vlnoplocha pro papršek řádný koule jako v látkách isotropických.

Co se dále paprsku mimořádného týče, lze provésti měření, jak následuje.

1) Z vápence vyřízne se hranol, jehož lámavá hrana jest rovnoběžná s opticku osou krystalu. Hlavní řez hranolu jest pak aequatoreálním řezem rotačního plochy, a platí tu konstrukce v obr. 213. znázorněná. Index lomu paprsku jeho řádného, ale i mimořádného jest konstantním pro jakýkoliv úhel dopadu. Jeho hodnota jest minimální v tom smyslu, ve kterém dlužno o exponentu lomu paprsku mimořádného vůbec mluviti, jak dříve upozorněno.


Když se tedy exponent lomu u takovéhoto hranolu známými methodami spektrometrickými stanoví pro různé lámavé úhly hranolu, nutí vyjití vždy hodnota stejná. Tím jest dokázáno, že plocha paprsku mimořádného jest útvarem rotačním.

2.) Měření další provedl již Malus pro ten případ, když optická osa je v rovině dopadu — tak že je tato řezem meridianovým plochou —, ale zároveň v rovině hraničné mezi vzduchem a krystalem (obr. 216).

Tento případ je tím charakteristický, že provedeme-li konstrukci pro jakýkoliv dopadající paprsek, rovnice EOF bodu E a O jest kolmá v rovině hraničné. Následkem toho platí rovnice:

$$\frac{\operatorname{tg}\beta'}{\operatorname{tg}\beta} = \frac{FE}{FO} = \frac{a}{b} = \frac{n_o}{n_e},$$

je-li $ACO = \beta$, $ACE = \beta'$.



Již tedy vidíme, že paprsek mimořádný sílu již nejen řádný. Též souvisí s jistou větou všeobecnou povahy geometrické (obr. 217).


Tečná k ellipse má rovnici:

$$\frac{x\xi}{a^2} + \frac{y\eta}{b^2} = 1$$

Úsek η_o pro $\xi = 0$ jest:


$$\eta_o = \frac{b^2}{y},$$

není tedy závislý na ose a, nýbrž jen na ose b a pořadnici y.



Máme-li tedy soustavu tečen o b, ale různých os a (mezi nimi třeba i kruh pro $a = b$) a volíme-li η_o určité — t. j. vedeme-li tečné z určitého bodu na ose pořadnic, je y pro všechny body dotykové na všech oněch ellipsách totéž, t. j. body dotykové leží všechny na přímce kolmé k ose pořadnic.

Vztah tento experimentálně zjistil Malus následovně. Na desku ocelovou vyryl dvě úsečky AC a CB rozdělené ve stejné díly a skloněné k sobě pod malým úhlem ACB. Silnou desku krystalu opřízmatou rovnoběžně s osou optickou položil na úsečku a pozoroval dalekohledem DE, který bylo bylo možno otáčeti kol osy horizontální a který byl opatřen dělenými kruhem vertikálním. Destička ocelová s úsečkami a krystal jsou umístěny na horizontálním kruhu dělením, na němž nutno bylo stáčeny.



Krystalem vidíme dva obrazy obou úsečk asi tak, jak je to naznačeno na obr. 218. Tyto obrazy jsou tak položeny, že úsečka CB protíná se úsečkou AC, že vrcholy tedy společný bod obou obrazů v d. Jest tedy bod d obraz jistého bodu H úsečky AC a zároveň jistého bodu G úsečky BC. Bod H může na obou úsečkách dalekohledu DE býti odečten, vzdálenost HG pak změřena pásmem na zvl.

Je-li e tloušťka krystalu, pak

$$GH = GK - HK - e(\operatorname{tg}\beta' - \operatorname{tg}\beta),$$


kde β' a β značí úhly lomu. V této rovnici je však $\operatorname{tg}\beta$ známo, neboť úhel dopadu lze na vertikálním kruhu dalekohledu odečísti a jest $\sin\alpha = n_0 \sin\beta$; β lze pak z hořejší rovnice počísti. Tato hodnota β' musí souhlasiti s hodnotou vypočtenou dle rovnice

$$\frac{\operatorname{tg}\beta'}{\operatorname{tg}\beta} = \frac{n_0}{n_2},$$

což a také skutečně ukázalo. Čím však dokázal Malus, že řez obrysloxy papírku mimořádného ozou opticky vedený jest ellipsa, tudíž oba že jest sférickým, jelikož poloosy jsou a a b.

2) Další zvláštní případ, kterýž lze rovněž kontrolovati měřením, jest ten, kdy optická osa výbrusu jest kolmá dopadu (obr. 219).

Obr. 219.



Řez obrysloxy, povinou dopadu jest pak rovněž řez meridianový, při čemž se ellipsa a kruh dělí povinou hraničnou symmetricky.

Dopadá-li papírek pod úhlem α, láme se mimořádný do směru AE; úhel lomu $OAE = \beta_e$. Opíšeme kolem A kruh poloměru a a vedeme k němu tečnu EL a jmenujme úhel $OAL = \gamma$.

Dle geometrické věty o předešlém odstavci uvedené leží pak body L a E na kružnici $LE \perp AE$, a platí tudíž

$$\frac{\operatorname{tg}\beta_e}{\operatorname{tg}\gamma} = \frac{LP}{EP} = \frac{a}{b};$$

vedle toho však jest: $\dfrac{\sin\alpha}{\sin\gamma} = \dfrac{1}{a}$ dle obyčejného zákona lomu.

Máme tudíž: $\sin\gamma = a\sin\alpha$, $\cos\gamma = \sqrt{1 - a^2\sin^2\alpha}$, $\operatorname{tg}\gamma = \dfrac{a\sin\alpha}{\sqrt{1-a^2\sin^2\alpha}}$;

tudíž dle $\operatorname{tg}\beta_e = \frac{a}{b}\cdot\operatorname{tg}\gamma$

konečně $\operatorname{tg}\beta_e = \dfrac{a^2\sin\alpha}{b\sqrt{1-a^2\sin^2\alpha}}$.

Poněvadž pak jest $\frac{1}{a} = n_e$, $\frac{1}{b} = n_0$, obdržíme též

$$\operatorname{tg}\beta_e = \frac{n_0\sin\alpha}{n_e\sqrt{n_e^2 - \sin^2\alpha}}.$$

Jest tedy viděti, že ku každému úhlu α dopadu můžeme v tomto případě zvláštním velmi jednoduše napřed úhel lomu β_e papírku mimořádného počísti a pak výsledek pozorování s počtem srovnávati. *)

§ 244. Jednoosé krystaly positivní a negativní

Vápenec islandský, na němž úkaz dvojlomu byl objeven, jest representantem celé série jednoosých krystalů tím charakterisovaných, že jest při nich

$$a > b \quad \text{čili} \quad \frac{1}{a} < \frac{1}{b}, \quad \text{t. j. } n_e < n_0.$$

Papírek mimořádný se tedy v equatoreálném řezu — kde dráhy papírku řádného a mimořádného jsou největší — láme méně než řádný, tedy jakoby byl od kolmice dopadu „odpuzován". Proto se tyto krystaly zovou repulsivní anebo též negativní, poněvadž jest

$$n_e - n_0 - \ldots$$


V přírodě vyskytují se však též krystaly, u nichž věc se má naopak a jichž hlavním a důležitým representantem jest křemen.

U těchto je tedy $a < b$,


$\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$, t. j. $n_e > n_0$. (Obr. 220.)

Krystaly zovou se opticky attraktivní čili positivní.

Řez meridianový



Řez equatoreální



Obr. 220.

1.° Pojmenování „attraktivní" a „repulsivní" jest utvořeno

na základě tlumení <u>znamenání</u> světla, při níž se <u>lom</u> paprsků ku kolmici vzpěrtoval <u>attrakcí ústředí</u> na částečky světelné.

Co se speciálně <u>křemene</u> týče, dlužno poznamenati následující.
Křemen byl by jakožto dvojlomný materiál velice cenným vzhledem k své průhlednosti, čistotě, tvrdosti, jakož i vzhledem k tomu, že se dosti hojně v přírodě jako krystal nalézá; avšak jeho <u>dvojlomnost</u> je proti vápenci <u>velmi malá</u>. Jest totiž

(viz článek 2)

n vzduch	= 1	$\frac{1}{n}$	= 1
n ord	= 1,5442	$\frac{1}{n_o}$	= 0,64758
n extraord	= 1,5533	$\frac{1}{n_e}$	= 0,64379.

Kdybychom si tedy vlnoplochu krystalu v těchž poměrech chtěli znázorniti jako vlnoplochu vápence, volice opět poloměr koule pro vzduch = 50 mm, vypadly by poloosy ellipsy

$50 \times 0{,}64758 = 32{,}38 = b$
$50 \times 0{,}64379 = 32{,}19 = a,$

kdežto u vápence bylo

$30{,}15 = b$
$33{,}64 = a.$

Rozdíl a-b byl tedy u vápence 3,49 mm, t. j. 10,4% hodnoty pro a, kdežto u krystalu jest rozdíl a-b = −0,19 mm, t. j. pouze 0,6%. — Proto by ona ellipsa s poloosami 32,19 a 32,38 sotva byla jakožto ellipsa patrubce.

Dvojlomnost krystalu jest tedy <u>velmi malá</u>. S tím souvisí úkaz následující:
Když zhotovíme jak z vápence tak z krystalu <u>hranol</u> (na př. 60° lámavého úhlu), jehož lámavá hrana jest rovnoběžná s opticknou osou, čili jehož hlavní řez je <u>asymmetrickým</u> řezem vlnoploch — kdy tedy dvojlom je nejpřehlednějším, — a když na příklad světlem slunečním zjednáme sobě <u>spektra</u> při minimální úchylce řádných paprsků, jsou obě spektra vápence od sebe <u>velmi daleko</u>, kdežto spektra krystalu již <u>částečně padnou na sebe</u> tak že část pásma řádného se mísí s částí červeného mimořádného spektra, kteréž jest nechtěno více. To je příčinou, proč se krystalu k účelům polarisace jen <u>málo</u> užívá — přes jeho jinak vynikající vlastnosti —, kdežto <u>vápence</u> se užívá mnoho, a užívalo by se ještě <u>daleko více</u>, kdyby zásoby přírodní nebyly již téměř vyčerpány. Alespoň <u>velké</u> kusy vápence jsou velmi <u>vzácné</u> a proto mají také velkou cenu.

Za zvláštní příklady jednoosých krystalů <u>negativních</u> (jako vápenec) a <u>positivních</u> (jako křemen) uvádíme následující:

—	+
vápenec,	beryll	křemen
turmalín,	apatit	led
korund,	idocras	dioptas
safír,	dvůčinan podnatý	zinan zhaselnatý
rubín,	chlorastroucium	
smaragd,	chlorcalcium	atd.

a j.

§ 245. Polarisátory a analysátory na základě dvojlomu.

Polarisace <u>dvojlomem</u> je dokonalá. Proto se krystaly dvojlomné hodí <u>nejlépe</u> za polarisátory a tím i za analysátory.


Má-li světlo zůstati <u>bílé</u>, musí krystal — nejlépe vápenec — býti <u>omezen</u> plochami <u>rovnoběžnými</u>. Dopadá-li pak otvorem na př. kulatým úzkého průřezu světlo bílé na takovou desku dvojlomného krystalu, vychází z pravidla <u>rozděleně</u> v paprsky řádné a mimořádné, kteréž pokračují <u>vedle sebe rovnoběžně</u>. Avšak jakmile průřez otvoru se stává jen poněkud větší, již se — i při dosti značné tloušťce desky — tyto dva svazky paprsků částečně <u>kryjí</u>. Proto se <u>v tomto způsobu</u> nedá ničeho docíliti pro účel polarisace; pole by bylo velice malé.

Jde tedy o to <u>jedno</u> světlo <u>podržeti</u> a <u>druhé</u> buď válec odraziti (totálním odrazem) anebo tak nahýbiti, aby divergence značně vzrostla — ale aby při tom světlo, jež podržeti chceme, zůstalo bílé (achromatisovaný hranol). Tak vznikají polarisátory, o nichž v následujících §§ obšírněji pojednáme.

§ 246. Hranol Nikolův.

Z vápence dvojlomného odštípne se krystal, jehož délka jest asi třikrát větší než šířka (A A' asi 3 × A D). Na místě ploch A B b 2 a A' B' b' D, jež svírají s hranou D B' úhel 71°, přibrousí se nové plochy s úhlem jen 68°, tedy plochy

k této hraně šikmeji položené (obr. 221).



obr. 221.

Index lomu balsámu kanadského je větší než index vápence a menší než index lomu papsku řádného. Na rozhraní balsámu papsek mimořádný vždy tedy projde, papsek řádný však — je-li dostatečně skloněn — totálně se odráží, přicházeje z prostředí opticky hustšího do prostředí řidšího. Vystupuje tedy z hranolu Nikolova pouze papsek mimořádný a jest tudíž světlo vystupující polarisováno v rovině kolmé k hlavnímu řezu (rovnoběžné s makrodiagonalou). Kritický úhel dopadu pro totální papsek řádný lze počítati z indexů lomu 1,65 pro papsek řádný v krystalu,
1,55 pro kanadský balsám.
Jest tedy $\frac{1,55}{1,65} = 0,939$ a proto sinus úhlu dopadu pro totální reflexi musí míti tuto hodnotu míniti. Je-li tedy úhel dopadu papsku řádného na rozhraní balsámu roven neb větší než 69° 30', pak nastane vždy reflexe totální.

Hranol Nikolův náleží k nejdůležitějším polarisátorům a analysátorům a tvoří hlavní součástku polarisačních apparátů. Bohužel že hranoly velikého průřezu jsou velmi vzácné a drahé — tak že nutno přestati na menších, jež však dávají jen malé pole.

Nikol byl učitelem fysiky v Edinburghu (* 1768, † 1851). Sestrojení jeho hranolu padá do roku 1828.

§247. Hranol Foucaultův.

Kanadský balsám v hranolu Nikolově může býti nahrazen jakýmkoliv

ústředím, jehož index lomu je menší než vápence pro jeden neb oba papsky. Jest patrno, čím je menší index lomu látky spojující obě části hranolu, tím že je menší úhel kritický a tím že může býti kratší celý hranol při dané šířce. Proto Foucault oddělil obě části hranolu vzduchem. Kritické úhly pro papsek řádný a mimořádný jsou 37° 14' a 42° 23'. Leží-li velikost úhlu dopadu na rozhraní vzduchovém mezi těmito hodnotami, pak papsek řádný se odráží totálně, papsek mimořádný pak vychází z hranolu. Hranol Foucaultův je proměrně krátký — tedy proměrně lacinější než Nikolův, avšak má tu vadu, že ztrácí vzduchová mnohá světla odrazy.


Jiné modifikace hranolu Nikolova udali Hartmack a Ramovski, u nichž konečné plochy jsou kolmé ke směru papsků dopadajících a kde užívají lněného oleje ve místě balsámu kanadského. Tohoto nikolu užívá se mnoho u mikroskopů.

§248. Achromatisovaný hranol vápencový.

Budiž dán hranol vápencový, jehož lámavá hrana je rovnoběžná s osou optickou a jehož hlavní řez jest obdélníkovitým řezem krystalu a sice formy trojbokého pravoúhlého s malým úhlem lámavým.

Dopadá-li bílý papsek na právě obdélníkovou plochu hranolu kolmo, postupuje dále týmž směrem, ale v krystalu rozdělí se papsek řádný a mimořádný, kteréž různou rychlostí se šíří (obr. 222. a).

obr. 222
Achromatis. hranol vápencový



Při přechodu do vzduchu lámou a rozptylují se papsek řádný a mimořádný různě. Z těchto dvou papsků bere jeden a sice mimořádný (různě) do původního směru a achromatisovaný a sice sklenný má totiž barnové sklo-
vinu lámavou tuto lámavost a rozptýlenost jako mimořádný papsek vápencový.

Tím vzniká kombinace obr. 222, b. Paprsek řádný však má ještě plus lámavosti a rozptylnosti a proto se při přechodu na rovinu podpovrovou láme a rozptyluje a pak ještě jednou při vystupu z hranolu do vzduchu. Experimentuje se pak se svazkem rovnoběžných paprsků c.

Svazek nchýlených a spektrálně rozložených paprsků o se diafragmatem zachytí. Kombinace obou hranolů zove se pak achromatisovaný hranol vápencový.


Již dá se též obrátiti (obr. 222, c).

V hranolu skleněném postupuje pak světlo při kolmé incidenci bez lomu až k hraniční rovině podpovrové. Zde se děje rozklad světla na paprsek řádný a mimořádný. Poslední vchází do ústředí téže lámavosti a rozptylnosti, jde tedy přímo a nerozložené dále, kdežto řádný vchází do ústředí lámavějšího a rozptylnějšího, tudíž se láme ke kolmici a vychází pak do vzduchu s jistou divergencí proti paprsku mimořádnému rozložen.

K obrazci 222, a) je připojena v obr. 223 konstrukce dle známých pravidel.

§249. Hranol Rochonův.

obr. 223.




Achromasie docílená v kombinaci obr. 222, c) jest jen přibližná - neboť jen přibližně je lámavost a rozptylnost skla korunového stejná jako pro paprsek mimořádný u vápence.

Dokonale lze však achromasie docílmouti kombinováním dvou hranolů z téhož materiálu, tedy na př. vápencových (nebo také křišťálových), ale opticky orientovaných, tak že hlavní řez jest u jednoho hranolu meridiánovým, u druhého rovníkovým, při čemž směr osy optické v řezu meridiánovém jest volen

souhlasně se směrem paprsků kolmo dopadajících.

obr. 224



V jiném hranolu (obr. 224.) šíří se tedy světlo ve směru optické osy jako sklem (v obr. 222, c) t. j. nerozloženo s rychlostí odpovídající exponentu lomu n_o paprsku řádného.

Na hraniční rovině podpovrové nastává rozdělení světla v paprsek řádný a mimořádný.


Řádný — přecházeje do ústředí opticky stejného postupuje dále bez lomu a bez rozkladu a vychází z hranolu s původním směrem dokonale polarisován.

Mimořádný však přechází do ústředí opticky jiného, exponentem n_e, tudíž se láme od kolmice a rozkládá. Lom se dá snadno quantitativně určiti.

Jest totiž (obr. 225.)

$$\frac{\sin(\varphi+\varepsilon)}{\sin\varphi} = \frac{n_o}{n_e}, \qquad \frac{\sin\varepsilon}{\sin\delta} = \frac{1}{n_e}.$$

obr. 225.



Z toho,

$$\cos\varepsilon + \cot\varphi \cdot \sin\varepsilon = \frac{n_o}{n_e}.$$

Položíme-li přibližně $\cos\varepsilon = 1$ a zvedeme-li za $\sin\varepsilon$ výraz $\frac{\sin\delta}{n_e}$, obdržíme ihned

$$\sin\delta = (n_o - n_e)\operatorname{tg}\varphi.$$

Pro světlo natrové jest na př:

$n_o = 1{,}6585$
$n_e = 1{,}4864$ } Difference = 0,1721.

Je-li tedy na př. $\varphi = 30°$, vychází

$\delta = 5° 42{,}1.$

Kdybychom měli vápence nebo křišťálu, obrátili bychom jeho exponent lomu (δ vyjde negativní), ale divergence vyjadřuje značně menší, neboť zde jest zpět pro světlo natrové

$n_o = 1{,}5482$
$n_e = 1{,}5533$ } Difference = 0,0051.

atd. atd.

Pro týž úhel $\varphi = 30°$ vychází zde $\delta = -0° 18' 06''$,

tedy dalekonesný.

Tak je z výkladu viděti, souhlasí celkem hranol Rochonův s hranolem wi-perecovým, jenž jest sklem achromatisovaným co do mějitelnosti. Rozdíl jest však v tom, že rovina polarisovaných paprsků plných vycházejících je u tohoto rovina obou paprsků, (k níž tedy jsou vibrace kolmé), kdežto u Rochonově je tato rovina mezipak rovinou vibrací paprsků plných vycházejících.

Dvojlom v krystalech dvojosých.

§250. Přehled soustav krystalických.

K orientaci o postředění krystalu v směru opticken budiž zde uveden přehled soustav krystalických. Jsou následující:

1, Krychlová (čtverec - krychle, což zase přichází z řeckého τετρα-, ότι, τετρακις, čti, čtyři) též regulární neb isometrická. 3 osy k sobě kolmé stejné.

Krystaly této soustavy nemají dvojlomu.

Následující dvě soustavy tím charakteristické, že jeden směr - osa krystalu - vyniká, kolem něhož vlastnosti krystalu jsou na půl stejné. Onen směr je též osou opticken.

Ostatní osy krystalografické jsou pak:

buď dvě, stejné k sobě kolmé +

nebo tři, " " stejně skloněné ×.

Dle toho známe soustavy:

2, tetragonální (též quadratickou) (čtvercová)

3, hexagonální (šestercová).

Vhodné označení je též: mono-li-metrická a mono-tri-metrická -.

Krystaly těchto dvou soustav jsou opticky jednosé.

Následující tři soustavy, u nichž není oné stejnosti na půl k jisté ose

jsou to soustavy:

4.) ortho-rhombická (přímokosočtverečná)

5.) klino-rhombická (šikmokosočtverečná)

6.) klino rhomboidická (šikmokosodélníková).

Z těchto je ještě nejpravidelnější soustava orthorhombická, jež se charakterisuje tříosí na sobě kolmými osami - ale nestejné délky.

Soustava klinorhombická vznikne pak skloněním jedné osy kolem druhé šikmo ke třetí. Zůstávají tedy zde dvě osy na sobě kolmo, a třetí jest k rovině obou druhých šikmo, ale při tom k jedné z nich kolmo.

Soustava klinorhomboidická má tři osy nestejné a k sobě šikmé.

Soustavy 5) a 6) se jsou též monoklinická a triklinická, poněvadž u 5) jest jsou jeden šikmý úhel mezi osami, u 6) však tři (všechny) šikmé úhly.

Jest zajímavo, že všechny tyto tři soustavy opticky se chovají stejně. Soustava orthorombická vede přirozeně k tomu předpokládati, že na př. elasticita etherou je zde ve třech na sobě kolmých směrech různočinou - neboť to jsou také směry krystalografických os. Že zajímavo, že vše také u obou posledních - klinických - soustav týž předpoklad se dá učiniti. U monoklinické jsou aspoň dva k sobě kolmé směry krystalograficky různočinní - ale u triklinické nejsou - a přece i zde vede týž předpoklad k důsledkům, jež se skutečností souhlasí.

§251. Všeobecné orientační poznámky o dvojlomu u krystalů dvojosých.

K předběžné orientaci lze všeobecně rozdíl dvojlomu u krystalů jednosých a dvojosých takto naznačiti.

U krystalů dvojosých není žádného žádného paprsku. Jsou tedy oba paprsky, jež dvojlomem vznikají mimořádnými - neřídíce se - všeobecně - zákonem Snellovým, tak že oba mohou z roviny dopadu vystoupiti.

Jsou pro jistě tři roviny dopadu jdí se jeden z obou zákonem Snellovým - tak že jen pro tyto tři roviny lze mluviti o exponentu lomu. Máme tudíž u

krystalů dvojosých *tři* exponenty lomu vyznačené, jež se zovou *hlavními*.

Pojmenování *dvojosé* pochází pochází odtud, že v těchto krystalu existují dva směry, jimiž paprsky při kolmé incidenci procházejí bez dvojlomu *nepolarisovaně*. Ale i zde jsou zvláštnosti důležité, že totiž dopadající paprsek světelný *neroztává jednotlivý*, nýbrž rozkládá se v krystalu v kužel a vychází ve válci (kuželová refrakce vnitřní).

§252. Postup historický.

Jest zajímavo pozorovati postup v rozvoji *theorie* dvojlomu u krystalů jednoosých a dvojosých. Huygens *uhodl* jsmu vlnoplochy u vápence, a když hledal, že na základě jejím lze úkazy dvojlomu vyložiti, hledě poněkud učiniti svůj předpoklad *pochopitelným* tím, že vykládal *krystalickou strukturou* vápence jakoby byla analogickou stavbě valných ellipsoidů na sebe nakupených. *Vápenec* byl při tom jediným krystalem, u něhož dvojlom byl znám; později objevil Huygens dvojlom *křemene*. Oba tyto krystaly znětaly – až do počátku našeho století – jedinými známými, při nichž dvojlom se jevil.

Počátkem století našeho zabýval se dvojlomem *Wollaston* a později *Malus*, objevitel polarisace světla odrazem, dále *Biot*, jenž již – v duchu theorie emanační – rozeznával krystaly *attraktivní* a *repulsivní*, a *Arago*, objevitel polarisace chromatické. Právě tento *objevem*, kterým se dvojlomnost i velice slabá citlivě – zabarvením dvojčatých krystalové – dá konstatovati, ukázalo se, že je počet látek dvojlomných velmi veliký.

Brewster zkoumal 150 krystalů a učinil důležitý objev, že krystaly *soustavy hexagonální* a tetragonální mají *optickou osu jedinou*, krystaly ostatních soustav však že mají osy tři*tři dvě* (1818). Pro krystaly jednoosé byla dráha dvojlomem *sférickým* dle *Huygense* jeho pokračovatelem, pokud se týče krystalů dvojosých, dal *Young*, jak tím, že předpokládal vlnoplochy *longitudinální*, tak tím, že hledal rozšíření vlnoplochy Huygensovy koule a *otáčecího ellipsoidu* na kouli a *trojosý ellipsoid* – tak že předpokládal, jakoby i u krystalů dvojosých existoval vždy *jeden paprsek řádný* a vedle něho jeden mimořádný.

Při tom učil myšlenku, že pružnost etheru v různých směrech jest různou.

Fresnel opravil především omyl *Youngův*, že by i u krystalů dvojosých existoval vždy paprsek řádný; oba paprsky jsou zde výlučně mimořádnými. Koule jakožto část vlnoplochy stala se tím nemožnou. Fresnel pojal dále myšlenku myšlenku o *transversalité* kmitů světelných a rozřešil bonečně s úspěchem geometrickým úlohu stanoviti *lom* světla v krystalech dvojosých. Příslušný jeho spis má název: Mémoire sur la double refraction. Byl předložen akademii francouzské r. 1822, byl vyznamenán, ale vyšel v *III.* svazku mémoirů akademie téhož r. 1827. (Také v Annalech Poggendorffových, sv. *XXIII*, 1831).

Zajímavo je při tom, jak Verdet poznamenává, že také *Fresnel* jako *Huygens* důvtipem svým *uhodl*, jaká by asi mohla býti vlnoplocha. Vychází tak z těch spisů jeho, jež byly publikovány až později v jeho spisech sebraných. Postup Fresnelův byl tedy *indukcí*; zkoušel experimentem, zda-li jistá plocha vyhovuje. Poněvadž u krystalů jednoosých koule a ellipsoid otáčení činí *dohromady* jakoby plochu stupně *čtvrtého*, a poněvadž případ krystalů jednoosých umíl se všeobecným případě krystalů jednoosých býti jako speciální obsažen, *předpokládal* Fresnel, že vlnoplocha u krystalů dvojosých jest též stupně *čtvrtého*. Symmetrie plochy vůči třem na sobě kolmým rovinám – rovinám souřadným – byla a priori zřejmá. Z řečených těmito rovinami vzniklých dal se nejlépe předpokládat skutečnost promítati. Řezy tyto jeví se velmi jednoduchými. Zbývá když jsou koefficienty rovnice vlnoplochy tímto promítáním stanovil, a když se jí ukazovalo, že vna vlnoplocha vyhovuje, *hledal* po ní *odvození mechanické* dostatečně – zcela jako Huygens.

*§253. Základy theorie Fresnelovy.

[* Hledaje toto odvození vyšel Fresnel od myšlenky Youngovy, že elasticita etheru v krystalických látkách pro různé směry je různou. Myšlenku tuto aplikoval pro kmity *transversální*. Výjmutím částečky etherové z rovnovážné polohy vznikne síla, kterou se částečka přivádí do rovnovážné polohy zpět. Že tato síla při výjmutí jednotkovém závisí *elasticitu*. Je-li síla tato větší, resp.

vibrace, jež se šíří větší rychlostí, podobně jako v akustice, když je struna silněji napjata, vznikají vibrace, jež rychleji strunou postupují; jako je zde rychlost postupu (viz Akustika § 32) přímo úměrnou kořenu z elasticity, tak předpokládal Fresnel podobný vztah i pro vibrace étherové. Jest tedy:

$$v = \text{const.}\sqrt{\text{Elasticita.}}$$

Je-li elasticita určena jen směrem výjmutí, tedy kmitosměrem, pak všechny vlny rovinné, polarisované v téže rovině — dle Fresnela kolmé na kmitosměr — postupují stejnou rychlostí, třebas by směr tohoto postupu byl různý. *]

* § 254. Pokračování. Ellipsoid pružnosti.

[* Důležito je však uvážiti, jaký je směr síly při výjmutí částice étherové z polohy rovnovážné vznikající.

U éthera v látkách isotropických jest tento směr vždy protivný výjmutí samému. Působí tedy zde síla vždy přímo proti výjmutí.

Ve hmotách krystalisovaných všeobecně tomu není tak. Směr zpětné síly není vždy protivný směru výjmutí (obr. 226), nýbrž může s ním tvořiti jistý úhel.

Jenom ve třech ze sebe kolmých směrech v krystalu celá síla přímo proti výjmutí.

Tyto směry jsou základní směry pružnosti. Jejich roviny jsou rovněž základními a jsou zároveň jinak pro poměry pružnosti étherové rovinami symmetrie.

V následujícím volíme onyi směry za osy a onyi roviny za roviny souřadnic.


Fresnel dokazuje dále, jak lze velmi názorně se orientovati o vzájemnosti mezi směrem výjmutí a mezi směrem síly výjmutím vzbuzené.

obr. 226.

Sestrojme trojosý ellipsoid, jehož poloosy padnou do směrů základních směrů a jichž délky jsou obrácené úměrný kořenu z úměrů sil s výjmutím protisměrných. Vedeme-li v tomto ellipsoidu libovolný průvodič k nějakému bodu na povrchu jeho, značí normála povrchová v tomto bodu směr síly výjmutím v délku průvodiče vzbuzené. Ellipsoid tento, — jehož povrch jest tedy v každém bodě kolmý k působivé síle — jest analogon ploch aequipotenciálních a nese proto ellipsoidem stejné práce, také ellipsoidem pružnosti.

Budiž na př. elasticita étherem ve směru OX maximum, ve směru OZ minimum a ve směru OY jakási hodnoty střední. Pak má ellipsoid stejné práce formu, asi jak obr. 227 znázorňuje. Poloosa ve směru OX je pak minimální, ve směru OZ maximální, ve směru OY má jakousi hodnotu střední. *]

obr. 227.



* § 255. Pokračování. Kmity „stabilní."

[* Vzbudí-li se výjmutím částičky étherové z polohy rovnovážné síla, jež jest tomuto výjmutí protisměrná, vznikají kmity tak zvané stabilní.

V tomto smyslu vznikají stabilní kmity v krystalech při výjmutí částečky étherové ve směru jedné z hlavních os pružnosti čili ve směru některé poloosy onoho ellipsoidu stejné práce.

Položme nyní rovinu libovolnou středem onoho ellipsoidu, kteráž jej protíná v ellipse (obr. 227.) — Výjměme pak částečku étherovou ve směru nějakého průvodiče této ellipsy. Vzniká síla, jejíž směr udává normála ellipsoidu v koncovém bodě tohoto do roviny ellipsy. Průmět bude normálou ellipsy a bude tudíž všeobecně tvořiti úhel s průvodičem — ale ve dvou směrech padne výjmutí do průvodiče samého. Jsou to směry poloos této

ellipsy. Kmity, které tudíž padnou do směru poloos této ellipsy, budou „stabilními" v širším slova smyslu.

Je-li rovinná vlna krystalem a položíme-li onen řez rovnoběžně s touto vlnou, rozloží se veškeré transversální kmity do těchto dvou směrů, které jsou dány hlavními osami příslušné ellipsy s ellipsoidem stejné práce. Délky poloos jsou při tom obráceně úměrny bořeckým rychlostem, s jakými se vlny při této transversální vlnách šíří, dle rovnice:

$$v = \text{const.} \sqrt{\text{síla}}.$$

Jsou-li dle toho a, b, c rychlosti stejné práce, vynikají dva, jež jsou vedeny osou OY souměrně k rovině YZ a jež se spacielně stávají kruhovými. Tento případ je proto výjimečný, singulární, poněvadž zde vždy normála ellipsy splyne s průvodičem. Zde tedy nemotorné rozklad kmitových vibrací do dvou k sobě kolmých směrů (vibrací „stabilních") – nemotorné tedy také polarisace popsaná, nemotorné dvojlom.

Tyto kruhové řezy odpovídají dvěma kolmým směrům postupu rovinné vlny, kteréžto směry rovněž osami krystalu. Že patrno, že existují jen tabové směry dva. *)

[*§256. Ellipsoid druhý (reciproký).


[* Při ellipsoidu stejné práce nabývají reciproké hodnoty poloos elliptického řezu rychlosti, s jakými se v daném směru rovinné vlny těchto transversálních vibrací šíří.

Aby nebylo třeba vždy k reciprokým hodnotám přihlížeti, zavádí se druhý ellipsoid, jenž jako celek k onomu plochou je reciproký, jehož rovnice tedy jest:

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1.$$

Z tohoto ellipsoidu (obr. 228.), při němž jako dříve je $a > b > c$, odvozuje vlastní vlnoplochu následovně:

obr. 228.



Budiž dána rovinná vlna

Vedme středem druhého ellipsoidu rovinný řez s touto vlnou rovnoběžně.

Obdržíme ellipsu. Její poloosy nabývají směrem svým kmitosměr oněch dvou rovinných vln, v jaké se daná vlna rozloží.

Délkové osy pak nabývají přímo rychlosti postupu. Tyto rychlosti naneseme na přímce k řeze kolmé. Konečné dva body přísluší vlnoplose hledané. Geometrické místo všech těchto konečných bodů pro rozmanité polohy dané rovinné vlny je vlnoplocha krystalu vlnové.

Poznamenání.

Oba zde uvedené ellipsoidy tvarové, jež pro theorii dvojlomu mají základní význam a jež jsou vzpolek reciproké, bývají označovány různými jmény.

1.) Ellipsoid první, jehož rovnice jest

$$a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2 = 1,$$

zove se ellipsoid pružnosti (Kirchhoff), stejné práce (Stefan), indexový (Mac Cullagh) neb Indicatrix (Fletcher). Vzhledem k tomu, že jeho poloosy jsou $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$, což nic jiného není než relativní hlavní indexy lomu n_1, n_2, n_3, je pojmenování ellipsoid indexový nejvýznačnější, poněvadž přímo upomíná na indexy (exponenty) lomu.

2.) Druhý, reciproký ellipsoid, jehož rovnice jest

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1,$$

má za poloosy a, b, c, tedy rychlosti; proto jest podobně označení ellipsoid rychlostní nejvýznačnější; ale i zde užívá se často pojmenování ellipsoid pružnosti", což vzhledem mate, ačkoliv je zde pojmenování toto spíše na místě. Pojmenování „ellipsoid první a druhý" užívá se poměrně zřídka. Billet a Verdet označují ellipsoid indexový za první, naopak Plücker. *)

§257. Rovnice plnoplochy. Rozbor.

[* Převedl odvození rovnici plnoplochy analyticky cestou dříve naznačenou. Přichází k rovnici následující:

$$\frac{a^2x^2}{r^2-a^2}+\frac{b^2y^2}{r^2-b^2}+\frac{c^2z^2}{r^2-c^2}=0$$

$$r^2=x^2+y^2+z^2.$$

Význam konstant a, b, c byl již dříve uveden.

Jsouc pohled na rovnici plnoplochy poučuje o tom, že osy souřadnic jsou rovnými průměrovými plnoplochy, řešil změnou znamének souřadnic x, y, z rovnice zůstává stejnou.

Dále je patrno, že souřadnice jednotlivé vstupují do rovnice ve stejném způsobu – tak že lze x, y, z mezi sebou libovolně vyměnit – tvar rovnice se tím nezmění. Proto musí také řezy, jež vznikají rovinami souřadnic býti vesměs stejného způsobu a jejich poměry se mohou lišiti, poněvadž do nich vstupují veličiny a, b, c.

Řezy tyto, jež zmíněné z nich hlavními jsou kruh a ellipsa a sice:

pro x = 0 kruh poloměru a, ellipsa poloos b, c,
„ y = 0 „ „ „ b, „ „ c, a,
„ z = 0 „ „ „ c, „ „ a, b.

Výsledek jest tedy pro všechny osy souřadnic identický.

Ke tvaru tak jest, poznáme, když položíme do rovnice plnoplochy na př. x = 0. Takovou cyklickou záměnou pak obdržíme ihned výsledky pro y = 0 a z = 0.

Řezy rovnicí hnízdí se k tvarovým speciálním případům méně méně, čím více zvolíte místo souřadnice x, y, z s tím stejnou formu rovnice plnoplochy zachováte.

Ustavíme-li množství zbytku, plyne z rovnice vzhledem k r kruhu středního, a sice (se znaky) r = b kruh. Tím jsou pak:

$$(x^2+y^2+z^2)(a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2)-a^2(b^2+c^2)x^2-b^2(c^2+a^2)y^2-c^2(a^2+b^2)z^2+a^2b^2c^2=0.$$

Položíme-li zde x = 0, obdržíme výraz, který se dá jako součin dvou faktorů vyjádřiti:

$$(y^2+z^2-a^2)(b^2y^2+c^2z^2-b^2c^2)=0,$$


což dává soustavu křivek:


$y^2+z^2=a^2$ . . . kruh poloměru a
$b^2y^2+c^2z^2=b^2c^2$ . . . ellipsa poloos b, c.


Pro ostatní roviny souřadné obdržíme cyklickou záměnou týž výsledek. Rozdíly vynikou různými hodnotami konstant a, b, c.

Budiž na př. a > b > c. Pak jest patrno, že kruh poloměru a obejímá celou ellipsu poloos b, c, naproti tomu nacpatá kruh poloměru c, že jest uvnitř ellipsy poloos a, b. Přechodní případ – a theoreticky nejzajímavější – nastane při kruhu poloměru středního b, který protíná ellipsu ve 4 bodech.

Tyto řezy rovinami souřadnic jsou znázorněny v obr. 229, 230, 231. jednotlivě, a v obr. 232. perspektivně kresleném pohromadě, ovšem jen v jediném oktantu. Aby zde rozdíl mezi kruhem a ellipsou – který výkresem









(perspektivním) nevyniká – lépe byl viděn, jest vždy ellipsa tuselem tečkovaně. Jest pěkně viděti souvislost křivek

Obr. 232.



—— kružnice a, b, c
---- ellipsy (bc), (ca), (ab)

Obr. 233.



Budiž poznamenáno, že rozdíly mezi konstantami a, b, c jsou – proti poměrům skutečným – velice přehnány – aby právě lépe vynikly. Pro názornější studium vlnoplochy lze nejlépe použíti sádrového modelu (na rozebrání), jaký na příklad jest ve sbírkách fysikálního ústavu.

Obr. 233. znázorňuje pokud možno vlnoplochu celkově. *)]


*§ 258. Konstrukce Huygensova.

[* Pomocí vlnoplochy lze ihned jednoduchou konstrukcí řešiti úkol, k danému papsku na nějakou plochu krystalu dopadajícímu sestrojiti papsky lomené.

Budiž $\mathfrak{H}\,\mathfrak{H}'$ takovou rovinou hraničící, $\mathfrak{st}$ papsek dopadající, rovina dopadu budiž rovinou nákresnou, do níž se rovina hraničná promítá přímkou $\mathfrak{H}\,\mathfrak{H}'$.

K bodu $\mathfrak{t}$ přiložme vlnoplochu pro krystal ve správné orientaci, a k tomu bodu s poloměrem, který byl pro tuto vlnoplochu jednička. Tato koule značí tedy vlnoplochu pro vzduch (obr. 234).

Obr. 234.



Papsek $\mathfrak{st}$ prodloužíme pak do $\mathfrak{D}$, kde protíná kouli. V bodě $\mathfrak{D}$ položíme rovinu tečnou ke kouli, která protíná rovinu hraničnou

v přímce $\mathfrak{C}$ kolmé na rovinu dopadu (nákresnou). Touto přímkou $\mathfrak{C}$ jako osou položíme dvě tečné roviny k vlnoploše a obdržíme dva dotykové body $\mathfrak{E}'$ a $\mathfrak{E}''$; tyto spojíme s bodem dopadu $\mathfrak{A}$ a obdržíme papsky lomené $\mathfrak{A}\,\mathfrak{E}'$ a $\mathfrak{A}\,\mathfrak{E}''$.


Konstrukce – prostorová – dá body $\mathfrak{E}'$ a $\mathfrak{E}''$, jež z roviny dopadu všeobecně vystupují.

Pro hlavní řezy zůstávají body $\mathfrak{E}'$ a $\mathfrak{E}''$ v rovině dopadu čili nákresné; pro tyto řezy hlavní lze tedy konstrukci provésti v rovině. *)]

*§ 259. Hlavní exponenty lomu.

[* Obr. 235. ukazuje konstrukci pro řez rovinou YZ. Případ je charakteristický tím, že řez vlnoplochy dává – mimo ellipsu – také kruh a sice zde poloměrem a. Jest patrno, že papsek AO tomuto kruhu příslušný jde se zákonem Snelliovým — tak že pro tento řez je papskem řádným. Má tedy konstantní exponent lomu, který je patrně $\frac{1}{a}$.

Obr. 235.



Podobně u druhých dvou hlavních řezů mámě papsky řádné, pro něž platí exponenty lomu $\frac{1}{b}$ a $\frac{1}{c}$.

Tyto exponenty lomu $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ zovemě hlavními daného krystalu dvojosého.

Dím nabývají konstanty a, b, c jednoduchého významu.

Je-li $a > b > c$,

je svrchu $\frac{1}{a} < \frac{1}{b} < \frac{1}{c}$

čili $n_1 < n_2 < 3$

Tak jest na příklad pro světla matriové:


	n_1	n_2	n_3		Pozorovatel.
aragonit	1,53013	1,68157	1,68589	při t.	Rudberg.
borax	1,4463	1,4682	1,4712	= 23°	Kohlrausch
slída	1,5609	1,5941	1,5997	23°	"
ledek	1,3346	1,5056	1,5064	16°	Schrauf
síra (krystal.)	1,9505	2,0383	2,2405	16°	"
topas	1,61161	1,61375	1,62109		Rudberg.

Řádné paprsky mají hlavní řez za rovinu polarisační, kmitoměr je tedy dán zbývající osou povšechnic, kterou řez veden nebyl. *)]

*§260. Refrakce kuželová vnitřní a vnější.

[* Konstrukce Huygensova vede všeobecně ke dvěma různým dotykovým rovinám, jež položíme osou C, a kterými dávají dva dotykové body „B" a „C" na vnitřním a vnějším plášti rotačních ploch. Řez, vedený osou maximální a minimální pružnosti končící však, o tom, že existuje singulární rovina dotyková — a sice čtvrtá — toho způsobu, že se vnitřního i vnějšího pláště dotýká současně a to v celém pásmu bodů.

V hlavním pásmu jeví se to tím, že existuje společná přímka tečná CNM, singulární, ke kruhu i k elipse (obr. 236.)



obr. 236.

Singulární rovina dotýká se tedy rotačních ploch podél celého pásma bodů, které, jak lze dokázati, jsou rozloženy na kruhu průměru MN.


To však, ve smyslu konstrukce Huygensovy znamená — že může k jistému paprsku dopadajícímu náležeti celé pásmo konečných paprsků, rozložených na

plášti kužele, jehož před je A a jehož plášť se rozestírá po obvodě kruhu MN.

Který paprsek dopadající touto vlastností má, ukáže se z konstrukce ihned, jakmile jest dána rovina kraničná a jakmile vedeme onu společnou tečnou singulární napřed. Přiv napřed z nad průsečná přímka, a když touto položíme rovinu tečnou ke kruhu, jest SA (2) onen paprsek dopadající (obr. 236).

Refrakce tohoto zvláštního způsobu, při níž tedy paprsek dopadající a vzniklé v pásmu paprsků na kuželových kuželi rozložených, zove se kónickou a to vnitřní. Přímka AM. kolmá na singulární rovinu tečné zove se osou vnitřní kónické refrakce.


Je-li dána destička krystalová, jejíž roviny kraničné při refrakci kónické jsou rovnoběžné, postupuje paprsek kónicky rozvinutý, vycházeje z destičky v pásmu paprsků rozložených na válci eliptickém, jehož osa jest s paprskem dopadajícím rovnoběžnou (obr. 237).


obr. 237.

Vedle vnitřní existuje též t. zv. vnější refrakce kónická. Prochází-li v krystalu samém paprsek směrem AS (obr. 238), náleží k němu jakožto dopadající resp. jakožto z krystalu vycházející opět celá soustava paprsků na plášti kužele rozložených. Konstrukce Huygensova předpisuje totiž, aby se v bodě S k rotačnímu položila tečná rovina. — ale takových tečných rovin lze v onom zvláštním postavení (dálka) rotačního útvaru nekonečně mnoho, a ve svém úhrnu odpovídají tyto roviny paprskům dopadajícím kuželovitě rozloženým (obr. 239). Přímky S,T a S,T' zovou se osami vnější kónické refrakce.

Obrazce 237. a 238. udávají vždy ovšem jen schematicky, jsouce kresleny v poměrech velice přehnaných, právě proto, aby geometrická povaha věci zřetelně vynikla. Činak je otvor kužele jak při vnější tak i při vnitřní kónické refrakci ve skutečnosti velmi malý.

Kónickou refrakci předpověděl Hamilton z theorie, načež Lloyd dostatečně její experimentem na aragonitu zjistil. *)]




obr. 238.

*§ 261. Osy krystalů dvojosých.

[* Singulární roviny tečné k vlnoploše – počtem čtyři, dvě a dvě rovnoběžné – jsou rovnoběžny s kruhovými řezy ellipsoidu stejné práce. Směry k nim kolmé, t. j. přímky M, M a M', M' jsou tak zvané optické osy dvojosého krystalu. Postupuje-li totiž rovinná vlna rovnoběžná se singulární rovinou tečnou, směrem osy, je rychlost postupu nezávislou na kmitočtu.


Proti ose u krystalů jednoosých liší se zjev u krystalů dvojosých právě kónickou refrakcí. Místo vysvětlení bližšího poslouží obr. 240.



obr. 239.

§262. Převedení krystalů dvojosých na jednoosé.

Tak se všeobecná rovnice vlnoplochy změní, když se



obr. 240.

dvou rovnic: $x^2+y^2+z^2=b^2$

$a^2x^2+b^2(y^2+z^2)=a^2b^2$

se stane na př. $b=c$, ukazuje rozbor následující.

Všeobecně jest:

$(x^2+y^2+z^2)(a^2x^2+b^2y^2+c^2z^2)-$
$-a^2(b^2+c^2)x^2-b^2(c^2+a^2)y^2-$
$-c^2(a^2+b^2)z^2+a^2b^2c^2=0$

$c=b$

$(x^2+y^2+z^2)(a^2x^2+b^2[y^2+z^2])-$
$-a^2b^2(x^2+y^2+z^2)-b^2(a^2x^2+$
$+b^2[y^2+z^2])+a^2b^4=0$

$(x^2+y^2+z^2-b^2)(a^2x^2+b^2[y^2+z^2]-a^2b^2)=0$

což přechází v povstavu

koule o poloměru b

ellipsoid rotační, jehož meridiánový řez jest ellipsa o polosách a a b.

[*§263. Positivní a negativní krystaly dvojosé.

[* Také u krystalů dvojosých činívá se rozdíl mezi positivním a negativním, ač rozdíl tento není tak důležitý jako u jednoosých.

Krystaly dvojosé přejdou v jednoosé, když střední konstanta b se rovná buď maximální a, anebo minimální c. Přechod tento nejlépe pozorujeme na tom hlavním řezu, který jde osou maximální a minimální elasticity etherem.

Zde kruh o poloměru b protíná ellipsu o polosách a, c. Je-li $b=a$, pak je kruh kol ellipsy opsaný – což charakteristickým řezem jednoosých krystalů positivních; pak-li je stane $b=c$, pak je kruh do ellipsy vepsaný což je zase pro negativní jednoosé krystaly charakteristickým.

Proto se analogicky zove dvojosý krystal

positivním, je-li b blíže a,

negativním, „ b „ c.

Přesnější definice obdržíme, určujíce úhel optických os. *]

[*§264. Úhel optických os.

[* Jak již řečeno, rozeznáváme optické osy primární a sekundární. Prve zovou se opticky jasní v užším slova smyslu, též osami vnitřní konické refrakce, druhé zovou se osami paprskovými, též osami vnější konické refrakce.

Úhly, jež osy tyto svírají, určí se na základě geometrických úvah velmi jednoduchých.

1.) Úhel optických os primárních.


Osy tyto jsou normály singulárních rovin tečných; Fletcher je nazval binormálami hlavního řezu, jenž je rovinou xz, jsou osy jakožto normály singulárních přímek tečných, které se dotýkají zároveň kruhu poloměru b a ellipsy poloos c, a. (obr. 241).

Rovnice této ellipsy je

$$\frac{x^2}{c^2} + \frac{z^2}{a^2} = 1,$$

rovnice tečné k této ellipse jest

$$\frac{x\xi}{c^2} + \frac{z\zeta}{a^2} = 1.$$



obr. 241.

Spojíce normálu p na tuto tečnou a násobíce délkou p, obdržíme rovnici tečné ve formě normální rovnice přímky

$$\frac{px}{c^2}\cdot\xi + \frac{pz}{a^2}\cdot\zeta = p.$$

Označíme-li úhel, který svírá směr p s osou Oz, kde jest poloosa a — písmenem (obvyklou) V, bude patrno:

$$\frac{px}{c^2} = \sin V; \quad \frac{pz}{a^2} = \cos V$$

čili

$$\frac{x}{c} = \frac{c}{p}\sin V, \quad \frac{z}{a} = \frac{a}{p}\cos V,$$

z čehož vzhledem k rovnici ellipsy plyne:

$$c^2\sin^2 V + a^2\cos^2 V = p^2.$$

Známým případě, kde jde o tečné singulární, jest $p = b$,

tudíž

$$c^2\sin^2 V + a^2\cos^2 V = b^2.$$

Z toho pak plyne ihned:

$$\sin V = \sqrt{\frac{a^2-b^2}{a^2-c^2}}, \quad \cos V = \sqrt{\frac{b^2-c^2}{a^2-c^2}},$$

tudíž

$$\operatorname{tg} V = \sqrt{\frac{a^2-b^2}{b^2-c^2}}$$

Úhel obou optických os je pak $= 2V$.

Z toho je patrno:

Je-li $a^2-b^2 = b^2-c^2$, jest $V = \frac{\pi}{4}$; optické osy jsou k sobě kolmé; případ tento je přechodním.

Je-li $a^2-b^2 < b^2-c^2$ jest $V < \frac{\pi}{4}$

„ $a^2-b^2 > b^2-c^2$ „ $V > \frac{\pi}{4}$.

První případ jest charakteristickým pro krystaly positivní, druhý „ „ „ „ „ negativní.

Jinak lze psáti:

Pro krystaly positivní, jest $b^2 > \frac{a^2+c^2}{2}$

„ „ negativní „ $b^2 < \frac{a^2+c^2}{2}$.

Toť je rozdíl krystalů obou druhů — jak ku konci minulého § byl jen naznačen — nyní přesně definován.

2.) Úhel optických os sekundárních.

Sekundární osy optické odpovídají průsečnám kruhu a ellipsy

$$x^2 + z^2 = b^2$$

$$a^2x^2 + c^2z^2 = a^2c^2.$$

Pro tyto průsečné body J plyne z obou rovnic:

$$x = c\sqrt{\frac{a^2-b^2}{a^2-c^2}}, \quad z = a\sqrt{\frac{b^2-c^2}{a^2-c^2}}$$

Označíme-li analogicky písmenem V' úhel, jejž svírá průvodič k bodům J s osou Oz, do níž padá poloosa a, obdržíme:

$$\operatorname{tg} V' = \frac{x}{z} = \frac{c}{a}\sqrt{\frac{a^2-b^2}{b^2-c^2}}$$

Zajímavou je též formule:

$$\operatorname{tg} V' = \sqrt{\frac{\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}}{\frac{1}{c^2} - \frac{1}{b^2}}},$$

ze které plyne, že formule pro $\operatorname{tg} V'$ a $\operatorname{tg} V$ vyznačují se též reciprokým vztahem podobně jako ony ellipsoidy „první a druhý" elasticity. Anebo jinak: Čo jsou ve formuli pro V rychlosti a, b, c, to jsou ve formuli pro V' indexy n_1, n_2, n_3.

Jinak jest:

$$\operatorname{tg} V' = \frac{c}{a} \operatorname{tg} V,$$

tedy vždy

$$V' < V.$$

Místa a, b, c lze do formulí hořejších ovšem zavésti n_1, n_2, n_3, hlavní exponenty lomu, které bývají obyčejně základem výpočtů.

Budiž ještě toliko podotčeno. Často béře se za úhel os optických primárních úhel ostrý, a zavádí se ve půlící tento úhel ostrý jakožto první střední přímka, také bisectrix; ona tupý úhel půlící se vede pak jako druhá střední přímka. Pojem bisectric vystačí.

Z toho pak plyne: Padne-li bisectrix do směru nejmenší elasticity (směr OZ), jest krystal positivní; padne-li do směru největší elasticity (směru OX), je krystal negativní. *]

[* § 265. Příklad.

[* Provedme příklad příklad konkrétní, z něhož by vycházelo, jak se asi ony rozdíly ve skutečnosti ukazují.

Topaz má – dle Rudberga – pro světlo Na tyto optické konstanty:

				Differences
$n_1 = 1,61161$,	z toho: $a = 0,620497$	$a^2 = 0,385017$	$0,001020$
$n_2 = 1,61375$,	$b = 0,619675$	$b^2 = 0,383997$	$0,003470$.
$n_3 = 1,62109$,	$c = 0,616869$	$c^2 = 0,380527$	

$$\operatorname{tg} V = \sqrt{\frac{1020}{3470}}, \quad V = 28°28', \quad 2V = 56°56'.$$

$$\operatorname{tg} V' = \frac{0,616869}{0,620497} \operatorname{tg} V, \quad V' = 28°19'; \quad 2V' = 56°39'.$$

Topaz je tedy krystal positivní.

Počet ukazuje, že v differencích $a^2 - b^2$ a $b^2 - c^2$ první místa decimální vypadnou a že rozhodují pak jen další místa decimální. Toto jest nutno počítati na mnoho decimálních, aby úhel V a V' byl zaručen počtem na minuty. Má-li však tato početní zaručená míti fysikální jistotu, musí exponenty lomu býti správnými na několik jednotek pátého místa proto, poněvadž se mezi sebou jen málo liší.

Úhly V a V' jsou zde počítány pro světlo natriové. Pro jinou délku vlny vypadnou jinak. (Disperse os optických). *]

[* § 266. Závěrek.

[* Hledíme-li k všeobecné rovnici pro rychlost v šíření se polybu rovinného v prostředí jakémkoliv

$$v = \sqrt{\frac{\mathfrak{E}}{\mathfrak{S}}},$$

vidíme, že jest možno v vykládati různým $\mathfrak{E}$ – t. j. různou pružností éthery při stejné specifické váze (hmotě) $\mathfrak{S}$. Tato různá pružnost v různých směrech jest dle Fresnela zvláštností charakteristickou útvarů krystalických. Jest známo, že u těchto také četné fysikální vlastnosti (tvrdost, vodivost tepelná a elektrická) jsou různé v různých směrech. Jest to tedy také jakoby éther v krystalech byl krystalisován.

V prostředí isotropickém je pružnost etheru ve všech směrech konstantní – bez ohledu na materiál – a různá rychlost šíření se světla vykládá se zde dle Fresnela – různou hustotou etheru.

Že vidíti, že předpoklady tyto jsou dosti umělými.

Theorie Fresnelova přes veškeru genialnost svou nedá pokládati za definitivní. Proto také postupem času byly četné jiné theorie budovány, které by nejen úkazy dvojlomu, nýbrž a jiné jako disperse, absorpci a pod. – dovedly vysvětliti.

Že jest možno učiniti opačné předpoklady o příčině úloh veličin $\mathfrak{E}$ a $\mathfrak{S}$, je ihned patrno. Mohla by naopak v krystalech býti $\mathfrak{E}$ konstantní a $\mathfrak{S}$ v různých

směrech různá, a v středních isotropických pak stejná stejnam.

Mohl by se však éther za isotropický vůbec pokládati a úkazy optické vysvětlovati spolučinností éteru i hmoty, tak, že by chvěním částic éterových se též rozechvěly částečky hmotné. Poněvadž vlastnosti hmotné jsou podmíněny směrem v krystalu, bylo by pochopitelné, že by také vibrace hmotné byly na směru závislými.

Na takové vzájemnosti éteru a hmoty budovali theorii světla Boussinesq, Voigt, Sellmeyer, Helmholtz, Lommel, Thomson. *)

Polarisace chromatická.

§267. Úvod historický.

Úkazy polarisace chromatické objeveny byly krátce potom, co Malus nalezl polarisaci odrazem (1809). Roku 1811, $\frac{11}{8}$ předložil totiž Dominique F. J. Arago (1786–1853) v Institut de France pojednání: „Sur une modification remarquable, qu'éprouvent les rayons lumineux dans leurs passages à travers certains corps diaphanes." Zjednalo se v zájmu překvapující, že totiž při dopadu bílého světla polarisovaného, které bezbarvou destičkou krystalovou (slídovou) projde, papírek analysovaný se jeví býti barevným. Při skřížení analysátoru s polarisátorem není tedy pole tmavé, nýbrž barevné; tedy tak jakoby polarisace vlivem destičky krystalové byla zase zrušena, jako destička ono světlo polarisované zase depolarisovala." Arago zjev dále nevysvětlil. Krátce po něm popsal David Brewster úkazy polarisace chromatické ve světle konvergentním a sice v díle Treatise of New Philosophical Instruments (1813) Edinburgh) pro krystaly jednoosé a v roce následujícím (1814) pro krystaly dvojosé. Také on postrádal na svém objevu, vysvětlení žádného nevydav. Young poukázal na to, že by zjevy mohly vznikati interferencí; Biot podal vysvětlení dosti důmyslné na základě theorie emanační.

Vysvětlení správné na základě theorie undulační podali Fresnel a Arago. Zjevy polarisace chromatické mají základ svůj v interferenci polarisovaného světla. Podmínky takovéto interference stanovili Fresnel a Arago, a došli k větám následujícím:

1.) Dva paprsky, polarisované stejnoměrně, interferují za týchž podmínek jako paprsky obyčejné.

2.) Dva paprsky polarisované ve směrech k sobě kolmých, neinterferují vůbec.

3.) Dva paprsky polarisované ve směrech k sobě kolmých, jestliže vznikly ze světla obyčejného, neinterferují ani tehda, uvedou-li se na společný kmitosměr.

4.) Dva paprsky polarisované ve směrech k sobě kolmých pak-li vznikly ze světla polarisovaného, interferují, uvedou-li se na společný kmitosměr.

Věta 1. jest zřejmá; jsou-li pro světlo obyčejné splněny podmínky interference, nemůže býti pro vznik její závadou, když dopadající světlo polarisátorem uvedeno na pohlavný kmitosměr.

Věta 2. předčí o transversalitě kmitů světelných. Dá se jednoduše ukázati na základě dvojlomu dvěma štěrbinami, ku př. na spektrálním apparátu. Je-li dalekohled a kollimátor zařízen na nekonečno, a dá-li se před dalekohled diaphragma se dvěma štěrbinami, jež jsou rovnoběžné se štěrbinou kollimátoru, vznikne známý interferenční jev. Když pak se štěrbiny přikryjí dvěma destičkami turmalinovými, zůstává neb mizí interferenční jev dle toho, jsou-li destičky souhlasné neb skřížené.

Věty 3. a 4. jsou základními pro jevy polarisace chromatické.

Z nich tedy vysvítá, že musí býti dáno světlo již polarisované a sice nejjednodušeji lineárně polarisované. Když se pak vloží za polarisátor destička dvojlomná, vznikne dvojlomem všeobecně dvě složky světla polarisované v směrech k sobě kolmých, které mající rozdíl fásový mohly by interferovati; to však se stane teprve, když se obě složky analysátorem uvedou na společný kmitosměr.

§268. Rozdělení zjevů polarisace chromatické.


K snadnějšímu přehledu je s výhodou rozdělíti zjevy polarisace chromatické do dvou skupin, dle toho, zda-li světlo lineárně polarisované prochází dvojlomnou deskou rovnoběžnou nebo sbíhavě. Již proto je zdělení to se stanoviska vyučovacího výhodné, poněvadž úprava apparátů, jichž k pozorování zjevů těch užíváme, musí býti jiná pro světlo parallelní a jiná pro světla konvergentní. Rozeznáváme tyto apparáty, jmenujíce jedny orthoskopy, druhé konoskopy. (ὀρθός adj. přímý, κῶνος ὁ subst. kužel). Zařízení orthoskopů jest poměrně jednodušší, komplikovanější však je zařízení konoskopů.

Úkazy polarisace chromatické ve světle parallelním.

§269. Zařízení orthoskopů pro pozorování subjektivní.

Apparátem velmi vhodným pro subjektivní studium úkazů polarisace chromatické ve světle rovnoběžném jest apparát Körrenbergův. Jeho zařízení bylo již popsáno. Úprava jeho musí býti doplněna pro spektrální rozbor zjevů interferenčních. K tomu účelu musí býti o to postaráno, aby se (nejlépe) před nikol analysující dal vložiti hranol přímohledný světlo rozkládající, jakož i aby se pole, jež jinak je kruhové, dalo mžiti štěrbinou. Zámavá hrana onoho přímohledného hranolu postaví se vždy v touto štěrbinou rovnoběžně. Analysující nikol musí se pak dáti otáčeti tak, aby hranol přímohledný se neotáčel sebou, nýbrž ve svém postavení pevně zůstával. Šest dobře míti po sobě lineární diafragmata různé šířky, na př. ½ mm, 1 mm . . atd.

Obr. 242. ukazuje, jak se na místě nikolu dá nahoře vložiti hranol přímohledný a do něho teprve analysující nikol, dále ukazuje samo diafragmat lineárních.



§270. Zařízení orthoskopů pro demonstrace objektivní.


Pro účely přednášek k demonstrování objektivním zjevů úkazů polarisačních sestrojil velmi vhodný apparát Louis Jules Duboscq (rodem z Dybok), 1817–1886 (žák a nástupce Soleilův), jehož firma vynikla zejména konstrukcí apparátů optických. –:(Jako nástupce jeho řídí firmu tu inženýr Ph. Pellin v Paříži.):–

Obr. 243. ukazuje apparát ten v plné výzbroji perspektivně. Zde jde prozatím o to vysvětliti jeho zařízení schematicky pro demonstrování polarisace chromatické ve světle rovnoběžném.

Polarisátor (na př. nikol) vloží se do otvoru hlavního Upředu části apparátu Duboscqova jsou diafragmata kruhová v různých průměrech na destičce pokulaté kruhovitě rozložena, v zadní pak části apparátu je projekční čočka, konečně se do téže části vkládají analysátor, na př. nikol, nebo též dvojlomný analysátor na př. achromatisovaný hranol vápencový. Jinak lze též diafragma kruhové nahraditi štěrbinou lineární, když jde o spektrální rozbor; k apparátu třeba jen přidružiti za analysátorem (ve směru postupu paprsků pečeno) přímohledný hranol.

§271. Materiál

ob. 243.



Takovýto materiál ke studiu zjevů polarisace chromatické hodí se svrchu destičky krystalů dvojlomných jakýchkoliv; zejména však vzniká zde dvojí materiál, jehož se nejvíce užívá. Jest to <u>slída</u> a <u>sádrovec</u>. Krystalisují v soustavě monoklinické; dají se výborně štěpiti, tak že lze snadno obdržeti lístečky libovolně tenounké, zvláště ze slídy, což právě zde je věcí důležitou.

Chemickým složením je slída (ku př. $O_4/_3$ Al_3 K H_2, t.j. <u>kyselý trojkřemičitan</u> <u>hlinito-draselnatý</u>, <u>sádrovec</u> SO_4 Ca + 2 H_2O (selenit), tedy <u>síran vápenatý</u>, (vodnatý zvaný bezvodému SO_4 Ca). Těnké lupínky tohoto minerálu mohou zastupovati k některým účelům sklo (proto: sklo muscovské).

§272. Průběh úkazu ve světle monochromatickém.

Nejprve apparát Foucaultův pro studium subjektivní. Z denního světla, jež se odrazem na desce skleněné polarisuje, podržme na př. světlo červené položíce na stolek červené sklo. Analysátorem budiž nikol.

Je-li analysátor s polarisátorem <u>zkřížen</u>, je pole tmavé. Položme-li však na stolek destičku dvojlomného krystalu, na př. sádrovcovou, tedy se <u>pole vyjasní</u>.


Otáčíme-li destičkou krystalovou kolem osy apparátu, mění se <u>intensita světlosti</u>, přecházejíc od minima — jež jest nulou — k určitému maximu. Při otočení destičky jedním kolem (o 360°) ukáže se <u>čtyřikrát</u> nulové minimum a <u>čtyřikrát</u> maximum.

Otáčíme-li analysujícím nikolem, mění se rovněž intensita světlosti. Ryla-li na př. destička při zkříženém analysátoru v poloze odpovídající maximální světlosti, ukáže se, že při otáčení nikolu tato světlost klesá, ale zase stoupá.

(* K vysvětlení těchto zjevů provedme jednoduchou úvahu následující. Amplituda světla polarisovaného, jež dopadá na destičku, budiž = 1. Jde jen o <u>relativní</u> výtahy, není tedy tato supposice žádným omezením všeobecnosti.

Kmity světla dopadajícího směru OP rozdělí se v destičce ve dvě komponenty $\cos\varphi$ a $\sin\varphi$ dle dvou na sobě kolmých kmitosměrů OX a OY (obr. 244), při čemž φ jest úhel mezi kmitosměrem OP světla dopadajícího a kmitosměrem OX.

ob. 344.



Prostupující krystalem, vystoupí obě tyto složky světelné s jistým fásovým rozdílem ε, který vzniká tím, že kmity ve směrech OX a OY se šíří krystalem <u>nestejnou rychlostí</u>. Tímto fásovým rozdílem je dána podmínka interference. Tato však nastane, až když kmity na sobě kolmé se analysátorem uvedou na <u>společný kmitosměr</u>.

Je-li ψ úhel mezi kmitosměrem OA analysátoru a kmitosměrem OX, jsou komponenty amplitud do kmitosměru analysátoru padající patrně $\cos\varphi\cos\psi$, $\sin\varphi\sin\psi$ s rozdílem fásovým ε.

Tyto amplitudy r_1 a r_2 dávají — dle známého pravidla geometrického sčítání amplitud, kleché k fásovému rozdílu ε, — amplitudu výslednou r dle rovnice

$$r^2 = r_1^2 + r_2^2 + 2 r_1 r_2 \cos\varepsilon.$$

Píšeme-li J za r^2 na základě úměrnosti a dosadíme-li hodnoty příslušné za r_1 a r_2 obdržíme

$$J = \cos^2\varphi\cos^2\psi + \sin^2\varphi\sin^2\psi + 2\cos\varphi\sin\varphi\cos\psi\sin\psi\cos\varepsilon\,;$$

přidáme-li k této rovnici identickou výraz

$$0 = 2\cos\varphi\cos\psi\sin\varphi\sin\psi - 2\cos\varphi\sin\varphi\cos\psi\sin\psi\,,$$

obdržíme zavedouce $1-\cos\varepsilon = 2\sin^2\frac{\varepsilon}{2}$ rovnici:

$$J = \cos^2(\varphi-\psi) - \sin 2\varphi \cdot \sin 2\psi \cdot \sin^2\frac{\varepsilon}{2},$$

anebr píšeme-li ke zkrácení $\varphi - \psi = \omega$, obdržíme pro intensitu světla z analysatoru vycházejícího výraz definitivní

$$J = \cos^2\omega - \sin 2\varphi \cdot \sin 2\psi \cdot \sin^2\frac{\varepsilon}{2}.$$

Rozbor:

Integrál tohoto výrazu je jednoduchý. Člen první, $\cos^2\omega$ značí - dle zákona Malusova - intensitu světla, jakou bychom měli bez destičky. Neboť ω je úhel mezi kmitosměrem analysátoru a polarisátoru. Vliv destičky na tuto intensitu jest obsažen ve výrazu

$$-\sin 2\varphi \cdot \sin 2\psi \cdot \sin^2\frac{\varepsilon}{2}.$$

Vliv tento je při jakémkolivr položení destičky permanentně nullou, je-li

$$\sin^2\frac{\varepsilon}{2} = 0, \text{ t.j. } \varepsilon = k \cdot 2\pi.$$

Vyloučíme-li případ tento, je motiv destičky určen její polohou, totiž úhly φ a ψ, jež kmitosměry OX a OY v destičce naavírají s kmitosměry polarisátoru a analysátoru.

1) Vliv tento je nullový při

$$\varphi = 0, \frac{\pi}{2} \quad \text{neb} \quad \psi = 0, \frac{\pi}{2}.$$

Otáčíme-li tedy destičkem kolem osy aparátu, je destička ve čtyřech polohách nepřisobivou — jakoby jí zde nebylo — a sice tehdá, když buď kmitosměr OX nebo kmitosměr OY padne do kmitosměru buď polarisátoru nebo analysátoru.

2) Vliv destičky je maximální, když při určitém vzájemném postavení analysátoru k polarisátoru, t.j. při

$$\varphi - \psi = \omega = \text{Const}$$

buď směr OX nebo směr OY padne souměrně ke směrům OA a OP.

Důkaz této věty plyne přímo z diskuse, kdy jest

$$\sin 2\varphi \cdot \sin 2\psi \text{ maximum}$$

při

$$\varphi - \psi = \omega = \text{Const.}$$


Differenciace vede k rovnici:

$$\cot 2\varphi + \cot 2\psi = 0.$$

Rovnice tato je splněna: a) Je-li $\psi = -\varphi$, t.j. vzhledem k rovnici $\varphi - \psi = \omega$,

je-li $\varphi = \frac{\omega}{2}$, $\psi = -\frac{\omega}{2}$.

V tom případě (obr. 245) je pak: $\sin 2\varphi = \sin\omega$, $\sin 2\psi = -\sin\omega$,



obr. 245.

tudíž $J = \cos^2\omega + \sin^2\omega \cdot \sin^2\frac{\varepsilon}{2}$.

b) Je-li $\varphi = \frac{\pi}{2} + \frac{\omega}{2}$ a $\psi = \frac{\pi}{2} - \frac{\omega}{2}$


V tom případě (obr. 246) jest opět

$$\sin 2\varphi = -\sin\omega, \quad \sin 2\psi = \sin\omega$$

$$J = \cos^2\omega + \sin^2\omega \cdot \sin^2\frac{\varepsilon}{2}.$$

Shrnouce tedy případ a) a b) můžeme říci: Při libovolném, ale určitém postavení analysátoru vzhledem k polarisátoru, t.j. při stálém úhlu ω svedne se vlivem destičky intensita J na maximální

$$J_m = \cos^2\omega + \sin^2\omega \sin^2\frac{\varepsilon}{2},$$



obr. 246.

když buď směr OX nebo směr OY padne souměrně ke směrům OA a OP, což při otáčení destičky v plný úhel 2π se stane čtyřikrát.

Při tom je $J_m = 1$, t.j. intensita světla svede se na původní vzor, když

buď $\omega = 0$ neboť $\varepsilon = k\pi$,

t.j. když buď analysátor je souhlasný s polarisátorem (a destička v poloze souměrné, když OX půlí úhel ω, tedy v poloze když OX padne do směrů $OP \parallel OA$ a OY k němu kolmo), anebo když je tloušťka destičky taková, že rozdíl fásový ε jest násobné π; v posledním případě je $J_m = 1$ při jakémkolivr úhlu ω, ovšem předpokládajíce, že při tom destička je vždy v poloze souměrné, jak pro maximum působnosti bylo odvozeno. (Obr. 245 a 246).


Konečně dlužno vytknouti ještě zajímavý vztah následující:

Při libovolné poloze destičky a při dvou polohách analysátorů, jež se v úhel $\frac{\pi}{2}$ protínávají, jsou intensity J komplementární doplňujíce se totiž na plnou intensitu = 1. Neboť klademe-li jednou φ, podruhé $\varphi + 90°$,

obdržíme: $J_1 = \cos^2\omega - \sin 2\varphi \sin 2\psi \cdot \sin^2\frac{\varepsilon}{2}$ $\quad J_2 = \sin^2\omega + \sin 2\varphi \sin 2\psi \sin^2\frac{\varepsilon}{2}$

tudíž $$J_1 + J_2 = 1.$$

Všimněme si ještě, že tuto věc studovati analysátorem dvojlomným. Je-li pole poněkud větší, kryjí se oba obrázky dvojlomem vzniklé, a tam kde se kryjí, jsoucí intensita světla monochromatického konstantní = 1 a sice taková, jakoby byl analysátor rovnoběžný s polarisátorem. *)



[* §273 Rozdíl fásový ε.

[* Rozdíl fásový ε vzniká obyčejně z rozdílu dráhového δ; vztah mezi oběma je dán rovnicí: $$\varepsilon = \frac{2\pi}{\lambda}\delta.$$

V našem případě probíhají oba paprsky s kmitočtem OX a při kolmém dopadu toutéž drahou, t.j. tloušťkou e destičky (obr 247), ale s rychlostí různou. Jsou tudíž optické dráhy různé. Uhlížíce tyto dráhy optické přepočítati na vzduch, násobíme skutečnou dráhu exponentem lomu relativním, t.j. též na vzduch vztahovaným; je-li n' a n'' tento relativní exponent lomu pro jeden i druhý paprsek, značí n'e a n''e onu dráhu optickou, a tudíž jich rozdíl je $$\delta = (n' - n'')\, e.$$

Z toho plyne: $$\varepsilon = \frac{2\pi}{\lambda}(n' - n'')\, e.$$

Rozdíl fásový ε jest — při téže tloušťce destičky dvojlomné — podmíněn délkou vlny λ světelné, t.j. barvou světla dopadajícího.

Měří-li se λ v mezích záření viditelného, na př. v mezích, jež jsou určeny čarami Fraunhoferovými A a H, probíhá faktor $\frac{2\pi}{\lambda}(n' - n'')$ rádu hodnot též v určitých mezích ležících; tyto meze se pak násobením e více méně rozšíří dle toho, je-li tloušťka destičky větší nebo menší. *)

§274. Průběh úkazů ve světle polychromatickém a bílém.

Úkazy polarisace chromatické ve světle polychromatickém jakožto původním vznikají superposicí těch zjevů, jež platí pro každý druh homogenního světla zastoupeného v onom světle původním. Výraz $$J = \cos^2\omega - \sin 2\varphi \cdot \sin 2\psi \cdot \sin^2\frac{\varepsilon}{2}$$ platno užíti pro každou délku vlny λ, jež je zastoupena ve světle dopadajícím, a pak uvážiti, jaký výsledek obdržíme summací intensit.

Při této summaci přijdou k platnosti nikoli členy, jež obsahují úhly poličení φ, ψ, ω — ty jsou nezávislé na délce vlny —, nýbrž člen $\sin^2\frac{\varepsilon}{2}$, který s délkou λ vlny světelné souvisí. Pro některou barvu bude tento člen = 0, pro barvy bezprostředně sousední bude také téměř = 0, pro barvy odlehlejší bude míti již hodnotu větší až k maximum = 1, pak pro barvy ještě vzdálenější bude míti hodnoty zpět k nulle klesající atd.

Ve výsledném světle budou tedy různé barvy zastoupeny různou intensitou, z toho pak již vychází, užíváme-li bílého světla, že musí vznikouti pole zbarvené.

Uložíme-li tedy mezi polarisátor a analysátor, at jsou jakkoliv vzájemně postaveny při světle bílém destičku dvojlomnou, tedy se pole všeobecně zbarví. Tím se dvojlomný charakter destiček jeví velmi citlivě, zejména je-li analysátor s polarisátorem zkřížen. Že jsou ve výsledném světle jednotlivé barvy zastoupeny různou intensitou a že po případě některé mezi nulou schází, ukáže ihned spektrální pozor.

Položíme-li na destičku dvojlomnou diaphragma lineární a interpolujeme-li hranol průsvitný, jehož lámavá hrana jest s onou diaphragmatem rovnoběžná, obdržíme spektrum, v němž jsou barvy zastoupeny různou intensitou, po případě objeví se ve spektru jeden neb i několik hranových proužků dle tloušťky destičky.

[* Pozorujme úkazy konkrétně:

Budiž analysátor skřížen s polarisátorem, tedy $\varphi - \psi = \frac{\pi}{2}$.

Pole jest tmavé.

Vložme destičku dvojlomnou a sice do té polohy sousedné $\varphi = \frac{\pi}{4}$, kdy jest její účin největší.

Pole se živě zbarví.

Střídavějme pak destičku ležetí, – t. j. prodějce úhel $\varphi = \frac{\pi}{4}$, otáčejme analysátorem, počínajíce od postavení skříženého, kdy je $\psi = -\frac{\pi}{4}$, do postavení souhlasného, kdy je $\psi = +\frac{\pi}{4}$, (t. j. $\varphi - \psi = 0$), a vytkněme zejména postavení přechodná při $\psi = 0$, $\varphi - \psi = \frac{\pi}{4}$.

Pozorujme následující.

Při $\psi = -\frac{\pi}{4}$ živé zabarvení

Od $\psi = -\frac{\pi}{4}$ do $\psi = 0$ zabarvení bledne vždy víc a více, až konečně mizí, pole je při $\psi = 0$ bílé v intensitě různé.

Od $\psi = 0$ do $\psi = +\frac{\pi}{4}$ zabarvení zase vyniká, ale komplementární z počátku jest bledé, pak živější až nejživější při $\psi = +\frac{\pi}{4}$.

Kdybychom ještě dále analysátorem otáčeli, vracely by se úkazy ve zpáteční pořádku.

V mathematickém výkladu jeví se věc takto.

Výraz $$J = \cos^2(\varphi - \psi) - \sin 2\varphi . \sin 2\psi . \sin^2 \frac{\varepsilon}{2}$$

přejde pro polohu destičky $\varphi = \frac{\pi}{4}$ v následující:

$$J = \cos^2\left(\frac{\pi}{4} - \psi\right) - \sin 2\psi \sin^2 \frac{\varepsilon}{2} .$$

Jde tedy o dva členy tohoto výrazu.

1) Při $\psi = -\frac{\pi}{4}$ jest první člen = 0, druhý má maximum $+\sin^2 \frac{\varepsilon}{2}$.

2) Od $\psi = -\frac{\pi}{4}$ do 0 člen první stoupá až do hodnoty $\cos^2 \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}$, člen druhý klesá až do hodnoty nulové.

Při $\psi = 0$ máme – nezávisle na délce vlny –

$$J = \frac{1}{2} .$$

3.) Od $\psi = 0$ do $+\frac{\pi}{4}$ člen první roste dále až do 1, člen druhý klesá do hodnot negativních, až je při $\psi = \frac{\pi}{4}$

$$J = 1 - \sin^2 \frac{\varepsilon}{2} .$$

Ty barvy, pro něž $\frac{\varepsilon}{2} = k . \pi$ scházejí tudíž úplně při postavení analysátoru skřížením, ale naopak vystoupí v plné intensitě při postavení analysátoru rovnoběžném.

Ve spektrálním rouchu vystoupí pro tyto barvy ve spektru tmavé pruhy interferenční, nikoliv pouhé tmavé postranní čáry, ponévadž i sousední barvy jsou plavé. Tyto pruhy při otáčení nikoliv ponenáhlu mizí, při $\psi = 0$ shledáme spektrum polointensivní stejnoměrné, ale pak vystupují pruhy na místech opačných, kde dříve byla intensita největší. Tím je vysvětlena komplementárnost celého zjevu.

Pruhy tedy vznikají:


a.) při postavení analysátoru skřížením v hlubokosti hodnot
$\frac{\varepsilon}{2} = k\pi$ čili $\frac{1}{2}\frac{2\pi}{\lambda}(n' - n'')e = k\pi$ čili $\delta = (n' - n'')e = 2k\frac{\lambda}{2}$;

b.) při postavení analysátoru rovnoběžném v blízkosti hodnot
$\frac{\varepsilon}{2} = (2k+1)\frac{\pi}{2}$ čili $\frac{1}{2}\frac{2\pi}{\lambda}(n' - n'')e = (2k+1)\frac{\pi}{2}$ čili $\delta = (n' - n'')e = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$.

Rozhoduje tedy rozdíl drah optických (přepočtaný na vzduch) dle toho, je-li rozdíl tento roven sudému nebo lichému počtu polovln.


Jde-li jen o tento výsledek, lze věc pochopiti jednodušeji úvahou názorou dle obrazců 248. a 249. *)

obr. 248.



Při rozdílu opt. drah = 2K. ½ ruší se kmity uvedené na A ⊥ P.

obr. 249.



Při rozdílu opt. drah. = (2K+1) ½ ruší se kmity uvedené na A ∥ P.

Úkazy polarisace chromatické ve světle konvergentním.


§ 275. Zařízení konoskopů pro pozorování subjektivní.

Apparátem nejjednodušším jsou zde turmalínové kleště (obr. 250), opatřené čočkou spojnou. Paprsky dopadající se všech stran na destičku krystalovou prostupují tuto a spojují se v oku pozorovatele.

Dokonalejší konoskopy vyznačují se svou úpravou, jakou činí dopadající světlo konvergentním. Hlavním požadavkem je tu, aby bylo při náležité konvergenci paprsků zorné pole co možná rozsáhlé; kdežto kleště turmalínové mající zorné pole dosti rozsáhlé, ale kužel paprsků nepatrný a ukazují tedy u vložených preparátů krystalinických nalý počet centrálních proužků interferenčních, jest možno konoskop těmito přehlédnouti zjevy interferenční v celém rozsahu zorného pole.

Konoskopy dříve dle Störrenberga zkonstruované nevyhovovaly tím, že užily za polarisátor nikol a tím za daných poměrů pole velice zúžený; proto se raději volí sice méně dokonalý ale za to vydatný polarisátor — soustava destiček skleněných na odraz; přístroj tohoto druhu, jejž navrhl a francouzské Společnosti fysikální předložil 28/II. 1877. M. Bertin zhotovený firmou E. Ducretet v Paříži (viz obr. 251 a, b,) má dvě úplně symmetrické soustavy čoček I a II, mezi než se vkládá krystal, jejž se má pozorovati. Světlo dopadající na polarisátor, jenž jest pod jistým úhlem k ose apparátu skloněný, odráží se jako polarisované do konoskopu a prochází v kuželi destičkou krystalickou, načež se analysuje hořejším nikolem A, k němuž připojena bývá jednoduchá lupa, jež se dá spolu s nikolem analysujícím blíže nebo dále k objektivu posívati a tím lze obrázek zaostřiti. Když kondensor I jest zároveň s polarisátorem pro vždy spojen se stativem přístroje, dá se část hořejší s objektivem, analysátorem, pomocí závitového vedení nahoru i dolů posunovati;

obr. 250.



vložnou desku krystalu, sbližuje se nebo vzdaluje objektiv s kondensorem, aby zorné pole bylo co největší. Mezi objektivem a analysujícím nikolem je ponechán místo R ku vkládání 1/4 vlnových desk, pomocných křemenových desek parallelních a klínků anebo červeného skla, a z předu je část tato před přímým vlivem nežádoucího světla chráněna stínícím pláštěm plechovým S.

Pozorovati lze buď při světle bílém, — což má svou důležitost při stanovení různých disperse optických os, když se působené zabarvení tří achromatických jeví jen ve světle polychromatickém — anebo při světle monochromatickém, na př. natriovém, a tu pak dbáno světla vydatného zdroje, na př. lampy natrivé, učiniti silnou čočkou parallelním, než na polarisátor dopadá.

Obrazy interferenční ve světle monochromatickém vyplňují pěkně detailovaně celé zorné pole — ve světle bílém pozorujeme pouze 5–6 proužků centrálních, pouze další, zbarvené jsou Newtonovými barvami vyšších řádů, mizí v barvě bílé.

Podotknouti dlužno, že, má-li se pozorovati daným konoskopem, má také důležitou úlohu oko pozorovatelovo — neboť nevidí stejně jasně tytéž obrazce interferenční oko krátkozraké, normální a dalekozraké; lze tu pomáhati částečně zasunováním hořejší lupy aneb — oko krátkozrakému — brýlemi.


Účelu podobného spůsobu je i přístroj druhý, zobrazený v obr. 252 a) a b) (od firmy Steeg).

Od konoskopů těchto v podstatě liší se mikroskopy polarisační, jakých užívají petrografové, jsou to mikroskopy, které slouží také k jiným účelům, k nimž se ale dá přičiniti zařízení polarisačním — totiž polarisující nikol ke kondensoru a analysující nikol buď pevný, pod okulárem aneb otáčivý nad okulárem.


[* § 276. Zařízení konoskopů pro demonstraci objektivní.

[* K demonstrování objektivnímu jest nejlépe použíti pohodlného apparátu Dubrovcovova na projekci, který jsme již jako orthoskop poznali. Dluhno připojiti k němu pouze zařízení mikroskopické naznačené schematicky v obr. 253, tedy zase kondensor (čočky a, b) a objektiv mikroskopu c, mezi něž se vkládá destička krystalinická na držátku stáčivém se dá možnou orientací.

ob. 252.



ob. 253.



Polarisátor se vkládá buď do přístroje zaměřeného P, nebo lze užíti rhodanu též achromatisovaného hranolu vápencového, jenž se vkládá do otvoru v helvistatu, a jeden z obou papršků značně odchýlený se diaphragmatem zachytí.

Apparátu Dubrovcovova dá se kromě jako orthoskopu a konoskopu použíti také pro světlo mírně divergující, jedná-li se o projekci úkazů chromatické polarisace ve světle parallelním, jež vyžadují značného pole. (Různé preparáty ze skly neb sádrovou směsí skládané, jež se jeví při jistých

dvou polohách velmi pěkně a komplementárně zbarvený, motýli, květiny, ptáci atd.)

Konečně i konoskopu Bertinova dá se pro demonstraci objektivní užíti, užijeme-li vhodnou čočku projekční. *)

§ 277. Rozdíl fásový při šikmém průchodu destičkou.

[* Základem svým nemohou úkazy polarisace chromatické ve světle konvergentním býti rozdílnými od úkazů, jež jsme popsali pro parallelní světlo. Papršky, jež polarisátorem jsou rovinně polarisovány, postupujíce destičkou krystalickou šikmo, rozkládají se též dvojlomem ve dvoje paprsky, které vystupujíce s jistým rozdílem fásovým, jsou schopny interference, jež také nastane, když se uvedou analysátorem na společnou rovinu kmitovou. Pro intensitu platí také jde vzorec dříve odvozený

$$J = \cos^2 a - \sin 2q \cdot \sin 2\psi \cdot \sin^2 \frac{\varepsilon}{2}.$$

Úhly a, q, ψ jsou úhly průčin polarisátoru a analysátoru, jde jako tam-tolika fásový rozdíl ε má vztah k šikmosti paprsků; jsouc tedy výrazem pro tento rozdíl fásový liší se v podstatě polarisace chromatická ve světle konvergentním od polarisace chromatické ve světle parallelním.


Onen fásový rozdíl ε vyvodíme z rozdílu dráhového δ opět dle známé relace

$$\varepsilon = \frac{2\pi}{\lambda}\delta,$$

kdež je λ přepočítáno na vzduch. Rozdíl pak dráhový rovněž na vzduch přepočtený, jakýmž plyne rozdíl dráh optických, obdržíme z rozdílu skutečných dráh v krystalu násobením exponenty n' a n'' relativními vzhledem ke vzduchu. Čím je postup odvození předepsán.

Světlo dopadá rovinná vlna na destičku krystalovou ve směru α; dvojlomem přichází pak do směrů β' a β''. Směry vztahujeme ovšem na normálu rovinné plochy a úhly α, β', β'' počítáme od kolmice dopadu (obr. 254).

Dráhy skutečné obou vln v krystalu jsou



$OM = e\cos\beta'$, $ON = e\cos\beta''$

Zásluhou exponenty lomu

$$n' = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta'}, \quad n'' = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta''}$$

přepočítáme dráhy skutečné na dráhy optické pro vzduch

$$e\sin\alpha\cot\beta', \quad e\sin\alpha\cot\beta''.$$

Rozdíl dráhový δ je tudíž

$$\delta = e\sin\alpha(\cot\beta' - \cot\beta''),$$


a z toho rozdíl fásový

$$\varepsilon = \frac{2\pi}{\lambda}\delta.$$

Průchodem do vzduchu z krystalu, jenž je omezen rovinami rovnoběžnými, přijdou obě rovinné vlny opět ve směr α.

Poněvadž výraz pro δ jest pro celý další výklad důležitým, podáme ještě jiné jeho odvození, takové totiž, aby onen δ názorně vynikl konstrukcí.

Obr. 255. ukazuje, jak obě rovinné vlny I a II srovnají do stejného směru, když z krystalu vystupují do vzduchu, jdou za sebou ve směru α s rozdílem dráhovým δ, který je dán kolmou jich vzdáleností.



Zatím je $\delta = PQ.\sin\alpha$

$$PQ = SP - SQ =$$
$$= e\cot\beta' - e\cot\beta''.$$

Dosazením přicházíme k témuž výrazu jako dříve.

Kratší forma výrazu pro δ jest

$$\delta = e(n'\cos\beta' - n''\cos\beta''),$$

který lze snadno zapamatovati,

poněvadž $e\cos\beta'$ a $e\cos\beta''$ jsou dráhy skutečné v krystalu, jichž násobení příslušnými exponenty lomu upomíná na přepočítání drah skutečných na dráhy optické.

Pro kolmou incidenci, kde je $\beta' - \beta'' = 0$, plyne z něho výraz jí známý

$$\delta = e(n' - n'').$$ *)

§ 278. Povšechná povaha úkazů polarisace chromatické ve světle konvergentním.

(*) Vzorce, jež zde rozhodnují, jsou následující:

$$J = \cos^2\omega - \sin 2\varphi.\sin 2\psi.\sin^2\frac{\varepsilon}{2}$$

$$\varepsilon = \frac{2\pi}{\lambda}\delta$$

$$\delta = e\sin\alpha(\cot\beta' - \cot\beta'').$$

Rudiž poloha analysátoru k polarisátoru <u>určitou</u>. Tak jest úhel ω dán. Intensita J závisí pak jednak na úhlech φ a ψ, jednak na rozdílu fásovém ε. Úhly φ a ψ jsou pro různé paprsky měnlivé, poněvadž je měnlivým směr OX a OY; i rozdíl fásový ε jest rovněž od paprsku k paprsku měnlivým dle incidence.

Avšak <u>vliv</u> rozdílu fásového ε <u>odpadává</u> pro všechny paprsky, pro něž jest

buď $\varphi = 0$ neb $90°$

neb $\psi = 0$ „ $90°$,

tedy pro paprsky takové, jichž kmitoměry buď jsou <u>podél</u> neb <u>na příč</u> k hlavním rovinám polarisačního apparatu. Pro všechny paprsky takové platí <u>bez ohledu na délku vlny λ</u> povšechně $J = \cos^2\omega$,

tedy na př. $J = 0$ pro $\omega = \frac{\pi}{2}$ neb $J = 1$ pro $\omega = 0$.

<u>Přibližně</u> platí to též pro paprsky oněm <u>blízké</u>, pro něž

je totiž $\varphi = 0$ neb $90°$

anebo $\psi = 0$ neb $90°$. *)

Volbaci, jaký tedy skýtá destička krystalová v apparátu polarisačním, vyrikuou čáry, jimž říkáme <u>achromatické</u> (ἀ „ χρῶμα) neb latinským jménem <u>incolory</u> t. j. <u>čáry bezbarvé.</u>

Vyloučíme-li tento případ, kdy rozdíl fázový ε, ať je jakýkoliv, nemá žádného vlivu, pak můžeme přihlédnouti blíže k případům, kdy rozdíl fázový vlivem svým se jeví. Úvahami podobnými jako při světle rovnoběžném poznáváme, že vznikne zabarvení, které se však mění, poněvadž ε se mění. Pro jisté papírky bude ε stálé; obrazec destičky v apparátu polarisačním bude tedy ukazovati čáry stejného zabarvení, jimž říkáme čáry isochromat. (čes. χρῶμα neb latinsky aequicolory), t. j. čáry stejnobarevné.

Tyto nebudou všude stejné intensity, poněvadž součinitelé $\sin\varphi$ a $\sin\psi$ jsou měnlivé. Avšak maximum platí pravidlo symmetrie vůči hlavním rovinám apparátu polarisačního, jak bylo odvozeno při světle rovnoběžném.

Jaký průběh mají čáry achromatické a isochromatické při určitém postavení analysátoru k polysátoru, zavisí především na optické povaze látky krystalické, je-li totiž krystal jednoosý neb dvojosý; dále pak, jak je destička seříznuta, vzhledem k optické ose neb k optickým osám.

Různito podmínkami jest tvar křivek určen. O rozměrech křivek rozhoduje pak dále velikost dvojlomu látky, t. j. rozdílnost exponentů lomu obou paprsků dvojlomem vznikajících, jakož i tloušťka destičky.

Činak otáčíme-li analysátorem mění se všeobecně obraz, jaký destička poskytuje. Vyznačené polohy analysátoru jsou při tom — jako vždy — ty, když totiž analysátor jest s polysátorem buď souhlasný neb skřížený. Při poloze některé prostřední nastávají zajímavé přechody křivek) achromatických.

§ 279. Krystaly jednoosé kolmo k ose seříznuté.

Případ nejjednodušší. Vůči ose krystalu, jež splývá s osou apparátu polarisačního, jest kolem osě souměrné. Proto mají vyniknouti obrazy kruhovy. Admitsměry jsou vůči těmto kruhům periferické — kolmé k hlavnímu řezu — jednak radiální — v hlavním řezu samém. Křivky isochromatické jsou zde kruhy, achromatické dávají kříž kruhy tyto centrálně prostupující. Poloha kříže i jeho jasnost se mění při otáčení analysátoru. Je-li analysátor s polysátorem skřížen, jest kříž tmavý, je-li souhlasný, jest kříž jasný.

Vůbec orientovaní o místech achromatických, přihlédněme ještě ku křivkám

isochromatickým, podél nichž je vždy ε stálé. Předpokládejme nikoly skřížené ($\omega = 90°$). Pak je ve výrazu pro intensitu

$$J = \sin^2 2\varphi \cdot \sin^2 \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ve světle monochromatickém budou tedy vedle k φ temná místa tam, kde $\sin^2 \frac{\varepsilon}{2} = 0$, t. j. pro $\frac{\varepsilon}{2} = 0, \pi, 2\pi, \ldots, k\pi$, tedy všeobecně pro ($\frac{\varepsilon}{2} = \frac{\pi}{\lambda}\delta = k\pi$) $\delta = k\lambda$, t. j. pro místa, kde rozdíl drah vycházejících obrazů celistvý počet délek vln.

Kdybychom mimo zavedli do výrazu pro fázový rozdíl úhel dopadu, jenž je měnivý, délka paprsků příslušné křivky isochromatické, zjevili bychom — předpokládáme-li nikoly skřížené —

o poloměrech kruhů temných

a) že se mají k sobě velikosti jejich jako odmocninám čísel sudých, tedy

$$r_1 : r_2 : r_3 : r_4 : \ldots = \sqrt{2} : \sqrt{4} : \sqrt{6} : \sqrt{8} : \ldots$$
$$= 1{,}414 : 2{,}000 : 2{,}449 : 2{,}828 \ldots$$

b) že jsou obrácené úměrny tloušťce dvojlomné.

Při stejné tloušťce jsou prstny těsnější, má-li krystal větší dvojlomnost; neboť rozdíly v exponentech lomu jsou pak větší a tudíž rozdíle fázového k interferenci potřebného se dosáhne menšou jeho změnou incidence paprsků.


c) délce vlny λ pak jsou úměrny průměry, tedy pro světlo tonu hlubšího (na př. červené) budou širší než pro světlo modré, což snadno můžeme konstatovati pokrývajíce polovinu zorného pole v konvexním sklem červeným a druhou modrým. Tím, že nevzniká minimum pro všechny barvy na téže místě, se vysvětluje, proč jsou tyto křivky ve světle polychromatickém zbarveny.

d) konečně s tloušťkou desky mění se též rozsáhlost prstnů; čím je deska téhož materiálu silnější, tím jsou prstny, jež zorné pole obsahne, těsnější.


Takovýto zjev krystalu jednoosého při skřížených nikolech ukazuje obraz. 256; při postavení nikolu rovnoběžném místa temná a světlá se svou úlohou vymění — nastane obraz komplementární.

Položení modifikací tohoto zjevu interferenčního vyznačují se krystaly jednoosé s malou tloušťkou otáčivou (obr. 257), které zjev v okolí

obr. 256.



obr. 257.




optické osy dvojlomem cirkulárním a totéž zbarvení ve střední zjevu, jaké by dávala tato deska křemenová v orthoskopu; stále od osy pak začínají překlápati proužky tytéž jako u ostatních krystalů jednoosých: jevy křemene a ostatních krystalů s molutností stáčivou (jaké jeví na př. síran strychninový, rumělka, aethylendiamin atd.) můžeme označiti jakožto úkazy kvesistence stáčivé molutnosti a dvojlomu.

§280. Krystaly jednoosé šikmo k ose kroužené.

Veškeré zjevy interferenční krystalů jedno- i dvojosých jeví při postupné se měnící orientaci destičky v krystalu (totiž směru rozlehlosti k optické ose, jímž je destička kroužena) — nepřetržitou souvislost. Kroužíme-li destičky stále šikměji k optické ose, při čemž úhel μ, jejž svírá normála desky s opticku osou (obr. 258), roste od nuly počínajíc, přecházejí isochromatické kruhy nejprve v obrazce mírně elliptické — při čemž stopa optické osy — střed interferenčního zjevu se vzdaluje od středu zorného pole. Případ takový ukazuje obr. 259, kde je úhel μ právě 29°; při dalším sklonech se pruhy elliptické rozšiřují, středy ellipsy se octnou mimo zorné pole, a vidíme pouze oblouky elliptické.

obr. 258.

obr. 259.




V jistém přechodním případě stanou se tyto parabolickými (obr. 260), a je-li tento pak překročen, mívá kruhy hyperbolické ke středu se blížící — až konečně nastoupí pro desku rovnoběžnou s osou kroužení systemy hyperbol znázorněné v obr. 261.

obr. 260.



obr. 261.



Analyticky vystihl zajímavé přechody tyto Bertin, odvodiv všeobecnou rovnici křivek isochromatických v souřadnicích pravoúhlých x, y pro desku, jejíž normála svírá úhel μ s opticku osou krystalu,

$$\left(\cos^2\mu + \tfrac{1}{2}\sin^2\mu\right)y^2 + \left(\cos^2\mu - \tfrac{1}{2}\sin^2\mu\right)x^2 - Qx\sin 2\mu = P,$$

kdež ve členech Q a P intervenují exponenty lomu, dif. fázová, tloušťka destičky, jakož i vzdálenost jasného vidění. Součinitel u x^2 může býti totiž positivní, nullou neb negativní, a dle toho obdržíme tvary křivek isochromatických. Nullou je pro $\cos^2\mu = \frac{1}{2}\sin^2\mu$, t. j. pro $\mu = \operatorname{arctg}\sqrt{2} = 54°44'$.

Je-li tedy orientace desky taková, že

1) $\mu < 54°44'$, mámě křivky elliptické ($Ay^2 + Bx^2 - Cx = P$, v zvláštním případě ($\mu = 0$) kruhové ($x^2 + y^2 = r^2$),
2) $\mu = 54°44'$, křivky parabolické ($Ay^2 = Bx + P$)
3) $\mu > 54°44'$, křivky hyperbolické ($Ay^2 - Bx^2 - Cx = P$,

kteréž dosahují limitního případu hyperbol rovnoramenných pro $\mu = 90°$.


Jevy krystalů šikmo neb rovnoběžně s osou kroužených pozorovati jest jen ve světle homogenním, monochromatickém. Máme-li tu činiti i se papskými kolmo dopadajícími s rozdíly cest značnými, pak střední jest jíž žádný značně vysokého a postranní příslušně rostoucí neb klesající také řádů vyšších.

§281. Krystaly dvojosé.

Charakteristickými jsou tu

a.) křivky Cassiniho (kampiskaty) u desek kroužených kolmo na přímku středním (bisectrix), která půlí ostrý úhel optických os, nazvaný obr. 262; nejintensivněji vystupují, je-li rovina optických os v azimutu 45° ke křižujícím nicholům.

ob. 262.



ob. 263.



stopy optických os jsou poly lemniskat; dle nich se dá také měřiti úhel optických os;

b.) *pruhy kruhům podobné*, je-li deska přímá kolmo na jednu z optických os s přímcem achromatickým (obr. 263.);

c.) *hyperboly* podobné jako v obr. 261.

Souvislost mezi interferenčními jevy krystalů jednoosých a dvojosých měřené zajímavým způsobem stáčení, zavěrávající na př. dvojosý *pádrovec*, čímž se stopy optických os se stoupající temperaturou *sbližují*, pro určitou temperaturu nastane *jev jednoosých krystalů* a při dalším rozdílu se opět optické osy — jenže tentokrát v rovině k původní kolmé.

Veškeré jevy interferenční jednoosých i dvojosých krystalů lze si snadno představiti pomocí destiček s plochami od *M. A. Bertina* sestrojenými, které plochami *isochromatickými*. Řezek takové plochy s povrchem desky dává *křivku* isochromatickou; k nim sestrojil *L. Sohncke* plochy *achromatické* (neb jak se též jmenují, plochy *isogyr*. $\varepsilon = 0$, $\gamma = \frac{\pi}{2}$, δ - kvadr.)

Velmi zajímavý jsem pro detailnější studium jevy, jaké dostáváme *superpozicí* jiných pěkně orientovaných desek krystalinických v různé *vzájemné* poloze hlavních řezů. (Pruhy Ohmovy, proužky Lavaltovy, spirály Airyho 4násobné), jakož i *kombinací* s destičkami skutečnými (strmými spirály dvojnásobné, jevy s počmutými protažmi kvadranty, dále nicky, že rozeznati krystaly pravými od negativních; - dále s křemenovými deskami rovnoběžnými neb šikmými atd., na něž tuto jen upozorňujeme.

Sem hledí též jevy disperse optických os (ve světle bílém), měření úhlu os optických, změny interferenčních jevů teplem, tlakem, silami elektrickými, absorpcí tmy krystalů (*Haidingerovy*) a četné jiné.

Polarisace rotační.

§282. Úvod historický.

Objev polarisace rotační učinil současně s objevem polarisace chromatické *Dominique F. J. Arago* (v. t.) a popsal ve spise svém „Sur une modification remarquables, qu'éprouvent les rayons lumineux dans leur passage à travers certains corps diaphanes." Arago objevil zabarvení slídové destičky mezi polarisátory, zkoumal čité destičky krystalové jiné, při tom také destičky křemenové kolmo k ose broušené, a konstatoval při těchto důležitý úkaz, že bez toho mezi polarisátory *také* jeví zabarvením nezávisle na poloze destičky že však zabarvení jejich při otáčení analysátoru na průběh *jiný* než na př. u destiček slídových. *Biot* zkoumal *podrobněji* tento jev a vysvětloval jej rovněm na základě theorie *emanační*, jejímž byl poslední významným zástupcem — stáčením roviny polarisační. On také pokusy nalezl (1813) tři důležité *zákony* o polarisaci rotační, jež se ještě dodnes v čele učiva o jevech této polarisace staví. Také již poznal, že některé destičky stáčí na pravo, jiné na levo, čili jak nyní říkáme, že jsou některé *pravotočivé*, jiné *levotočivé* (dextrogyraty a laevogyraty) z řeckého γυρος kruh, stáčeti, odtud δ γῦρος jakýkoli, kruh, a z latinského dexter pravý, laevus levý (jako sinister); slova gyrus se užívá též v latině, čímž jest ono kombinování slova řeckého s latinskými ještě odůvodněno.

§283. Zákony Biotovy.

Zákony tyto jsou:

1.) *Otočení roviny polarisační jest úměrno tloušťce desky*

2.) *Otočení způsobené několika destičkami rovná se algebraickému součtu otočení způsobených destičkami jednotlivými.*

3.) Otočení variistá o indexem lomu čili jak nyní říkáme, o délkou vlny světelné a jest obrácené úměrno čtverci délky vlny.

Dle prvého zákona postačí tedy znáti točivost pro tloušťku jednicky, na př. jednoho milimetru. Úhel φ pro tuto tloušťku platící zově se molekulární rotační čili točivostí specifickou.

Dle třetího zákona Biotova měl by býti součin

$$\varphi \lambda^2 = \text{Const.}$$

Avšak výsledky pozorování novějších ukázaly, že rovnice tato jest jenom approximací a to dosti skrovnou, faktický součin tento stoupá, činí na př. asi 7,22 pro čáru B, naproti tomu 8,03 pro čáru H, předpokládajíc, že se délky vlny λ, jak zde jest vhodné vyjádří v jednicích mikron (μ). Proto byly zkoušeny jiné formy závislosti $\varphi = f(\lambda)$.

Z těch uvádíme zde dvě, totiž

$$\varphi = A + \frac{B}{\lambda^2} \quad \ldots \quad \text{(Broch & Stefan)}$$

$$\varphi = \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4} \quad \ldots \quad \text{(Boltzmann)}.$$

Obě tyto rovnice upomínají na rovnici

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4} \quad \ldots \quad \text{(Cauchy)},$$

kterou se stanoví přibližně závislost exponentu lomu na délce vlny světelné. Dle toho by průběh „rotační disperse" byl analogický průběhu disperse lámavé.

Číselně jeví se uvedené rovnice takto

$$\varphi = -1{,}753 + \frac{8{,}1622}{\lambda^2} \quad \ldots \quad \text{(Stefan)}$$

$$\varphi = \frac{7{,}07018}{\lambda^2} + \frac{0{,}1493}{\lambda^4} \quad \ldots \quad \text{(Boltzmann)}$$

při čemž λ vyjádřeno v jednicích mikron (μ).

Aby se vidělo, jak dalece pozorování se dá formulí vystihnouti, budiž zde položeny výsledky, jak je obdržel pozorováním Stefan, a výsledky, jak je počítám ze své formule odvodil

Boltzmann

	B	C	D	E	F	G	H	
φ =	15,55 ;	17,22 ;	21,67 ;	27,46 ;	32,69 ;	42,37 ;	50,98 ...	(Stefan)
	15,65 ;	17,24 ;	21,64 ;	27,42 ;	32,62 ;	42,43 ;	50,93 ...	(Boltzmann)

Rotační disperse B . . . H činí tudíž pro tloušťku 1 mm

$$\varphi_H - \varphi_B = 35^\circ, 43,$$


což jest disperse velmi značná.

§ 284. Apparáty ke studiu subjektivního polarisace rotační.

Průběh úkazů polarisace rotační lze k předběžné orientaci velmi dobře studovati apparátem Nörrembergovým v témž způsobu upraveným jako ke studiu úkazů polarisace chromatické ve světle rovnoběžném.

Jiný apparát k tomuto zvláště určený je apparát Mitscherlichův (obr. 264.)

obr. 264.




Analysátorem i polarisátorem jest zde hranol Nikolův. Mezi oběma je dostatečně prostoru, aby se mohly vložiti též trubice skleněnými dýzkami uzavřené, jež obsahují kapalinu opticky aktivní.

Točivost se dá na dělicím kruhu u analysujícího nikolu stanoviti.


K tomuto přístroji musí býti připojen průmohledný spektroskop, nejlépe tabulový, jenž v okuláru má posunovatelný drátový kříž.

Obr. 265. ukazuje spektroskop ten jednak v pohledu (a), jednak v průřezu svislém (b).

ob. 265. aj



ob. 265. bj



§285. Apparáty k objektivní demonstraci polarisace rotačií.

Účeli tomuto slouží projekční apparát Duboscqův v téhož uspořádání jako pro úkazy polarisace chromatické ze světle rovnoběžném. Jako tam připojuje se i zde k němu jednak hranol průmyslový za účelem spektrálního rozboru, při čemž se pole jízží liniární štěrbinou, jednak analysátor (nikol) rotující ve spojení s hranolem achromatickým uchylujícím, aby se úkazy, jež při otáčení analysátorem pozorujeme časově za sebou, rozložily prostorově vedle sebe přehledně na základě trvání dojmů zrakových. –

§286. Průběh úkazů ve světle monochromatickém.

Jest velmi jednoduchý. Studuje se subjektivně nejlépe apparátem Mitscherlichovým. Polarisující nikol zařídí se na př. tak, aby jeho rovina polarisační byla vertikální. Je-li analysující nikol s ním zkřížen, máme při osvětlení jakémkoliv pole tmavé. Osvětlíme tedy světlem natriovým. Pole je tmavé. Vzjasní se však, když složíme mezi nikoly destičku křemenovou s rovinami k ose jeho kolmými, tak aby tyto poměry byly kolmé k ose apparátu. Když však otáčíme-se správného smyslu na pravo neb na levo – nikolem analysujícím, přijdeme k poloze nikolu, při níž se jeví pole opět tmavým (– nebo vlastně slabě modravým, poněvadž plamen Bunsenův jest modravý). Úhel, o který bylo nutno analysujícím nikolem otočiti, odečte se na dělených kruhu. Když se úhel dělí tloušťkou destičky, v millimetrech, obdrží se ϱ pro Na. Tloušťka destičky se stanoví kontaktním měřítkem.

Podobně lze určiti ϱ pro Li (α). Jest jenom třeba červeným sklem eliminovati současné světlo natriové. Ukáže se, že jest ϱ menší pro Li α než pro Na.

§287. Průběh úkazů ve světle polychromatickém, speciálně bílém.

Studuje se obvodně apparátem buď Norrenbergovým nebo též Mitscherlichovým světlo denní. Skřížíme analysátor s polarisátorem. Pole jest tmavé.

Vložíme destičku křemenovou. Pole se vzjasní a zbarví. Dle barvy, jakou při tom pozorujeme, nazýváme destičku křemenovou na př.: červenou, žlutou, modrou, atd.

Pojmenování toto se tedy vztahuje na zkřížené nikoly.

Otáčíme-li destičkou křemenovou kolem její osy, tedy se zabarvení nemění, což jest pochopitelno. Jest však v tom důležitý rozdíl proti polarisaci chromatické.

Otáčíme-li však analysujícím nikolem, mění se barva spojitě. Při tom pozorujeme dvojí případ: barvy přecházejí jedna v druhou buď vzestupně nebo sestupně. To je (dle analogie akustické): buď od barvy nižší (červené) k vyšší (fialové) nebo naopak. To záleží jednak na smyslu, v jakém točíme nikolem, jednak také na destičce křemenové, je-li pravo- nebo levotočivou.

Mění-li se barvy vzestupně při otáčení nikolu na pravo (jako ručička u hodin), je křemen pravotočivým – mění-li se však barvy vzestupně při otáčení nikolu na levo (obráceně jako ručička u hodin), je křemen levotočivým.

Z toho plyne, že pojmenování „pravo" resp. „levo" točivý se řídí dle toho, jak se věc jeví, když hledíme papírkem světelným vstříc – což při pozorování subjektivním jest sice nejpřirozenější, ale při demonstrování objektivním, při projekci úkazů na stěnu, dlužno na to pamatovati – neboť zde se díváme na papírek vstříc, nyní tak, jak jsou papírky.

Pozor barev můžeme při objektivním demonstrování apparátem Dubosqueovým pěkně přehlédnouti, užívajíce rotujícího analysátoru ve spojení s achromatickým uchylujícím hranolem. Otáčíme-li dosti rychle, obdržíme ve světle slunečním na projekční stěně barevný kruh, na němž všechny barvy jsou prostorově vedle sebe, jak bychom je jinak s různým postavením analysátoru pozorovali časově po sobě.

Zde také zpozorujeme, že barvy, jež na tomto kruhu jsou o 90° od sebe vzdáleny, jsou komplementární. Důkaz plný lze ovšem podati nejlépe analysátorem dvojlomným, tak jako při analogickém jevu polarisace chromatické.

Vidíme z toho, že na základě buď polarisace chromatické (pro různé destičky krystalové) nebo zejména rotační (pro touž destičku křemenovou) můžeme, užívajíce dvojlomného analysátoru, předvésti celou serii barev komplementárních spůsobem nejpravidelnějším a nejdokonalejším.

5288. Pokračování. Rozbor spektrální.

Uhněte zkoumati, jaké jsou ony barvy, jež zde pozorujeme, užíváme analyse spektrální podobně jako při polarisaci chromatické.

Držíme tedy pole stěrbinou a připojíme hranol průhledný, při pozorování na apparátu Nörrenbergově před nikol, při demonstraci objektivním apparátem Dubosqueovým za nikol, u apparátu Mitscherlichova postavíme za nikol spektroskop průhledný.

Ve všech těchto případech pozorujeme spektrum, v němž se nalézá jeden, po případě i několik — tmavých, nemalě ohraničených, t. j. ponenáhlu se ztrácejících pruhů. Je-li destička křemenová velmi tenká (několik desetin millimetru), žíží se pruh přes velkou část spektra. Proto je zabarvené pole zde méně živé, mdlé, nemalě. Je-li destička několika millimetrů silná, obdržíme jediný pruh, nebo po případě dva, zabarvené pole je zde živé, mnohem. Je-li konečně deska křemenová asi dva centimetry silná nebo i silnější, vznikají pruhy ve spektru ve velkém počtu, jsou úzkostnější a téměř aequidistantně po barvách spektrálních rozloženy. Dím se vyjádřiti, že při takových

tloušťkách desek křemenových zabarvení pole opět se stává mdlejší, nevýraznější, jsouc téměř bělavé — neboť je známo, že spojením barev spektrálních vzniká světlo téměř bílé i tehdy, když z barev těch aequidistatně čtyři barvy (na př. diaphragmatem hřebenovým) vyjmeme.

Postavení pruhů ve spektru mění se při otáčení analysujícího nikolu. Proto se barva mění.

Vznik těchto barev vyjevíme sobě nejlépe — majíce desku křemenovou mnohé tloušťky — graphickým znázorněním, tak totiž, že sestrojíme, jak se polarisační rovina, původně na př. vertikální pro dopadající světlo bílé, vlivem destičky křemenové stočí a sice pro jednotlivé vznikající barvy, na př. červenou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou. Obdržíme diagramm, jako na př. obr. 266 pro desku křemenovou 3 mm. Máme zde:

Otočení roviny polarisační:


pro světlo červené (čára B) $15{,}55 \times 3 = 46{,}7$
" " žluté (" D) $21{,}67 \times 3 = 65{,}0$
" " zelené (" E) $27{,}46 \times 3 = 82{,}4$
" " modré (" G) $42{,}57 \times 3 = 127{,}1$
" " fialové (" H) $50{,}98 \times 3 = 152{,}9$.

Dáme-li pak analysující nikol do postavení jakéhokoliv, přečteme ihned, která barva se úplně a které sousední se zbytky částečně nikolem analysujícím uhášejí, a které se propouští v plné intensitě.

Uhášení barev odpovídá tmavému pruhu ve spektru.

Tak je na př. v obr. 266. znázorněno, že při dané tloušťce destičky = 3 mm a při postavení nikolů souhlasném se uhášejí

obr. 266.



hlavně zelená a modrá část spektra, totiž všechny barvy mezi čarou E a F; následkem toho zůstávají barvy hlavně červená, oranžová a žlutá, k nimž se přidá pak ještě fialová; poněvadž však intensita této je vůbec malá, převládá ton červený do žluta.

V obrazci je též, naznačeno, jak by se tento barevný ton změnil, kdybychom otočili nikol analysující zpět asi o 20°. Uhásela by se pak část spektra mezi D a E, tedy část centrální, a propustila by se hlavně část červená a modro-fialová. Tím vzniká ton barevný zcela zvláštní, barva jež je modravě červená, a jež již nepatrným postočením nikolu buď přejde v jednom smyslu do červené, nebo ve smyslu druhém do modro-fialové, tedy do barvy o dříve již značně kontrastující. Poněvadž se tedy barva tato rychle mění, zove se proto „citlivou" také přechodní.


Pokusem se velmi snadno při každé destičce několik millimetrů tlusté nalezne postavení nikolu analysujícího, jež této citlivé barvě odpovídá.

Že vznikají barvy komplementární ve dvou o 90° od sebe rozdílných polohách analysujícího nikolu, lze snadno pochopiti, neboť právě ty barvy, jež se uhásí při poloze analysatoru α, propustí se v plné intensitě při poloze $\alpha+90°$ a naopak.

§289. Soleilova dvojdeska.

Soustava dvou rovnoběžných přiřazených a dohromady stejných stejně tlustých destiček křemenových, z nichž jedna jest pravo- druhá levotočná, zovemo dvojdeskou (obr. 267.).

obr. 267.



Postavme dvojdesku takovou za polarisator tak, aby jeho rovina polarisační, na př. vertikální, souhlasila s hraničnou přímkou obou destiček, při čemž dáme vhodně pravotočnou na pravo, levotočnou na levo, hledíc k pozorovateli, jenž se dívá papiskem světelným analysatorem vycházejícím vatřic.

Všeobecně při libovolném postavení analysatoru jeví se dvojdeska tato ve světle homogenním, na př. natriovém, různě světlou, ve světle bílém pak různě barevnou.

Avšak: Jest-li analysator buď souhlasný nebo skřížený s polarisatorem, pak jeví se dvojdeska při osvětlení homogenním stejně světlou, při osvětlení bílém stejně barevnou, ať jest její tloušťka jakákoliv.

Důvod toho plyne ze symmetrie celého zjevu vůči hlavním rovinám apparátu polarisačního.

Můžeme však položiti požadavek, aby se dvojdeska při osvětlení bílém jevila v zabarvení citlivém, a sice buď tehda, když je analysator souhlasný, anebo tehda, když je skřížený s polarisatorem.

Požadavkem tímto jest určena tloušťka dvojdesky.

Obyčejně žádá se, aby při souhlasném postavení analysatoru s polarisatorem byla dvojdeska v zabarvení citlivém. Pohled na obr. 266. poučuje nás ihned, že by dvojdeska musila býti tak tlustá, aby polarisační roviny pro čáru D a E byly stočeny, jedna o něco méně než 90°, druhá o něco více než 90°, tak aby se analysatorem uhasla střední část spektra mezi čarami D a E. Pro čáru D máme točivost 21°,7, pro čáru E točivost 27°,5, střední tedy asi 24°,6; obyčejně počítá se dle stáčivosti okrouhle 24°. Dvojdeska má tedy býti tloušťky x takové, aby

$$x \cdot 24 = 90°.$$

Z toho plyne: $$x = 3{,}75 \text{ mm}.$$


Tak se z pravidla udává tloušťka dvojdesky, již zavedl Soleil. Mnohdy shledáváme tloušťku poněkud větší, na př. 3,8 mm.

Když by dvojdeska při skřížených nikolech se měla jeviti v zabarvení citlivém, musila by tloušťka její, jak patrno, býti dvojnásobná, tedy 7,5 mm. Také takové dvojdesky někdy se volí (jako jest na př. přidána k našemu objekt. apparátu Duboscquovu).

Rozestavení polarisačních rovin ve dvojdesce Soleilově 3·75 mm pro hlavní čáry Fraunhoferovy ukazuje obr. 268.

Číselný základ diagrammu tohoto jest následující:

B) $15{,}55 \times 3{,}75 = 58°{,}3$ — C) $27{,}46 \times 3{,}75 = 103{,}0$
C) $17{,}22 \times 3{,}75 = 64°{,}6$ — D) $32{,}69 \times 3{,}75 = 122{,}6$
D) $21{,}67 \times 3{,}75 = 81{,}3$ — E) $42{,}37 \times 3{,}75 = 158{,}9$
H) $50{,}98 \times 3{,}75 = 191{,}2$.



§ 290. Význam dvojdesky Soleilovy pro zkoumání optické aktivity látek.

Mimo křišťál stáčejí také mnohé jiné látky rovinu polarisační buď vpravo nebo vlevo. Mohutnost tuto rovnou optickou aktivitou.

Lze ji velmi citlivě zjistiti dvojdeskou křemenovou, a to jak při osvětlení světlem homogenním, tedy z pravidla natriovým, tak při osvětlení bílém. Zakusíte totiž za destičku Soleilovu — při nikolech souhlasných — dáme látku poučnou jen opticky aktivní, poruší se při osvětlení natriovém stejnost světlosti, a při osvětlení bílém stejnost zabarvení.

Právě kontrastem světlosti neb zabarvení jedné destičky proti druhé ve dvojdesce vyniknou optická aktivita daleko citlivěji než na př. vyjasněním neb zabarvením pole vůbec, když by dvojdesky nebylo.


Jde-li o měření optické aktivity, lze pomocí dvojdesky pokračovati dvojím způsobem.

Buď se otočení roviny polarisační přímo měří v úhlové, anebo se vyjádří nepřímo tloušťkou destičky křemenové, jejíž optická aktivita jest ekvivalentní (Methoda kompensační).

Při osvětlení natriovém lze užíti obou method
Při osvětlení bílém lze užíti jen methody kompensační!
Kompensátor Soleilův jest dán kombinací
a) destičky křemenové, na př. levotočivé, tloušťky určité,
b) destičky křemenové, na př. pravotočivé, tloušťky měnitelné.

Pět měnitelné tloušťky) dosáhne se dvěma křemenovými klínky opačně postavenými, jež se dají relativně posunovati, tvoříce dohromady vždy destičku, na př. pravotočivou, ale tloušťky větší neb menší dle toho, jak klínky jsou posunuty (obr. 269.)

ob. 269.



Způsob pozorování jest tedy následující:

A.) Přímé měření optické aktivity

Aparát na př. Mitscherlichův.

Analysující nikol jest spojený alhidadou, jež se otáčí podél děleného kruhu.

Zasadí se dvojdeska, osvětlí světlem natriovým. Analysator se postaví tak, aby ve dvojdesce obě destičky se jevily ve světlosti stejné. Hraniční čára mezi oběma mizí.

Zasadí se pak látka opticky aktivní. Stejnost světlosti se poruší. Otáčí se tedy analysující nikol — ve správném smyslu — tak, až opět stejnost světlosti se zjeví.

Tím se přímo určí úhel, o který se látkou aktivní otočila polarisační rovina světla natriového.

B.) Nepřímé měření optické aktivity.

Osvětlení jakékoliv. Před analysator se vloží kompensátor v poloze „nullové", t.j. tedy dvojdeska — při rovnoběžných nikolech — se jeví buď ve stejné světlosti neb stejném zabarvení jakoby kompensátoru zde nebylo.

Vloží se látka aktivní. Stejnost světlosti neb zabarvení se poruší. Tyto manipuluje se na kompensátoru tak, aby se tato stejnost opět dostavila, t.j. aby se vliv aktivní látky kompenzoval ekvivalentní destičkou křemenovou. Posunují se tedy klínky kompensátoru. Posunutí se odečítá na svlášní stupnici. Resultát tedy jest, že optická aktivita dané látky je ekvivalentní té, jakou ukazuje destička křemenová jisté tloušťky, kterouž lze z posunutí klínků počítati. Hodnota dílce této stupnice se obyčejně empiricky určuje.

§ 291. Saccharimetrie.

Obě methody v předešlém § popsané mají velkou důležitost pro saccharimetrii.

Cukr (od κχ αρ, -ος čili saccharum, slovo asijské) jest název souhrnný, kterým se označují jisté uhlohydráty, totiž sloučeniny uhlíku C a vody H_2O, z nichž skoro všechny jsou opticky aktivní buď + (pravotočivé) neb − (levotočivé).

Sem náleží:

Glykosy (γλυκύς, sladký) $C_6(H_2O)_6 = C_6H_{12}O_6$,

dále Saccharosy; tyto vznikají ze dvou molekul předešlých ztrátou vody, tedy $2[C_6(H_2O)_6] - H_2O$, což jest

$$C_{12}(H_2O)_{11} - C_{12}H_{22}O_{11},$$

tak že jsou tyto anhydridy předešlých.

Ostatní uhlohydráty nemají chuti sladké.

Ke glykosám náleží

Dextrosa (+) čili cukr hroznový, jež se nalézá ve sladkém ovoci, v medu, normálně též v krvi a moči, zde též anormálně v množství větším (diabetes mellitus).

Laevulosa (−) čili cukr ovocný, jež přichází zároveň s dextrosou ve sladkém ovoci, v medu a j.

K saccharosám náleží hlavně:

Saccharosa (+) v různém slova smyslu čili cukr třtinový, jež se nalézá ve třtině cukrové, v řepě cukrové čili cukrovce a j.

Laktosa (+) čili cukr mléčný (lac, -tis n.), jež se nalézá ve mléku savců.

Maltosa (+) čili cukr sladový, původního kvašení schopný.

Kapaliny cukrnaté otáčí rovinu polarisační. Základním údajem quantitativním je následující.

Roztok cukru vodnatý, jenž byl při tloušťce vrstvy jednoho decimetru (= 100 mm) byl acquivalentní destičce křemenové tloušťky jednoho millimetru,

(tedy 100 krát menší tloušťky) má ve 100 kubických centimetrech roztoku 32,70 gramů krystalovaného cukru. Roztok této koncentrace jest roztokem „normálním." Účinnost jeho jest tedy pro světlo natriové v trubicích decimetrových 21,72 (při 20° C).

Je-li tedy koncentrace libovolná z, otáčí se rovina polarisační v trubicích decimetrových o úhel α, jenž plyne z úměry:

$$\alpha \cdot 21{,}72 = z \cdot 32{,}70.$$

z toho:

$$\alpha = \frac{21{,}72}{32{,}70} \cdot z \text{ čili } \alpha = 0{,}665\, z.$$

a tudíž v trubicích délky l libovolné v decimetrech

$$\alpha = 0{,}665 \cdot z \cdot l,$$

z toho plyne pak obráceně:

$$z = 1{,}504 \cdot \frac{\alpha}{l}.$$

U takových saccharometrů bývají trubice pro roztok cukrový obyčejně délky dvou centimetrů. Pro takové jest pak normálním roztokem cukrovým ovšem roztok koncentrace poloviční, t. j. 16,35 grammů ve 100 cm³ roztoku (nikoli vody!). Toto číslo se obyčejně udává za „normální" roztok cukrový.

Bližší popis saccharometrů, jichž jest větší počet, náleží do fysiky praktické.

§ 292. Rotace roviny polarisační v poli magnetickém.

Effekt Faradayův.

Roku 1845. ukázal Faraday, že i tělesa isotropická otáčejí rovinu polarisační a to tehdy, když jsou v silném poli magnetickém. Póly silného elektromagnetu zhotovené ze silných hranolů měkkého železa byly tak provrtány, že oběma mohl projíti tyč papršek světelný. Před elektromagnetem byl polarisátor tak, že póly obdržel ze paprsek rovinně polarisovaný, jenž dále dopadal na analysátor. Při vložení desky skleněné (těžkého skla korunového) a při skřížených nikolech bylo pole v analysátoru tmavé, byl-li však elektromagnetem zavedeno pravé, objevilo se světlo v analysátoru, které teprve při

otočení analysatoru zmizelo. Zdá se tedy vliv pole magnetického v stočení polarisační roviny světla rovinně polarisovaného.


Byl-li proud v elektromagnetu změněn, tak že se póly vyměnily, objevila se rotace roviny polarisační ve směru opačném. Dívame-li se ve směru siločárek magnetických, tedy od severního pólu k jižnímu, pak nastává rotace od levé ruky k pravé čili v tom směru, v jakém by šel proud elektrický, který by takovou siločárku obtékal.

Effekt Faradayův jeví se v míře největší, prochází-li paprsek rovnoběžně se siločárkami; dopadá-li na ně kolmo, nenastává stáčení roviny polarisační.

Faraday zkoumal tímto spůsobem nejen tělesa pevná, ale i kapaliny a vzdušiny. V posledním případě nedržel vždy přesvědčivých výsledků. Směs vzduchu ve velmi četných případech rotace polarisační roviny byla nepatrná, tak že bylo třeba užíti silnější vrstvy pozorované látky. Vkládal Faraday tělesa zkoumaná do osy dlouhého solenoidu, jímž procházel silný proud galvanický.

Mezi effektem Faradayovým a úkazem rotační polarisace na roztocích (na př. cukru a pod.) je však důležitý rozdíl. Prochází-li (obr. 270.) na př. paprsek rovinně polarisovaného světla křemenovou deskou A B (kolmo k ose plochou) ve směru od A ku B, pak se stáčí rovina polarisační na př. v pravo; tato rotace v pravo objeví se též, přijdeli paprsek směrem od B k A. To znamená, kdyby se paprsek od A k B jdoucí a D odrazil, aby deskou křemennou prošel směrem obráceným, pak se rotace polarisační roviny, způsobená průchodem od A k B zrušil rotací paprsku mrazícího se směrem od B k A; neboť směr stáčení na pravo, hledíme-li na plochu A, je opačným směru stáčení na pravo, hledíme-li na plochu B.

Obr. 270.



Prochází-li však paprsek rovinně polarisovaného světla látkou isotropickou, která je v poli magnetickém, pak stočení roviny polarisační ve směru klesajícího potenciálu magnetického jest opačné stáčení roviny

polarisační ve směru klesajícího potenciálu magnetického, tak že paprsek, který prochází ve směru siločárek a který je stočen v pravo, — hledíme-li ve směru siločárek, — stáčí se, mací-li se odražen zpět směrem siločárkám protivným, v levo, tak že vychází po odrazu v druhém průchodu pole magnetickým stočen o úhel dvojnásobný.

Rotace effektu Faradayova úměrna jest rozdílu magnetického potenciálu mezi body, kde paprsek vchází do ústředí a kde je opouští, tedy

$$\varphi - c(V_1 - V_2);$$

konstanta c — (Verdetova konstanta) — záleží na povaze media a je positivní neb negativní dle toho, jeli medium diamagnetické neb paramagnetické. Z toho vyšetření následuje, že rotace je největší, když paprsek jde ve směru siločárek, že se stává = 0, když paprsek jde kolmo k siločárkám, a že se pro šikmý směr dopadu mění jako cosinus úhlu, který svírá paprsek dopadající se směrem siločárek.

Becquerel, Kundt a j. nalezli effekt Faradayův na mnohých látkách diamagnetických a ukázali, že i plyny jeví tyto vlastnosti, když paprsek několikráte odražený prochází magnetickým polem sem a tam, tak že se úhel rotace násobí.

Výsledky všech měření ukazují, že největší část látek isotropických (látek jak pevných, tak kapalných a vzdušných) v silném poli magnetickém stáčí polarisační rovinu ve směru positivním, t. j. ve směru stejnosměrných proudů pole magnetické původících. Dále se ukazuje takovátto positivní rotace i při propouštění světla tenkými lístky látek magnetických jako je železo, nikl a kobalt.

Zkoumáme-li však koncentrovaný roztok chloridu železitého, objeví se rotace negativní, což platí i pro ostatní roztoky solí magnetických, jichž negativní rotace projeví se zmenšením positivní rotace solventu.

[*§293. Theorie rotační polarisace.

[* První theoretický výklad rotační polarisace podal Fresnel na základě předpokladu, že vibrace lineární může býti rozložena ve dvě cirkulární vibrace opačných směrů. Dle toho můžeme nahraditi každý paprsek lineárně polarisovaný dvěma, jež jsou cirkulárně v opačných směrech polarisovány. Dopadá-li tedy paprsek lineárně polarisovaného světla na rozhraní nějakého prostředí, můžeme si představiti jej rozložena ve dva cirkulárně polarisované paprsky, které se tímto prostředím dále šíří. Šíří-li se oba stejnou rychlostí, pak při východu do prostředí předešlého kombinujíce se oba cirkulárně polarisované paprsky opět na původní lineárně polarisované světlo. Kolikž však rychlost šíření se obou paprsků cirkulárně polarisovaných není stejná, pak se může státi, že oba paprsky při východu do předešlého prostředí spojují se na paprsek lineárně polarisovaný, ale tak, že rovina polarisační tohoto paprsku je proti polarisační rovině stočena.

Provedení této myšlenky podrobným počtem vede k zákonům Bistrozným.]